

الدواء و الطعام

(كيفية تناول الدواء بالنسبة للطعام)



إعداد الصيدلانية

إيمان شمس الدين دمرويش

سلمية - حماه - سوريا

٢٠١٥م - ١٤٣٦هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

(وقل ربني علماً)

(وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً)

المقدمة

من أكثر الأسئلة التي تطرح في الصيدلية : هل يؤخذ هذا الدواء قبل أم بعد الطعام ؟

في هذا الكتاب قمت بجمع المعلومات المتوفرة حول ذلك من المراجع المذكورة لاحقاً و تم إدراج اسم المرجع بعد كل فقرة و ذلك للأمانة العلمية لكن للأسف لا توجد دراسات كافية حول تأثير الطعام على الدواء و ذلك لصعوبة هذه الدراسات و تدخل عوامل كثيرة في امتصاص الدواء

و قد اكتفيت بالبحث ضمن المراجع الثمانية المذكورة دون الانترنت و ذلك حتى تكون معلومات موثوقة من مراجع عالمية , على الرغم من عدم توفر معلومات كافية حول هذا الموضوع لبعض الأدوية

تم تصنيف الأدوية في البداية حسب المجموعات الدوائية ثم حسب الحرف الابجدية

الصيدلانية إيمان درويش

سلمية – حماه – سوريا 2015 م

الفهرس

7	مضادات الجراثيم
25	مضادات الأولي
27	أدوية الملاريا
30	طارادات الديدان
32	مضادات الفطور
35	مضادات الفيروسات
42	الأدوية القلبية الوعائية
62	المسكنات المضادة للالتهاب و مضادات الحمى
70	أدوية الجهاز الهضمي
80	أدوية الجهاز التنفسي
83	مضادات الهستامين
85	الستيروئيدات القشرية
87	أدوية السكري
93	مزيلات القلق و المهدئات و المنومات و مضادات الأهان
97	مضادات الاكتئاب
102	أدوية الشقيقة
104	أدوية باركنسون
108	مضادات الصرع

114 مضادات الخرف
116 أدوية النقرس
117 مرخيات العضلات
119 الأدوية المؤثرة على العظام
123 الهرمونات الدرقية ومضادات الدرق
125 مضادات الورم
131 الأدوية حسب الأحرف الأبجدية

المراجع

**(Martindale Thirty-sixth edition)
(AHFS Drug Information)
(Pocket Clinical Drug Reference)
(Pharmacotherapy handbook Eighth
Edition)
(British National Formulary 57)
(Comprehensive Pharmacy Review for
NAPLEX Eighth Edition)
(Wilson and Gisvold's Textbook of
Organic Medicinal and Pharmaceutical
Chemistry eleventh edition)**

(الشامل في الأدوية السريرية)

مضادات الجراثيم Antibacterials

البنسيلينات

Amoxicillin

لا يؤثر الطعام على توافره الحيوي أو له تأثير صغير, يؤخذ بغض النظر عن الطعام

(Wilson and Gisvold's Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry eleventh edition)

(AHFS Drug Information)

Amoxicillin and Clavulanate

يمكن تناوله مع الطعام أو وجبة خفيفة لتقليل تأثيراته الجانبية الهضمية

(Pocket Clinical Drug Reference) (AHFS Drug Information)

Ampicillin

أقل من نصف الجرعة تمتص و ينقص الطعام من امتصاصه أكثر لذا يؤخذ على معدة فارغة مع شرب كأس كامل من الماء (قبل الطعام بنصف ساعة على الأقل أو بعده بساعتين)

(Martindale Thirty-sixth edition) (British National Formulary 57)

(Pocket Clinical Drug Reference) (AHFS Drug Information)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Bacampicillin

لا يتأثر امتصاص هذا الدواء من الأقراص بوجود الطعام في المعدة

(Martindale Thirty-sixth edition)

Benzylpenicillin (Penicillin G)

إن وجود الطعام في الجهاز الهضمي ينقص امتصاصه لذا يؤخذ قبل الطعام بنصف ساعة على الأقل أو بعده بـ 2-3 ساعات

(Martindale Thirty-sixth edition)

Carbenicillin

يؤخذ مع كأس كبيرة من الماء و يفضل على معدة فارغة

(الشامل في الأدوية السريرية)

Cloxacillin

ينقص امتصاص الكلوكزاسيللين بوجود الطعام في المعدة لذا يؤخذ على معدة فارغة

(Martindale Thirty-sixth edition) (الشامل في الأدوية السريرية)

Dicloxacillin

ينقص امتصاص الديكلوكزاسيللين بوجود الطعام في المعدة لذا تؤخذ الجرعة الفموية على معدة فارغة

(Martindale Thirty-sixth edition) (Pocket Clinical Drug Reference)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Flucloxacillin

ينخفض امتصاصه بوجود الطعام في المعدة لذا يؤخذ قبل وجبات
الطعام بنصف ساعة على الأقل

(Martindale Thirty-sixth edition) (British National Formulary 57)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Nafcillin

يمتص بشكل ناقص و غير منتظم من الجهاز الهضمي و خاصة
عندما يؤخذ بعد الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

Oxacillin

ينخفض امتصاص الأوكزاسيللين بوجود الطعام بالمعدة لكنه أقل
تأثراً من الكلوكزاسيللين
تؤخذ الجرعة الفموية على معدة فارغة

(Martindale Thirty-sixth edition) (الشامل في الأدوية السريرية)

Phenoxymethyl penicillin (Penicillin V)

يفضل تناوله على معدة فارغة لأن ذلك يجعل امتصاصه أفضل
لكن يمكن تناوله مع الطعام فتأثير الطعام على امتصاصه ضعيف

(Martindale Thirty-sixth edition) (AHFS Drug Information)

Pivampicillin

لا يتأثر امتصاص البيفامبيسيلين بشكل هام بوجود الطعام لكن الانزعاج الهضمي الذي يسببه يكون أكثر تواتراً عندما يؤخذ على معدة فارغة لذا يؤخذ مع الطعام

(Martindale Thirty-sixth edition)

Pivmecillinam

إن وجود الطعام في المعدة ليس له تأثير هام على امتصاصه , يؤخذ أثناء وجبة الطعام مع نصف كأس ماء على الأقل وذلك بوضعية قائمة (Martindale Thirty-sixth edition) (British National Formulary 57)

السيفالوسبورينات

Cefaclor

لا يؤثر الطعام على الكمية الممتصة من السيفاكلور كبسول بينما يزيد امتصاصه من الأقراص مديدة التحرر لذا تؤخذ الأقراص مديدة التحرر مع الطعام لتحسين الامتصاص

(AHFS Drug Information)

Cefadroxil

إن الطعام لا يؤثر على امتصاص السيفادروكسيل, يمكن تقليل تأثيراته الجانبية الهضمية بتناوله مع الطعام

(AHFS Drug Information) (Martindale Thirty-sixth edition)

Cefalexin

إذا أخذ السيفاليكسين مع الطعام يتأخر امتصاصه لكن الكمية الكلية الممتصة لا تتغير

(Martindale Thirty-sixth edition) (الشامل في الأدوية السريرية)

Cefdinir

إن تناول السيفدينير مع وجبة طعام عالية الدسم ينقص معدل الامتصاص بمقدار 16% و الكمية الممتصة بمقدار 10%

يؤخذ السيفدينير بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Cefditoren pivoxil

يبلغ توافره الحيوي على معدة فارغة 14% و يزداد عندما يؤخذ مع وجبة طعام مرتفعة الدسم لذا يؤخذ مع وجبات الطعام

(Martindale Thirty-sixth edition) (الشامل في الأدوية السريرية)

Cefixime

يمتص 40-50% من الجرعة الفموية من الجهاز الهضمي سواء أخذ مع الطعام أو بدونه لكن الطعام يؤخر زمن وصول التركيز المصلي لذروته

(Martindale Thirty-sixth edition) (الشامل في الأدوية السريرية)

Cefpodoxime proxetil

يبلغ توافره الحيوي 50% إذا أخذ على معدة فارغة و يزداد بوجود الطعام لذا يفضل تناوله مع الطعام

(Martindale Thirty-sixth edition) (Pocket Clinical Drug Reference)

(Wilson and Gisvold's Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry eleventh edition)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Cefprozil

وجود الطعام لا يؤثر على امتصاصه أو له تأثير خفيف

(Martindale Thirty-sixth edition)

Cefradine

يتأخر امتصاص السيفرادين بوجود الطعام لكن الكمية الكلية الممتصة لا تتغير (Martindale Thirty-sixth edition)

Cefteram

يؤخذ بعد وجبات الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

Ceftibuten

إن الطعام يؤخر امتصاصه و ينقص الكمية الممتصة لذا يؤخذ على معدة فارغة (Martindale Thirty-sixth edition) (الشامل في الأدوية السريرية)

Cefuroxime axetil

يزداد معدل امتصاصه عندما يعطى مع الطعام أو بعده بقليل لذا
يؤخذ مع الطعام أو بعده

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

(Wilson and Gisvold's Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical
Chemistry eleventh edition)

(الشامل في الأدوية السريرية)

الماكروليدات

Azithromycin

يؤخذ الكبسول و المعلق معدل التحرر على معدة فارغة أما
الأقراص يمكن تناولها مع الطعام

(Martindale Thirty-sixth edition) (الشامل في الأدوية السريرية)

Clarithromycin

يؤخر الطعام امتصاصه لكنه لا يؤثر على الكمية الممتصة أو حتى
أنه قد يزيدها ,يؤخذ بغض النظر عن الطعام (يمكن تناوله مع
الطعام إذا سبب اضطرابات هضمية) (الشامل في الأدوية السريرية)

Dirithromycin

يتحسن امتصاصه بوجود الطعام, يؤخذ مع الطعام أو خلال ساعة
من تناوله (Martindale Thirty-sixth edition) (AHFS Drug Information)

Erythromycin

إن الطعام ينقص امتصاص إريثرومايسين أساس و إريثرومايسين ستيريات بالرغم من أن ذلك يعتمد إلى حد ما على المستحضر (تؤخذ على معدة فارغة لكن يمكن تناولها مع الطعام عند حدوث اضطرابات هضمية)

أما الاستر (إريثرومايسين إيتيل سوكسينات) فتأثير الطعام صغير على امتصاصه (يؤخذ مع الطعام)

و يستخدم الإريثرومايسين لتحسين الإفراغ المعدي و حركية الأمعاء و عند ذلك يؤخذ قبل وجبة الطعام بنصف ساعة

(Martindale Thirty-sixth edition) (Pocket Clinical Drug Reference)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Flurithromycin

يؤخذ بعد الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

Roxithromycin

ينخفض امتصاصه عندما يؤخذ بعد الطعام لذا يؤخذ قبل الطعام

(Martindale Thirty-sixth edition) (الشامل في الأدوية السريرية)

Spiramycin

ينخفض امتصاصه بوجود الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

التتراسيكلينات

إن الطعام و الحليب يخفضان امتصاص الـديميكلوسيكليين و التتراسكليين من الجهاز الهضمي لذا تؤخذ هذه الأدوية قبل الطعام أو الحليب بساعة أو بعد ذلك بساعتين

إن الدوكسيسيكليين و المينوسيكليين يمكن تناولهما مع الطعام أو الحليب حيث أن ذلك لا يخفض امتصاصهما بشكل هام

(AHFS Drug Information)

Demeclocycline

ينقص الطعام معدل امتصاصه لذا يؤخذ قبل الطعام بساعة أو بعده بساعتين مع شرب كمية وافرة من السوائل

(Martindale Thirty-sixth edition) (الشامل في الأدوية السريرية)

Doxycycline

إن الدوكسيسيكليين له إلفة للارتباط بالكالسيوم أخفض من إلفة الكثير من التتراسيكلينات و لذلك امتصاصه أقل تأثراً بالطعام و الحليب (ينقص معدل امتصاصه بنسبة 20% عند تناوله مع الطعام) يمكن أن يؤخذ مع الطعام أو الحليب إذا سبب اضطرابات معدية مع شرب كمية وافرة من السوائل و يجب عدم الاستلقاء لمدة 30 دقيقة بعد تناوله لتجنب أذية المري

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

(الشامل في الأدوية السريرية) (British National Formulary 57)

Minocycline

لا يتأثر امتصاصه بشكل هام بوجود الطعام أو كميات معتدلة من الحليب فالمينوسيكليين لديه إلفة للارتباط بالكالسيوم أخفض من تلك التي للتتراسيكليين و لذلك امتصاصه أقل تأثراً بوجود الطعام أو الحليب

يؤخذ مع الكثير من السوائل و يجب عدم الاستلقاء لمدة نصف ساعة بعد تناوله لتجنب أذية المري

يمكن تناوله مع الطعام إذا سبب اضطراب هضمي

(Martindale Thirty-sixth edition) (Pocket Clinical Drug Reference)

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

Methacycline

يفضل تناوله قبل ساعة من الطعام أو بعده بساعتين

(Martindale Thirty-sixth edition)

Oxytetracycline

يؤخذ قبل الطعام بساعة أو بعده بساعتين

(الشامل في الأدوية السريرية) (Martindale Thirty-sixth edition)

Tetracycline

ينقص الطعام من امتصاصه لذا يفضل تناوله على معدة فارغة

(الشامل في الأدوية السريرية) (Martindale Thirty-sixth edition)

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

الكينولونات

Cinoxacin

إن الطعام يخفض تركيزه المصلي الذروي بنسبة 30% و لكنه لا يؤثر على الكمية الكلية الممتصة

يمكن تناوله مع الطعام لتخفيف شدة الركودة المعدية التي قد يسببها هذا الدواء (الشامل في الأدوية السريرية)

Ciprofloxacin

إن الطعام يؤخر امتصاصه لكنه لا يؤثر على الكمية الممتصة بشكل هام و التي تبلغ (20-35 %) بعد تناوله فمويًا

يمكن تناوله مع الطعام (لكن ليس الأطعمة الغنية بالكالسيوم) لتخفيف الركودة المعدية التي يسببها مع شرب كمية كبيرة من السوائل

(Wilson and Gisvold's Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry eleventh edition)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Gatifloxacin

يؤخذ بغض النظر عن الطعام و الحليب (AHFS Drug Information)

Gemifloxacin

يؤخذ بغض النظر عن الطعام مع شرب كميات كبيرة من السوائل

(AHFS Drug Information)

Levofloxacin

يمكن تناوله مع الطعام أو بدونه مع شرب كميات وافرة من السوائل

(الشامل في الأدوية السريرية)

Moxifloxacin

يؤخذ بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Nalidixic Acid

يؤخذ قبل وجبة الطعام بساعة لكن في حال حدوث عسرة هضم

يمكن تناوله مع الطعام (الشامل في الأدوية السريرية)

Norfloxacin

يؤخذ قبل ساعة على الأقل من تناول الطعام أو بعد ذلك بساعتين

(Martindale Thirty-sixth edition) (الشامل في الأدوية السريرية)

Ofloxacin

يؤخر الطعام امتصاصه لكن تأثيره خفيف على الكمية الممتصة

(Martindale Thirty-sixth edition)

Pefloxacin Mesilate

يؤخذ مع الطعام (الشامل في الأدوية السريرية)

Sparfloxacin

يمكن تناوله مع الطعام أو بعيداً عنه مع شرب كمية كبيرة من السوائل (الشامل في الأدوية السريرية)

السلفوناميدات

Sulfadiazine

يؤخذ على معدة فارغة مع شرب كمية كبيرة من السوائل خلال فترة استخدامه (الشامل في الأدوية السريرية)

Sulfafurazole (Sulfisoxazole)

يؤخذ على معدة فارغة مع كأس من الماء (الشامل في الأدوية السريرية)

اللينكوزاميدات

Clindamycin

إن الطعام يؤخر من وصول تركيزه المصلي لذروته لكنه ليس له تأثير هام على الكمية الممتصة , يؤخذ بغض النظر عن الطعام مع كأس كامل من الماء لتجنب الإصابة بالتخريش المريئي

(AHFS Drug Information) (الشامل في الأدوية السريرية)

Lincomycin

إن الطعام يخفض لدرجة كبيرة من معدل الامتصاص و الكمية الممتصة لذا يؤخذ قبل الطعام بساعة على الأقل

و يؤخذ مع كأس كبيرة من الماء لتجنب الإصابة بالتقرح المريئي

(Martindale Thirty-sixth edition) (الشامل في الأدوية السريرية)

مضادات المتفطرات

Clofazimine

الامتصاص يكون أعظمي عندما يؤخذ مباشرة بعد الطعام ,يؤخذ مع الطعام أو بعده مباشرة و ذلك للحصول على امتصاص أعظمي و للتخفيف من تأثيراته الجانبية الهضمية

(Martindale Thirty-sixth edition) (الشامل في الأدوية السريرية)

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

Ethambutol

إن وجود الطعام في المعدة لا يقلل امتصاص الإيتامبوتول بشكل مهم لكن تناول طعام غني بالدهن أو معدلات الحموضة يمكن أن يؤخر الامتصاص و يخفض التركيز المصلي الذروي ,يمكن أن يسبب هذا الدواء وهناً معدياً لذا يؤخذ مع الطعام

(Martindale Thirty-sixth edition) (الشامل في الأدوية السريرية)

Ethionamide

يؤخذ مع الطعام

(الشامل في الأدوية السريرية) (Martindale Thirty-sixth edition)

Isoniazid

يؤخذ على معدة فارغة لأن معدل الامتصاص و الكمية الممتصة
ينخفضان بوجود الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

Pyrazinamide

هناك دراسة بأن التوافر الحيوي للريفامبيسين و الإيزونيازيد لكن
ليس البيرازيناميد ينقص بوجود الطعام لكن هناك دراسة أخرى بأن
التركيز المصلي الذروي ينخفض قليلاً عندما يؤخذ البيرازيناميد مع
وجبة طعام عالية المحتوى من الدسم, و اقترح أن يؤخذ على معدة
فارغة (Martindale Thirty-sixth edition)

Rifabutin

إن الطعام يؤخر امتصاصه لكنه لا يؤثر على الكمية الممتصة ,
يؤخذ بغض النظر عن وجبات الطعام (في حال وجود مشاكل
هضمية يمكن تناوله مع الطعام)

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Rifampicin (Rifampin)

إن الطعام يؤخر و ينقص امتصاصه بشكل كبير لذا ينصح بتناوله على معدة فارغة للحصول على امتصاص أعظمي (على الرغم من أن تناوله بعد الطعام يخفف الأعراض الهضمية التي يسببها)

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

(Wilson and Gisvold's Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry eleventh edition)

Rifapentine

يتحسن امتصاصه حوالي 50% عندما يؤخذ مع الطعام كما أن تناوله مع الطعام يقلل التأثيرات الجانبية الهضمية الممكن حدوثها

(Martindale Thirty-sixth edition)

صادات أخرى

Chloramphenicol

يؤخذ على معدة فارغة و لكن يمكن تناوله مع الطعام إذا سبب انزعاجاً هضمياً فيما لو أخذ على معدة فارغة, قد ينقص هذا الدواء معدل امتصاص فيتامين ب12 عبر الأمعاء و قد يحتاج المريض الذي يتناوله لحمية غنية بفيتامينات ب2 و ب6 و ب12

(الشامل في الأدوية السريرية)

Fosfomycin Tromethamine

يمكن تناوله مع الطعام أو بعيداً عنه و ذلك بعد حل المسحوق بـ 120-90 مل من الماء قبل تناوله (الشامل في الأدوية السريرية)

Furazolidone

يجب تجنب الأطعمة الحاوية على التيرامين خلال فترة تناوله و خلال أربعة أيام التالية للتوقف عنه (الشامل في الأدوية السريرية)

Linezolid

صاد حيوي من زمرة أوكسازوليدون ,يؤخذ بغض النظر عن الطعام

يبدى هذا الدواء تأثيراً خفيفاً مثبطاً لخميرة المونو أمينو أوكسيداز لذا يجب تجنب تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالتيرامين

(British National Formulary 57) (Pocket Clinical Drug Reference)

(AHFS Drug Information)

Loracarbef

ينتمي لمجموعة Carbacephems المشابهة للسيفالوسبورينات

يؤخذ على معدة فارغة

(Martindale Thirty-sixth edition) (الشامل في الأدوية السريرية)

Methenamine

يؤخذ مع الطعام لتخفيف الانزعاج الهضمي الذي قد يسببه و يؤخذ

مع فيتامين س لحمضنة البول مع شرب كميات كبيرة من السوائل و
يجب تجنب الأطعمة المقلونة (مشتقات الحليب) بشكل مفرط أو
الأدوية التي تسبب ارتفاع PH البول
(الشامل في الأدوية السريرية)

Nitrofurantoin

إن تناوله مع الطعام يؤخر امتصاصه لكنه يزيد من توافره الحيوي
و يطيل مدة التراكيز العلاجية البولية لذا يؤخذ مع الطعام أو الحليب
من أجل زيادة توافره الحيوي و لتخفيف شدة تأثيراته الجانبية
الهضمية

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

(British National Formulary 57) (الشامل في الأدوية السريرية)

Nitroxoline

يؤخذ قبل الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

Telithromycin

لا يؤثر الطعام على امتصاص التيليتروميسين

(Martindale Thirty-sixth edition)

Tinidazole

يؤخذ مع أو بعد الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

مضادات الأولي Antiprotozoals

Atovaquone

إن التوافر الحيوي للمستحضرات الفموية السائلة أفضل من الأقراص و يتحسن التوافر الحيوي إذا أخذ مع الطعام و خصوصاً عالي الدسم لذا يؤخذ مع الطعام

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

(British National Formulary 57) (الشامل في الأدوية السريرية)

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

(Wilson and Gisvold's Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry eleventh edition)

Diiodohydroxyquinoline (iodoquinol)

يمكن تناوله مع الطعام أو الحليب لتخفيف الانزعاج الهضمي الذي قد يسببه

(الشامل في الأدوية السريرية)

Furazolidone

يجب تجنب الأطعمة الحاوية على التيرامين خلال فترة تناوله و خلال أربعة أيام التالية للتوقف عنه (الشامل في الأدوية السريرية)

Mepacrine

يؤخذ بعد الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

Nitazoxanide

إن امتصاصه يتحسن إذا أعطي مع الطعام لذا يؤخذ مع الطعام

(AHFS Drug Information) (Martindale Thirty-sixth edition)

Ornidazole

يؤخذ بعد الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

Secnidazole

يؤخذ مع الطعام لتخفيف عدم التحمل الهضمي

(الشامل في الأدوية السريرية)

Tenonitroazole

يؤخذ مع الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

Tinidazole

يؤخذ مع أو بعد الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

أدوية الملاريا Antimalarials

Artemether and Lumefantrine

يؤخذ مع الطعام , فالطعام يزيد التوافر الحيوي لهما
Artemether : يزداد توافره الحيوي ضعفين إلى ثلاثة أضعاف عند
تناوله بعد وجبة طعام عالية الدسم بالمقارنة مع تناوله على معدة
فارغة

Lumefantrine يزداد توافره الحيوي ستة عشر ضعفاً عند تناوله
بعد وجبة طعام عالية الدسم بالمقارنة مع تناوله على معدة فارغة

(AHFS Drug Information)

Chloroquine

يؤخذ مع الطعام لتخفيف الاضطرابات الهضمية التي يسببها كما أن
توافره الحيوي يزداد عند تناوله فمويّاً إذا أخذ مع الطعام و بعض
الأشربة

(Martindale Thirty-sixth edition) (الشامل في الأدوية السريرية)

Halofantrine

يزداد توافره الحيوي عندما يؤخذ مع أو بعد الطعام خصوصاً
الطعام عالي المحتوى من الدسم لذا يجب تجنب الطعام الدسم لمدة

24 ساعة و يجب ألا يؤخذ على معدة ممتلئة لأن ذلك يزيد خطر
السمية القلبية (Martindale Thirty-sixth edition)

Hydroxychloroquine Sulfate

يؤخذ مع الطعام أو الحليب

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Mefloquine Hydrochloride

لا يؤخذ على معدة فارغة بل يؤخذ معه كأس كبير من الماء على
الأقل (الشامل في الأدوية السريرية)

Primaquine Phosphate

يؤخذ مع الطعام للتخفيف من تأثيراته الجانبية الهضمية

(Martindale Thirty-sixth edition) (الشامل في الأدوية السريرية)

Proguanil Hydrochloride

يؤخذ بعد الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

Pyrimethamine

يؤخذ مع الطعام لتخفيف الإقياء الذي قد يسببه

(الشامل في الأدوية السريرية)

Quinine

(Pocket Clinical Drug Reference)

يؤخذ مع الطعام

طارادات الديدان Anthelmintics

Albendazole

إن امتصاصه من الجهاز الهضمي ضعيف و يزداد بنسبة 4-5
أضعاف عند تناوله مع وجبة دسمة لذا يؤخذ مع الطعام
(Martindale Thirty-sixth edition) (الشامل في الأدوية السريرية)
(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)
(Wilson and Gisvold's Textbook of Organic Medicinal and
Pharmaceutical Chemistry eleventh edition)

Ivermectin

يجب عدم تناول الطعام خلال ساعتين قبل أخذ الجرعة أو بعدها
(Martindale Thirty-sixth edition)

Mebendazole

يمكن تناوله مع الطعام فوجود الطعام في الجهاز الهضمي لا يؤثر
على عمل الدواء (الشامل في الأدوية السريرية) (AHFS Drug Information)

Oxamniquine

يفضل تناوله بعد الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

Piperazine

يؤخذ على معدة فارغة (الشامل في الأدوية السريرية)

Praziquantel

يؤخذ مع الطعام

(Martindale Thirty-sixth edition) (الشامل في الأدوية السريرية)

Pyrantel

يؤخذ كجرعة وحيدة بغض النظر عن الطعام (يمكن أن تمزج مع الطعام أو الحليب أو العصير أو تؤخذ على معدة فارغة)

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

(AHFS Drug Information)

Tiabendazole

يؤخذ بعد الطعام و يساعد شرب عصير الفواكه بطرد الدودة حيث أنه يزيل المخاط الذي تحيط به الدودة نفسها و الذي يساعدها بالالتصاق بجدار الأمعاء
(الشامل في الأدوية السريرية)

مضادات الفطور Antifungals

Fluconazole

إن امتصاصه لا يتأثر بتغير حموضة الجهاز الهضمي أو وجود الطعام, يؤخذ بغض النظر عن الطعام

(AHFS Drug Information)

(Wilson and Gisvold's Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry eleventh edition)

Flucytosine

إن الطعام يخفض معدل الامتصاص و ليس الكمية الممتصة ,يؤخذ مع الطعام

(الشامل في الأدوية السريرية) (AHFS Drug Information)

Griseofulvin

يزداد امتصاصه عند تناوله مع وجبة طعام دسمة ,يؤخذ مع أو بعد وجبات الطعام

(الشامل في الأدوية السريرية) (Martindale Thirty-sixth edition)

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

(Wilson and Gisvold's Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry eleventh edition)

Itraconazole

إن امتصاص الإيتراكونازول المحضر بشكل كبسولات يكون أعظمي عندما يؤخذ مع الطعام أما المحضر بشكل محلول فموي فإن امتصاصه أعظمي على معدة فارغة, لذا يؤخذ الكبسول مع الطعام أما المحلول يؤخذ بدون طعام

(AHFS Drug Information) (Martindale Thirty-sixth edition)

(Pocket Clinical Drug Reference)

Ketoconazole

يؤخذ مع الطعام حيث أن ذلك يقلل من الاضطرابات الهضمية التي يسببها

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Nystatin

يجب أن يبقى الدواء ملامساً للمنطقة المصابة أطول فترة ممكنة لذا يجب تجنب تناول الطعام أو الشراب خلال ساعة من أخذ الجرعة

(Martindale Thirty-sixth edition)

Posaconazole

يزداد توافره الحيوي بوجود الطعام, يؤخذ مع وجبة طعام كاملة لتحسين امتصاصه

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

Terbinafine

يزداد توافره الحيوي عند تناوله مع الطعام لكن ذلك ليس له أهمية سريرية, يمكن رش الحثيرات على طعام رخو غير حامض

(AHFS Drug Information) (Pocket Clinical Drug Reference)

Voriconazole

تعطى جرعة الفموية قبل الطعام بساعة على الأقل أو بعده بساعة

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

(الشامل في الأدوية السريرية)

مضادات الفيروسات Antivirals

Abacavir

إن الطعام يؤخر الامتصاص بعض الشيء لكن الكمية الممتصة لا تتأثر, يمكن تناوله مع الطعام أو بدونه

(الشامل في الأدوية السريرية) (Martindale Thirty-sixth edition)

Acyclovir

إن الطعام لا يؤثر على امتصاصه, يؤخذ بغض النظر عن الطعام

(الشامل في الأدوية السريرية) (AHFS Drug Information)

Adefovir

يتأخر امتصاصه عندما يؤخذ مع الطعام لكنه لا ينقص م يؤخذ

بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Amprenavir

ينقص توافره الحيوي عند تناوله مع طعام عالي الدسم, يؤخذ بغض النظر عن الطعام لكن يجب تجنب الطعام عالي الدسم حتى لا ينقص

امتصاصه (AHFS Drug Information)

Atazanavir

إن توافره الحيوي يتحسن إذا أخذ مع الطعام, يؤخذ مع الطعام

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Cidofovir

يؤخذ مع البروبنسيد (يؤخذ مزيج سيدوفوفير و البروبنسيد بعد الطعام للتخفيف من الغثيان و الإقياء الممكن أن يسببهما البروبنسيد)

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Darunavir

إن الطعام يزيد التوافر الحيوي للدواء, يؤخذ مع الطعام

(Martindale Thirty-sixth edition) (Pocket Clinical Drug Reference)

Delavirdine mesylate

يؤخذ بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Didanosine

عند تناوله مع الطعام تنخفض تراكيزه المصلية بنسبة 50% لذا يؤخذ على معدة فارغة

(British National Formulary 57) (Martindale Thirty-sixth edition)

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

(Wilson and Gisvold's Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry eleventh edition)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Efavirenz

يزداد توافره الحيوي عند تناوله بعد وجبة طعام عالية الدسم لكن تأثيراته الجانبية تزداد عند تناوله مع الطعام و ذلك بسبب ارتفاع التراكيز البلازمية للدواء لذا يؤخذ على معدة فارغة و يفضل وقت النوم لأن ذلك يخفف التأثيرات الجانبية على الـ CNS

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

Emtricitabine

يؤخذ بغض النظر عن الطعام

(AHFS Drug Information)

Etravirine

يزيد امتصاصه بوجود الطعام بحوالي 50% لذا يؤخذ بعد الطعام

(British National Formulary 57) (Martindale Thirty-sixth edition)

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

Famciclovir

يتأخر امتصاصه بوجود الطعام لكنه لا ينقص, يمكن تناوله مع الطعام أو بدونه

(الشامل في الأدوية السريرية) (Martindale Thirty-sixth edition)

Fosamprenavir calcium

يؤخذ بغض النظر عن الطعام

(AHFS Drug Information)

Ganciclovir

يبلغ توافره الحيوي بعد تناوله فموياً على معدة فارغة 5% و يزداد بوجود الطعام لـ 6-9% و يبلغ حوالي 28-31 % عند تناوله بعد وجبة دسمة, لذا يؤخذ مع الطعام لزيادة امتصاصه

(Martindale Thirty-sixth edition) (Pocket Clinical Drug Reference)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Indinavir

ينخفض الامتصاص عند تناوله مع وجبة طعام ذات محتوى عالي من (السعرات الحرارية,الدهن,البروتين) لكنه يكون أقل تأثيراً عند تناوله مع وجبة طعام خفيفة, يؤخذ قبل الطعام بساعة أو بعده بساعتين أو مع وجبة طعام خفيفة قليلة الدهن

(Martindale Thirty-sixth edition) (British National Formulary 57)

Lamivudine

يؤخذ بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Lopinavir

يتحسن توافره الحيوي عندما يؤخذ مع وجبة طعام عالية الدهن, الأقراص الملبسة بالفلم تؤخذ مع الطعام أو بدونه أما السوفت كبسول و المحلول تؤخذ مع الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

Nelfinavir

يتحسن امتصاصه عند تناوله مع الطعام لذا يؤخذ مع الطعام , إن المستحضر المحضر على شكل مسحوق فموي يجب ألا يؤخذ مع الأطعمة أو الأشربة الحامضية لأن ذلك ينتج عنه طعم مر

(الشامل في الأدوية السريرية) (Martindale Thirty-sixth edition)

Nevirapine

لا يتأثر الامتصاص بوجود الطعام أو مضادات الحموضة لذا يمكن تناوله مع الطعام أو بدونه

(AHFS Drug Information) (Martindale Thirty-sixth edition)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Oseltamivir

إن تناول الأوسيلتاميفير فوسفات مع الطعام ليس له تأثير على التراكيز المصلية الذروية أو الـ AUC للأوسيلتاميفير كاربوكسيلات

يؤخذ بغض النظر عن الطعام لكن تناول مع الطعام يحسن من تحمله الهضمي

(AHFS Drug Information)

Raltegravir

يؤخذ مع أو بدون طعام (Martindale Thirty-sixth edition)

Rimantadine hydrochloride

ليس للطعام تأثير مهم على امتصاص الريمانتادين

(AHFS Drug Information)

Ritonavir

إن امتصاصه يتحسن عندما يؤخذ مع الطعام كما أنه يتعلق بالجرعة, يؤخذ مع الطعام

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Saquinavir

يمكن للطعام و لاسيما الغني بالدسم أن يزيد معدل امتصاصه
لخمسة أضعاف لذا يؤخذ خلال ساعتين من تناول وجبة طعام كاملة

(الشامل في الأدوية السريرية) (Pocket Clinical Drug Reference)

Stavudine

يؤخذ بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Telbivudine

لا يتأثر امتصاصه بوجود الطعام, يؤخذ بغض النظر عن وجبات
الطعام

(Martindale Thirty-sixth edition)

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

Tenofovir disoproxil fumarate

يبلغ توافره الحيوي على معدة فارغة 25% لكنه يتحسن عندما
يؤخذ مع وجبة طعام عالية الدسم لذا يؤخذ مع الطعام

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

Tipranavir

إن الطعام يزيد من تحمله و يزداد توافره الحيوي عند تناوله مع
وجبة عالية الدسم, يؤخذ مع الطعام

(Martindale Thirty-sixth edition)

Valaciclovir

يؤخذ بغض النظر عن الطعام (Pocket Clinical Drug Reference)

Valganciclovir

يؤخذ مع الطعام

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

Zalcitabine

ينقص معدل امتصاصه بنسبة 39% عند تناوله مع الطعام, يفضل تناوله على معدة فارغة (الشامل في الأدوية السريرية)

Zidovudine

يتأخر الامتصاص عندما يؤخذ مع الطعام لكن التوافر الحيوي لا يتأثر, يؤخذ بغض النظر عن الطعام, لتخفيف أذية المري يؤخذ بوضعية قائمة مع شرب كمية كافية من السوائل (120 مل على الأقل)

(AHFS Drug Information) (Martindale Thirty-sixth edition)

الأدوية القلبية الوعائية Cardiovascular Drugs

حاصرات بيتا

Acebutolol

ينقص الطعام من معدل امتصاصه (السرعة) بشكل قليل و ينقص التركيز المصلي الذروي للأسيتوبوتولول و مستقبله الرئيسي (diacetolol) , لكن الكمية الممتصة لا تتأثر بشكل هام , يمكن تناوله بعيداً عن وجبات الطعام (الشامل في الأدوية السريرية) (AHFS Drug Information)

Atenolol

يؤخذ بغض النظر عن الطعام (الشامل في الأدوية السريرية)

Betaxolol Hydrochloride

لا يتأثر امتصاصه من الجهاز الهضمي بالطعام (AHFS Drug Information)

Bisoprolol Fumarate

لا يتأثر امتصاصه بوجود الطعام , يؤخذ بغض النظر عن وجبات الطعام (الشامل في الأدوية السريرية) (AHFS Drug Information)

Carteolol Hydrochloride

يمكن تناوله بغض النظر عن الطعام (الشامل في الأدوية السريرية)

Carvedilol

يؤخذ مع الطعام لتخفيض خطر الإصابة بانخفاض الضغط
الشرياني حيث أن الطعام يخفض من معدل الامتصاص دون أن
يؤثر على الكمية الممتصة

(Martindale Thirty-sixth edition) (Pocket Clinical Drug Reference)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Celiprolol

يؤخذ قبل الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

Labetalol Hydrochloride

يتأخر امتصاصه بوجود الطعام لكن توافره الحيوي يزداد و ذلك من
المحتمل بسبب إنقاص الاستقلاب بالمرور الأول و/ أو التدفق
الدموي الكبدي

في دراسة أجريت بعد تناول جرعة وحيدة 200مغ من اللابيتالول
فموياً تبين أن متوسط توافره الحيوي المطلق عند تناوله على معدة
فارغة كان 26% و في حال وجود الطعام 36% , يؤخذ مع الطعام

(British National Formulary 57) (AHFS Drug Information)

(Martindale Thirty-sixth edition)

Metoprolol

يتحسن التوافر الحيوي للميتوبرولول تترتات بتناوله مع الطعام,
ينصح بتناوله مع الطعام أو بعده مباشرة
إن الطعام لا يؤثر على التوافر الحيوي للميتوبرولول سوكسينات في

الأقراص مديدة التحرر (AHFS Drug Information)

Nadolol

إن وجود الطعام لا يؤثر على معدل الامتصاص أو الكمية الممتصة

(AHFS Drug Information)

Nebivolol

يؤخذ بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Pindolol

لا يتأثر توافره الحيوي بالطعام, فالطعام يزيد معدل الامتصاص و

ليس الكمية الممتصة

(AHFS Drug Information)

Propranolol

تؤخذ الأقراص العادية قبل وجبات الطعام و وقت النوم

(AHFS Drug Information)

Sotalol Hydrochloride

ينخفض معدل امتصاصه بنسبة 20-30% عند تناوله مع الطعام

(الشامل في الأدوية السريرية)

timolol maleate

إن امتصاصه لا ينقص بوجود الطعام

(AHFS Drug Information)

مثبطات الأنزيم المحول للأنجوتنسين

إن هذه الأدوية ترفع بوتاسيوم الدم لذا يجب الحذر عند تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز و البرتقال أو مستحضرات البوتاسيوم أو الأدوية الأخرى التي ترفع بوتاسيوم الدم

Benazepril

لا يؤثر الطعام على امتصاصه بشكل ملحوظ ,يمكن تناوله بغض النظر عن وجبات الطعام
يخضع لاستقلاب شديد و سريع في الكبد حيث يتشكل مستقلب فعال هو بينازيبيريلات و الذي يبلغ عمره النصفى 1,5 – 2 ساعة إذا تناوله المريض على معدة فارغة و 2-4 ساعات إذا تناوله بعد الطعام (الشامل في الأدوية السريرية)

Captopril

ينقص الطعام من امتصاصه بنسبة 30-40% لذا يؤخذ على معدة فارغة
(Pocket Clinical Drug Reference)(الشامل في الأدوية السريرية)

Enalapril

لا يؤثر الطعام على امتصاص اليناالابريل ,يؤخذ بغض النظر عن الطعام
تؤخذ الأقراص الحاوية على اينالابريل مع فيلوديبين بدون طعام أو مع وجبة طعام خفيفة و ذلك لأن تناولها مع وجبة طعام كبيرة يزيد

التراكيز المصلية الذروية للفيلودييين (AHFS Drug Information)

Fosinopril

إن تناوله مع الطعام ينقص معدل الامتصاص و ليس الكمية
المتصة , يمكن تناوله مع الطعام
(AHFS Drug Information) (الشامل في الأدوية السريرية)

imidapril hydrochloride

يتمص بنسبة 70% و ينخفض الامتصاص بوجود الطعام لذا يؤخذ
قبل الطعام
(Martindale Thirty-sixth edition) (British National Formulary 57)

Lisinopril

يتمص جيداً عبر الجهاز الهضمي و لا يتأثر امتصاصه بوجود
الطعام
(الشامل في الأدوية السريرية)(AHFS Drug Information)

Moexipril

ينخفض توافره الحيوي بوجود الطعام لذا يؤخذ على معدة فارغة
(Martindale Thirty-sixth edition) (Pocket Clinical Drug Reference)
(AHFS Drug Information) (الشامل في الأدوية السريرية)

Quinapril Hydrochloride

إن معدل الامتصاص و الكمية الممتصة ينخفضان حوالي 25-
30% عند تناوله مع وجبة طعام عالية الدسم
عند تناول مزيج كينابريل هيدروكلوريد و هيدروكلوروتيازيد مع
وجبة طعام دسمة تبين أن معدل الامتصاص للكينابريل ينخفض
حوالي 14% و معدل الامتصاص للهيدروكلوروتيازيد ينخفض

حوالي 12% مقارنة بتناوله على معدة فارغة أما الكمية الممتصة لا تتأثر لذا يمكن تناول هذا المزيج بغض النظر عن الطعام
(AHFS Drug Information)

Ramipril

إن معدل الامتصاص و ليس الكمية الممتصة ينخفض بتناول هذا الدواء مع الطعام
(AHFS Drug Information)

Trandolapril

إن معدل الامتصاص و ليس الكمية الممتصة ينخفض بتناول هذا الدواء مع الطعام, يمكن تناوله بغض النظر عن الطعام
(AHFS Drug Information)

حاصرات مستقبلات الأنجوتنسين 2

Candesartan cilexetil

يؤخذ بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Eprosartan Mesilate

يؤخر الطعام من امتصاصه لكن ذلك ليس له أهمية سريرية , يؤخذ بغض النظر عن الطعام
(Martindale Thirty-sixth edition) (AHFS Drug Information)

Irbesartan

إن توافره الحيوي بعد تناوله فموياً لا يتأثر بالطعام لذا يمكن تناوله بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Losartan Potassium

إن الطعام ينقص معدل الامتصاص و التراكيز الذروية لكن مقدار التأثير غير مهم سريرياً (AHFS Drug Information)

Olmesartan medoxomil

يؤخذ بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Telmisartan

على الرغم من أن الطعام قد يخفض التوافر الحيوي للتيلميسارتان لكن المصنعونذكروا بأن هذا الدواء يمكن تناوله بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Valsartan

على الرغم من أن الطعام قد يخفض معدل الامتصاص و الكمية الممتصة لكن المصنعونذكروا بأن هذا الدواء يمكن تناوله بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

حاصرات قنوات الكالسيوم

Amlodipine

لا يؤثر الطعام على امتصاصه ,يؤخذ دون اعتبار لوجبات الطعام (Martindale Thirty-sixth edition) (AHFS Drug Information)

Bepiridil

إن تناوله بعد الطعام ينقص معدل الامتصاص و ليس الكمية
المتتصة لذا يمكن تناوله بغض النظر عن الطعام
(AHFS Drug Information)

Felodipine

إن التراكيز الذروية للدواء ترتفع حوالي 60% عندما يعطى
الفيلوديبيين مع وجبة طعام غنية بالدهن أو الكربوهيدرات و لم
يلاحظ تغيرات على الحرائك الدوائية عند تناوله مع وجبة طعام
خفيفة لذا يذكر المصنعون أن الفيلوديبيين يجب أن يؤخذ بدون طعام
أو مع وجبة خفيفة (AHFS Drug Information)

Isradipine

بشكل عام يمكن تناول conventional capsules و extended-
release core tablets بغض النظر عن الطعام
فعند تناول conventional capsules مع الطعام ينقص معدل
الامتصاص و ليس الكمية المتتصة (يتأخر التركيز البلازمي
الذروي حوالي ساعة) أما عند تناول extended-release core
tablets مع الطعام فإن الكمية المتتصة تنخفض بحدود 25%
(AHFS Drug Information)

Nicardipine

إن وجبة الطعام عالية الدهن تنقص التوافر الحيوي للكبسولات
العادية و المدينة التحرر (AHFS Drug Information)

Nimodipine

إن وجود الطعام ينقص الكمية المتتصة بشكل هام
(AHFS Drug Information)

Nisoldipine

تؤخذ مستحضراته معدلة التحرر على معدة فارغة و يجب ألا يؤخذ مع وجبة طعام عالية الدسم لأن ذلك يرفع تركيزه المصلي الذروي بشدة

(Martindale Thirty-sixth edition) (Pocket Clinical Drug Reference)
(الشامل في الأدوية السريرية)

حاصرات ألفا 1 الانتقائية

Doxazosin

ينقص الطعام متوسط التراكيز المصلية الذروية بمقدار 18% و ينقص الـ AUC بمقدار 12% لكن ذلك ليس له أهمية سريرية
(AHFS Drug Information)

Prazosin

تشير دراسة أن وجود الطعام يؤخر الامتصاص عند بعض المرضى لكن الكمية الممتصة لا تتأثر, إن تناوله مع الطعام يخفف من حدوث انخفاض الضغط و الدوخة عند بعض المرضى
(AHFS Drug Information)

Terazosin

إن الطعام له تأثير صغير على الكمية الممتصة و يؤخر التركيز المصلي الذروي حوالي 40 دقيقة (AHFS Drug Information)

مضادات اضطراب النظم

Amiodarone

إن الطعام يرفع من معدل الامتصاص و الكمية الممتصة, يؤخذ مع الطعام

(Martindale Thirty-sixth edition) (الشامل في الأدوية السريرية)

Dofetilide

تستعمل الأطعمة التي تثبط الايزوزيم CYP3A4 من أنزيمات السيتوكروم p450 بحذر مع هذا الدواء و ذلك لأنه يستقلب بهذا الايزوزيم (مثل عصير فاكهة الكريب) , يؤخذ بغض النظر عن الطعام

(Martindale Thirty-sixth edition) (AHFS Drug Information)

Encainide hydrochloride

إن معدل الامتصاص ينخفض قليلاً بوجود الطعام لكن الكمية الممتصة لا تتأثر, يمكن تخفيف بعض تأثيراته الجانبية بتناوله مع الطعام

(AHFS Drug Information)

Flecainide

إن امتصاصه لا يتأثر بوجود الطعام أو مضادات الحموضة لكن الحليب يعيق امتصاصه عند الأطفال, فالأطفال الذين يأخذون جرعة عالية من الفليكينايد و يعتمدون على الحليب في غذائهم يجب تخفيض الجرعة إذا أوقفوا الحليب أو تم استبداله

(Martindale Thirty-sixth edition)

Mexiletine Hydrochloride

يؤخذ مع الطعام و يتبع بشرب كمية كبيرة من السوائل لتجنب
الإصابة بالتقرح المريئي

(Martindale Thirty-sixth edition) (Pocket Clinical Drug Reference)
(الشامل في الأدوية السريرية)

Moracizine(Moricizine)

يؤخذ على معدة فارغة و ليس مع الطعام لئلا يضطرب و يتأخر
امتصاصه (الشامل في الأدوية السريرية)

Procainamide hydrochloride

يتباطأ امتصاصه بوجود الطعام في الجهاز الهضمي
(AHFS Drug Information)

Quinidine

يمكن تقليل تأثيراته الجانبية الهضمية بتناول الجرعة الفموية مع
الطعام أو مضادات الحموضة لكن ذلك قد يؤخر الامتصاص كما
يجب الانتباه أن مضادات الحموضة و الأطعمة التي تقلون البول
تنقص طرح الكينيدين

إن عصير فاكهة الكريب يؤخر امتصاصه و يثبط استقلاب
الكينيدين إلى 3 هيدروكسي كينيدين في الأمعاء لذا يجب تجنبه
(AHFS Drug Information) (Pocket Clinical Drug Reference)

Tocainide

يمكن تجنب بعض تأثيراته الجانبية بتناوله مع الطعام, فمعدل
الامتصاص و ليس الكمية الممتصة يتأثر بوجود الطعام فعند تناوله
بعد فترة قصيرة من الطعام ينقص التركيز المصلي الذروي و
يتأخر الزمن اللازم للوصول إليه (AHFS Drug Information)

أدوية الشحوم

Acipimox

يؤخذ مع وجبات الطعام

(الشامل في الأدوية السريرية) (Martindale Thirty-sixth edition)

Benfluorex

يؤخذ مع وجبات الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

Bezafibrate

يؤخذ مع أو بعد الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

Clofibrate

يمكن تناوله مع الطعام لتخفيف عسرة الهضم التي قد يسببها
(الشامل في الأدوية السريرية)

Colesevelam Hydrochloride

يؤخذ مع الطعام و ذلك لأن الكوليستييفيلام يرتبط بالصفراء التي يتم
إفرازها أثناء الطعام

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

(Pharmacotherapy handbook Eighth Edition) (AHFS Drug Information)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Ezetimibe

يؤخذ مع الطعام أو بدونه

(AHFS Drug Information) (Pharmacotherapy handbook Eighth Edition)

Fenofibrate

يؤخذ مع الطعام لتحسين توافره الحيوي لكن ذلك ليس ضرورياً في

بعض المستحضرات (Martindale Thirty-sixth edition)

Gemfibrozil

يؤخذ قبل الطعام بنصف ساعة لأن ذلك يرفع من توافره الحيوي
(Martindale Thirty-sixth edition) (Pocket Clinical Drug Reference)
(الشامل في الأدوية السريرية) (AHFS Drug Information)

Probucol

يؤخذ مرتين يومياً مع وجبات الطعام (الشامل في الأدوية السريرية)

الستاتينات

تؤخذ أغلب الستاتينات بغض النظر عن الطعام (يؤخذ اللوفاستاتين
مع وجبة الطعام المسائية لزيادة الامتصاص)
(AHFS Drug Information)

Atorvastatin

إن الطعام يمكن أن يخفض التوافر الحيوي للأتورفاستاتين لكن ذلك
لا يؤثر على فعاليته الخافضة للشحوم, يؤخذ بغض النظر عن
الطعام (AHFS Drug Information)

Fluvastatin

يؤخذ مساءً بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Lovastatin

يؤخذ مع الطعام

(الشامل في الأدوية السريرية) (Martindale Thirty-sixth edition)

Pravastatin

يؤخذ بغض النظر عن الطعام و في أي وقت من اليوم
(AHFS Drug Information)

Rosuvastatin

يؤخذ بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Simvastatin

إن امتصاصه من الجهاز الهضمي لا يتأثر بشكل هام عندما يؤخذ
مباشرة قبل وجبة طعام خفيفة الدسم (AHFS Drug Information)

المدرات

Acetazolamide

لا يؤثر الطعام على امتصاص الكبسولات مديدة التحرر ,يؤخذ مع
الطعام (AHFS Drug Information) (الشامل في الأدوية السريرية)

Benzthiazide

يمكن تناوله مع الطعام أو مع الحليب (الشامل في الأدوية السريرية)

Bumetanide

يمكن تناوله مع الطعام أو الحليب (الشامل في الأدوية السريرية)

Chlorothiazide

يمكن تناوله مع الطعام أو الحليب (الشامل في الأدوية السريرية) إن تناوله

مع الطعام يزيد الكمية الممتصة (AHFS Drug Information)

Chlortalidone

يمكن تناوله مع الطعام أو الحليب (الشامل في الأدوية السريرية)

Etacrynic Acid

يؤخذ مع الطعام

(Martindale Thirty-sixth edition) (الشامل في الأدوية السريرية)

Furosemide

لا يؤثر الطعام على فعاليته المدرّة (AHFS Drug Information)

Hydrochlorothiazide

يمكن تناوله مع الحليب أو الطعام (الشامل في الأدوية السريرية)

Indapamide

إن امتصاصه لا يتأثر بشكل هام بوجود الطعام أو مضادات

الحموضة (AHFS Drug Information)

Metolazone

يؤخذ صباحاً مع الطعام (Pocket Clinical Drug Reference)

Polythiazide

يمكن تناوله مع الطعام أو الحليب (الشامل في الأدوية السريرية)

Quinethazone

يمكن تناوله مع الحليب أو الطعام (الشامل في الأدوية السريرية)

Torase mide

إن الطعام ينقص معدل الامتصاص و ليس الكمية الممتصة ,يؤخذ
بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Trichlormethiazide

يمكن تناوله مع الطعام أو الحليب (الشامل في الأدوية السريرية)

المدرات الحافظة

Amiloride

يبلغ توافره الحيوي 50% و ينخفض بوجود الطعام, لكن تناوله مع
الطعام أو الحليب يقلل من تأثيراته الجانبية الهضمية (إن الأميلوريد
من المدرات الحافظة للبوتاسيوم لذا يجب تجنب الأطعمة الحاوية
على كمية كبيرة من البوتاسيوم مثل الموز و البرتقال)
(Martindale Thirty-sixth edition) (Pocket Clinical Drug Reference)
(الشامل في الأدوية السريرية)

Spironolactone

يزداد معدل امتصاصه عند تناوله مع الطعام , يؤخذ مع الطعام و
يجب تجنب الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم أو مستحضراته خلال فترة
استخدام السبيرونولاكتون
(Pocket Clinical Drug Reference) (الشامل في الأدوية السريرية)

Triamterene

يؤخذ بعد الفطور و الغداء و يجب تجنب الأطعمة الغنية
بالبوتاسيوم أو مستحضراته خلال فترة استخدام التريامترين

(British National Formulary 57) (Martindale Thirty-sixth edition)
(الشامل في الأدوية السريرية)

مضادات التخثر ومضادات الصفائح

Cilostazol

يؤخذ قبل الطعام بنصف ساعة على الأقل أو بعده بساعتين
(British National Formulary 57) (Martindale Thirty-sixth edition)
(الشامل في الأدوية السريرية)

Clopidogrel Bisulfate

يؤخذ بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Dabigatran Etexilate

يؤخر الطعام من الزمن اللازم للوصول للتركيز الذروي لكن
التوافر الحيوي لا يتأثر
(Martindale Thirty-sixth edition)

Dicoumarol

يزداد توافره الحيوي بوجود الطعام
(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

Dipyridamole

يفضل تناوله على معدة فارغة
(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)
(Martindale Thirty-sixth edition) (AHFS Drug Information)

Pentosan Polysulfate Sodium

يؤخذ مع الماء قبل ساعة من وجبة الطعام أو بعدها بساعتين
(الشامل في الأدوية السريرية)

Prasugrel

يؤخذ بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Ticlopidine

يؤخذ مع الطعام لتحسين امتصاصه و لتقليل التأثيرات الجانبية
الهضمية

(Martindale Thirty-sixth edition) (Pocket Clinical Drug Reference)
(الشامل في الأدوية السريرية) (AHFS Drug Information)

Warfarin

تشير الدراسات أن وجود الطعام في الجهاز الهضمي ينقص معدل
الامتصاص و ليس الكمية الممتصة

إن الأطعمة الغنية بفيتامين ك تنقص فعالية الوارفارين المضادة
للتخثر (Pocket Clinical Drug Reference) (AHFS Drug Information)

أدوية أخرى

Aliskiren Fumarate

ينخفض امتصاصه بشكل هام عند تناوله مع وجبة طعام عالية
الدهن. يؤخذ قبل أو بعد الطعام لكن المرضى يجب أن يقيموا نمط
روتيني فيما يتعلق بوجبات الطعام

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

Ambrisentan

لا يؤثر الطعام على امتصاصه, يؤخذ بغض النظر عن وجبات الطعام (AHFS Drug Information)

Bosentan

يؤخذ بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Digoxin

يؤخر الطعام امتصاصه لكنه لا يؤثر على الكمية الممتصة (Martindale Thirty-sixth edition) (الشامل في الأدوية السريرية)

Eplerenone

لا يؤثر الطعام على امتصاصه, يؤخذ بغض النظر عن وجبات الطعام (AHFS Drug Information)

Hydralazine

يزداد توافره الحيوي بتناوله مع الطعام (الشامل في الأدوية السريرية)

isosorbide dinitrate

على الرغم من أن الطعام ينقص متوسط التراكيز المصلية الذروية بشكل هام إلا أن التوافر الحيوي الكلي لا يتأثر (AHFS Drug Information)

Ivabradine

يبلغ التركيز المصلي الذروة بعد حوالي ساعة عند تناوله على معدة فارغة و بوجود الطعام يتأخر حوالي ساعة و تزداد الكمية الممتصة بمقدار 20-30%, يؤخذ مع الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

Glyceryl Trinitrate (Nitroglycerin)

تؤخذ أقراصه الفموية على معدة فارغة مع كأس كامل من الماء
(الشامل في الأدوية السريرية) (Pocket Clinical Drug Reference)

Mecamylamine Hydrochloride

يؤخذ بعد الطعام مباشرة و بنفس المواعيد كل يوم
(الشامل في الأدوية السريرية)

Pentoxifylline

يؤخذ مع وجبات الطعام لتخفيف الاضطرابات الهضمية التي يسببها
(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)
(الشامل في الأدوية السريرية) (AHFS Drug Information)

Reserpine

يؤخذ مع الحليب أو الطعام
(الشامل في الأدوية السريرية)

Sitaxentan

إن الطعام عالي الدسم يؤخر من امتصاصه لكن الكمية الممتصة لا
تتأثر (Martindale Thirty-sixth edition)

المسكنات المضادة للالتهاب و مضادات الحمى

الساليسيلات

إن الطعام ينقص معدل الامتصاص للساليسيلات المتناولة فمويًا و ليس الكمية الممتصة , يفضل تناولها مع الطعام أو كمية كبيرة (240مل) من الماء أو الحليب لتقليل الانزعاج الهضمي

(AHFS Drug Information)

مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية الأخرى

Acemetacin

يؤخذ مع الطعام (British National Formulary 57)

Celecoxib

يزداد توافره الحيوي عند تناوله مع وجبة طعام عالية الدسم
يذكر المصنعون أن السيليكوكسيب بجرعات حتى 200مغ مرتين
باليوم يؤخذ بغض النظر عن الطعام أما الجرعات الأعلى (400مغ
مرتين باليوم) يؤخذ مع الطعام لتحسين الامتصاص

(AHFS Drug Information)

Dexketoprofen

على الرغم من أنه ينصح بأخذ مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية بعد الطعام لتخفيف التأثيرات الهضمية الناجمة عنها ينصح بتناول ديكسكيتوبروفين قبل الطعام بنصف ساعة على الأقل في حال الألم الحاد و ذلك لأن امتصاصه يتأخر إذا أخذ مع الطعام

(Martindale Thirty-sixth edition)

Diclofenac

لا تتأثر الكمية الممتصة بشكل هام بوجود الطعام ,يؤخذ مع الطعام أو الحليب لتخفيف تأثيراته الجانبية الهضمية

(AHFS Drug Information) (Pocket Clinical Drug Reference)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Etodolac

إن الكمية الممتصة لا تتأثر بشكل هام بتناوله مع الطعام ,يؤخذ مع الطعام أو الحليب أو الماء

(AHFS Drug Information) (الشامل في الأدوية السريرية)

Etoricoxib

يمتص بشكل جيد بعد تناوله فمويًا , يصل التركيز المصلي لذروته بعد حوالي ساعة من تناوله على معدة فارغة عند الشخص البالغ و يؤخر الطعام الامتصاص بحوالي ساعتين لكنه لا يؤثر على الكمية الممتصة

(Martindale Thirty-sixth edition)

Fenoprofen

إن الطعام و الحليب يخفضان من معدل الامتصاص و الكمية

المتتصة ,يؤخذ مع الطعم لتخفيف تأثيراته الجانبية الهضمية

(الشامل في الأدوية السريرية) (British National Formulary 57)

(AHFS Drug Information) (Martindale Thirty-sixth edition)

Flurbiprofen

إن تناوله مع الطعم يغير معدل الامتصاص و لا يغير الكمية

المتتصة ,يؤخذ مع الطعم للتخفيف من تأثيراته الهضمية

(الشامل في الأدوية السريرية) (AHFS Drug Information)

Ibuprofen

ينقص الطعم من سرعة امتصاصه لكن ذلك لا يؤثر على الكمية

المتتصة , يؤخذ مع الطعم أو الحليب لتخفيف تأثيراته الجانبية الهضمية

(الشامل في الأدوية السريرية) (AHFS Drug Information)

Indometacin

ينقص الطعم معدل امتصاصه دون أن يؤثر على الكمية المتتصة

,يؤخذ مع الطعم لتخفيف تأثيراته الجانبية الهضمية

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

(الشامل في الأدوية السريرية) (Pocket Clinical Drug Reference)

Ketoprofen

لا يتغير توافره الحيوي عندما يؤخذ مع الطعم لكن معدل

الامتصاص يتباطأ ,يؤخذ مع الطعم لتقليل تأثيراته الجانبية الهضمية

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

(الشامل في الأدوية السريرية) (AHFS Drug Information)

Ketorolac tromethamine

لا تتأثر الكمية الممتصة عند تناوله مع الطعام لكن معدل الامتصاص ينخفض (AHFS Drug Information)

Meclofenamic acid (Meclofenamate Sodium)

إن الطعام ينقص معدل الامتصاص و الكمية الممتصة, يؤخذ مع الطعام أو الحليب لتخفيف تأثيراته الجانبية الهضمية (الشامل في الأدوية السريرية) (AHFS Drug Information)

Mefenamic Acid

يؤخذ مع الطعام أو الحليب لتخفيف تأثيراته الجانبية الهضمية (الشامل في الأدوية السريرية) (AHFS Drug Information)

Naproxen

يخفض الطعام من معدل امتصاصه لكنه لا يؤثر على الكمية الممتصة, إن تناوله مع الطعام أو الحليب يقلل من تأثيراته الجانبية الهضمية

(Martindale Thirty-sixth edition) (AHFS Drug Information)
(الشامل في الأدوية السريرية)

Oxaprozin

ينخفض معدل الامتصاص و ليس الكمية الممتصة عند تناوله مع الطعام, يؤخذ مع الطعام

(Pocket Clinical Drug Reference) (AHFS Drug Information)

Piroxicam

إن الطعام ينقص معدل الامتصاص و ليس الكمية الممتصة ,يؤخذ مع الطعام (AHFS Drug Information) (Pocket Clinical Drug Reference) (الشامل في الأدوية السريرية)

Rofecoxib

تؤخذ الأقراص بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Sulindac

إن تناوله مع الطعام يخفض معدل الامتصاص و الكمية الممتصة لكنه يؤخذ مع الطعام لتخفيف تأثيراته الجانبية الهضمية (AHFS Drug Information) (Pocket Clinical Drug Reference) (الشامل في الأدوية السريرية)

Tenoxicam

يصل التركيز المصلي للذروة خلال ساعتين من تناوله على معدة فارغة و يتأخر إلى 6 ساعات إذا أخذ مع الطعام لكن ذلك لا يؤثر على الكمية الممتصة (Martindale Thirty-sixth edition)

Tiaprofenic Acid

يؤخذ مع الحليب أو الطعام (الشامل في الأدوية السريرية)

Tolmetin

ينقص معدل توافره الحيوي بنسبة 16% عند تناوله مع الطعام أو الحليب , يؤخذ مع الطعام أو الحليب لتقليل تأثيراته الجانبية الهضمية (الشامل في الأدوية السريرية) (AHFS Drug Information)

Valdecoxib

يؤخذ بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

المسكنات الأفيونية

Dextropropoxyphene (Propoxyphene)

يمكن تناوله مع الطعام حيث أن ذلك يزيد توافره الحيوي لكن سرعة الامتصاص تتباطأ

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Dihydrocodeine Tartrate

يؤخذ بعد الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

Hydromorphone Hydrochloride

يؤخذ مع الطعام للتخفيف من عسرة الهضم التي قد يسببها

(الشامل في الأدوية السريرية)

Oxycodone

ليس للطعام تأثير هام على الكمية الممتصة للأقراص مديدة التحرر، تزداد الكمية الممتصة للمحلول الفموي عند تناوله مع وجبة طعام عالية الدسم بنسبة 27% لكن معدل الامتصاص لا يتأثر

(AHFS Drug Information)

Oxymorphone Hydrochloride

يزداد امتصاصه بعد وجبة غنية بالدهن, المستحضرات الفموية
يجب أن تؤخذ على معدة فارغة (Martindale Thirty-sixth edition)

Pentazocine

يفضل تناوله بعد الطعام

(British National Formulary 57) (Martindale Thirty-sixth edition)

Tramadol

إن الطعام لا يؤثر بشكل هام على معدل الامتصاص و الكمية
المتصة عندما يؤخذ لوحده, يؤخذ بغض النظر عن الطعام

(Pocket Clinical Drug Reference) (AHFS Drug Information)

مسكنات أخرى

auranofin

يؤخذ بعد الانتهاء من تناول الطعام بفترة قصيرة

(الشامل في الأدوية السريرية)

Leflunomide

يمكن تناوله بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Phenazopyridine hydrochloride

يؤخذ بعد الطعام

(AHFS Drug Information) (British National Formulary 57)
(الشامل في الأدوية السريرية) (Martindale Thirty-sixth edition)

أدوية الجهاز الهضمي Gastrointestinal Drugs

مضادات الحموضة

إن وجود الطعام في المعدة يمكن أن يطيل من فعاليتها المعدلة للحموضة

تعطى معدلات الحموضة عند حدوث أعراض فرط حموضة بالمعدة بين وجبات الطعام و في وقت النوم

(British National Formulary 57) (Martindale Thirty-sixth edition)

مثبطات مضخة البروتون

Esomeprazole

يؤخذ قبل ساعة على الأقل من تناول الطعام و ذلك لان الـ AUC ينخفض حوالي 33-35% عند تناول 40مغ من هذا الدواء بعد الطعام

يمكن فتح الكبسولة و مزج الحثيرات مع كمية قليلة من طعام رخو و تبتلع مباشرة دون مضغ

(Pocket Clinical Drug Reference) (AHFS Drug Information)

Lansoprazole

يبطئ الطعام امتصاصه و يخفض توافره الحيوي بمقدار 50%

تقريباً, لذا يؤخذ قبل الطعام
تحل حثيرات اللانسوبرازول المعدة لتحضير معلق فموي بكمية
قليلة من الماء و تبتلع مباشرة و يمكن أن ترش محتويات الكبسولة و
التي هي حثيرات ملبسة معوياً على كمية قليلة من طعام رخو مثل
اللبن أو تمزج مع كمية قليلة من عصير الفواكه و تبتلع
(Martindale Thirty-sixth edition) (الشامل في الأدوية السريرية)

Omeprazole

تؤخذ الكبسولات متأخرة التحرر قبل الطعام (يفضل قبل نصف
ساعة من الطعام)
و تؤخذ الكبسولات فورية التحرر و المعلق الفموي قبل الطعام
بساعة على الأقل
(AHFS Drug Information)

Pantoprazole

إن الطعام يؤخر امتصاصه من الأقراص متأخرة التحرر لكنه لا
يؤثر على الكمية الممتصة أو التركيز المصلي الذروي
,يمكن تناول الأقراص متأخرة التحرر بغض النظر عن الطعام أما
المعلق متأخر التحرر يؤخذ قبل الطعام بنصف ساعة
(AHFS Drug Information)

Rabeprazole

إن الطعام عالي الدسم يؤخر الامتصاص لكنه لا يؤثر على الكمية
المتمتصة , يؤخذ بغض النظر عن الطعام لكن في حالة قرحة الاثني
عشر يؤخذ بعد وجبة الصباح
(AHFS Drug Information)

مضادات الهيستامين H2

Cimetidine

يؤخذ مع الطعام

(الشامل في الأدوية السريرية)

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

لكن عند استخدامه لإنقاص تدرك الأنزيمات البنكرياسية المأخوذة

بشكل إضافات يؤخذ قبل الطعام بـ 60-90 دقيقة

يبلغ التركيز البلاسمي الذروة بعد حوالي ساعة من تناوله على معدة

فارغة (يمكن أن تظهر ذروة ثانية بعد حوالي 3 ساعات) أما عند

تناوله مع الطعام فإنه يبلغ الذروة بعد حوالي ساعتين و يؤخر

الطعام امتصاصه و يخفض الكمية الممتصة قليلاً

(Martindale Thirty-sixth edition)

Famotidine

لا يؤثر الطعام على توافره الحيوي بشكل ملحوظ

(Martindale Thirty-sixth edition)

(Wilson and Gisvold's Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry eleventh edition)

لعلاج حرقه الفؤاد يؤخذ قبل 15-60 دقيقة من تناول الطعام

المسبب لذلك (Pocket Clinical Drug Reference)

Ranitidine

يبلغ توافره الحيوي الفموي 50-60 % و لا يتأثر بشكل هام بوجود

الطعام

(Martindale Thirty-sixth edition)

(Wilson and Gisvold's Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry eleventh edition)

Ranitidine Bismuth Citrate

يؤخذ مع الطعام للحصول على فعالية قصوى
(الشامل في الأدوية السريرية)

مضادات الإقياء

Aprepitant

يؤخذ بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Clebopride

يؤخذ قبل وجبات الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

Domperidone

إن systemic bioavailability يبلغ 15% فقط عند تناوله فمويًا على
معدة فارغة و يزداد عندما يؤخذ بعد الطعام

(Martindale Thirty-sixth edition)

لعلاج اضطرابات حركة الجهاز الهضمي يؤخذ قبل وجبات الطعام
بـ 15-30 دقيقة

(الشامل في الأدوية السريرية)

Itopride hydrochloride

يؤخذ قبل وجبات الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

Ondansetron

إن الطعام يزيد قليلاً من توافره الحيوي, يؤخذ بغض النظر عن
الطعام

(AHFS Drug Information) (الشامل في الأدوية السريرية)

Metoclopramide

لعلاج القلس المعدي المريئي و خزل المعدة يؤخذ قبل نصف ساعة
من تناول الطعام و عند النوم

(AHFS Drug Information) (Pocket Clinical Drug Reference)
(الشامل في الأدوية السريرية)

Tropisetron

يؤخذ قبل ساعة على الأقل من تناول الإفطار
(Martindale Thirty-sixth edition) (الشامل في الأدوية السريرية)

مضادات التشنج

Clidinium Bromide

يؤخذ قبل وجبات الطعام و في وقت النوم
(AHFS Drug Information)

Hyoscine methobromide

(Methscopolamine Bromide)

يؤخذ قبل وجبة الطعام بنصف ساعة (Martindale Thirty-sixth edition)

Hyoscyamine

لا يؤثر الطعام على امتصاصه (AHFS Drug Information)

Mebeverine hydrochloride

يؤخذ قبل الطعام بعشرين دقيقة (British National Formulary 57)

Octatropine Methylbromide

(Anisotropine Methylbromide)

يؤخذ قبل وجبة الطعام بـ 30-60 دقيقة, يمكن تخفيف جفاف الفم
بشرب السوائل بشكل متكرر أو مضغ علكة خالية من السكر
(الشامل في الأدوية السريرية)

Peppermint Oil (زيت النعناع)

تبلع الكبسولة الملبسة معويًا بالكامل دون مضغ قبل الطعام بـ 0,5-
1 ساعة

(Martindale Thirty-sixth edition)

Pinaverium Bromide

حاصر لقنوات الكالسيوم يستخدم في متلازمة الأمعاء الهیوجة و
يستخدم في الاضطرابات الوظيفية التي تصيب السبيل الصفراوي
يؤخذ خلال وجبات الطعام مع كأس كبيرة من الماء و يجب عدم
تناوله قبل الاستلقاء لأنه يسبب جزراً معدياً مريئياً

(Martindale Thirty-sixth edition) (الشامل في الأدوية السريرية)

Propantheline bromide

ينخفض توافره الحيوي بوجود الطعام , يؤخذ قبل وجبات الطعام بـ
30-60 دقيقة

(Martindale Thirty-sixth edition)

المليينات

Bisacodyl

يؤخذ على معدة فارغة و يجب تجنب الحليب أو مضادات
الحموضة خلال ساعة من تناوله

(الشامل في الأدوية السريرية) (Pocket Clinical Drug Reference)

Lactitol

يؤخذ مع الطعام مع شرب كأس أو اثنين من السوائل
(Martindale Thirty-sixth edition)

Lactulose

يمكن خلطه مع الطعام أو تمديده بالماء أو عصير الفواكه أو الحليب
للتخفيف من طعمه الغير مستساغ (Martindale Thirty-sixth edition)

Sterculia

يؤخذ بعد وجبات الطعام
(British National Formulary 57) (Martindale Thirty-sixth edition)

مضادات الإسهال

Racecadotril

يؤخذ قبل وجبات الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

أدوية أخرى

Alosetron

إن معدل الامتصاص و الكمية الممتصة ينخفضان بعض الشيء
بوجود الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)
فالطعام ينقص الامتصاص 25% و يتأخر التركيز المصلي الذروي
15 دقيقة, يؤخذ بغض النظر عن وجبات الطعام
(AHFS Drug Information)

Cinitapride

يؤخذ قبل وجبات الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

Cisapride

يؤخذ قبل الطعام بـ 15-30 دقيقة (Martindale Thirty-sixth edition)

Eseridine salicylate

يؤخذ قبل وجبات الطعام بنصف ساعة

(Martindale Thirty-sixth edition)

Lubiprostone

إن التأثير الجانبي الأكثر شيوعاً لهذا الدواء هو الغثيان و الذي يعتمد على الجرعة و لكن يمكن تخفيف الأعراض بتناوله مع الطعام

(Martindale Thirty-sixth edition)

(Pharmacotherapy handbook Eighth Edition)

Olsalazine

يؤخذ بعد وجبات الطعام (من الشائع أن يسبب إسهال كتأثير جانبي و هذا يخف بتناوله بعد الطعام)

(British National Formulary 57) (Martindale Thirty-sixth edition)

Pancreatin (amylase+lipase+protease)

يتعطل بحمض المعدة لذا يؤخذ مع الطعام أو قبله أو بعده مباشرة يمكن تخفيض حموضة المعدة بتناول الرانيتيدين أو السيميتيدين قبل ساعة أو مثبطات مضخة البروتون مثل الأوميبرازول أو تناول مضادات الحموضة مع الجرعة

كما أنه يتعطل بالحرارة لذا يجب تجنب الأطعمة أو السوائل عالية الحرارة عند مزج الدواء معها و المزيج الناتج يجب ألا يبقى أكثر

من ساعة (British National Formulary 57)

Pirenzepine

يبلغ توافره الحيوي 20-30% و ينخفض بوجود الطعام حتى 10-

20% (Martindale Thirty-sixth edition)

Proglumide

يؤخذ قبل وجبات الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

Simeticone

يؤخذ بعد وجبات الطعام و عند النوم (AHFS Drug Information)

Sucralfate

يؤخذ على معدة فارغة قبل وجبة الطعام بساعة

(AHFS Drug Information) (Martindale Thirty-sixth edition)

(British National Formulary 57) (Pocket Clinical Drug Reference)

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

(Wilson and Gisvold's Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry eleventh edition)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Sulfasalazine

من الشائع أن يسبب عدم تحمل هضمي عند بداية استخدامه لذا

يؤخذ مع وجبات الطعام مع شرب كميات كبيرة من السوائل خلال

فترة استخدامه

(الشامل في الأدوية السريرية) (Pharmacotherapy handbook Eighth Edition)

Tegaserod

يبلغ توافره الحيوي المطلق بعد تناوله فموياً 10% و ينخفض

بوجود الطعام , يؤخذ قبل الطعام على معدة فارغة
(AHFS Drug Information) (Martindale Thirty-sixth edition)
(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)
(الشامل في الأدوية السريرية)

Troxipide

يؤخذ بعد الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

أدوية الجهاز التنفسي

Erdosteine

لا يتأثر امتصاصه بوجود الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

Fenspiride Hydrochloride

يؤخذ قبل وجبات الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

Montelukast

إن الطعام لا يغير توافره الحيوي
يؤخذ مساءً بغض النظر عن الطعام
يعطى للأطفال على شكل أقراص قابلة للمضغ أو حبيبات فموية
تعطى مباشرة في الفم أو تمزج مع كمية صغيرة من الطعام البارد
الرخو و ليس السائل و يؤخذ فوراً

(Martindale Thirty-sixth edition) (British National Formulary 57)

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

(Pharmacotherapy handbook Eighth Edition)

Pemirolast Potassium

يؤخذ بعد الطعام

(Martindale Thirty-sixth edition)

Pseudoephedrine

يؤخذ مع الطعام (Pocket Clinical Drug Reference)

إن الطعام يؤخر امتصاص البسودوافدرين المحضر على شكل محلول لكنه لا يؤثر على امتصاص المستحضرات مديدة التحرر

تؤخذ الأقراص مديدة التحرر التي تحوي فيكسوفينادين و بسودوافدرين بعيداً عن الطعام و ذلك لأن الطعام يؤثر بشكل ملحوظ على معدل الامتصاص و الكمية الممتصة للفكسوفينادين من هذه الأقراص أما معدل الامتصاص و الكمية الممتصة للبسودوافدرين من هذه الأقراص فإنه لا يتأثر بالطعام

(AHFS Drug Information) (الشامل في الأدوية السريرية)

Roflumilast

يؤخذ مع الطعام أو بدونه

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

Seratroast

يؤخذ بعد الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

Sodium Cromoglicate

يؤخذ قبل وجبات الطعام بنصف ساعة

(Pocket Clinical Drug Reference)

Terbutaline

يبلغ التوافر الحيوي بعد تناوله فمويّاً على معدة فارغة 14-15% و

ينخفض بوجود الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

يؤخذ مع وجبات الطعام لتقليل الانزعاج المعدي

(Pocket Clinical Drug Reference)

Zafirlukast

إن تناوله مع الطعام ينقص من معدل الامتصاص و الكمية الممتصة
(ينقص التوافر الحيوي بحوالي 40%) م, لذا يؤخذ قبل الطعام
بساعة على الأقل أو بعده بساعتين

(Pharmacotherapy handbook Eighth Edition)

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

(Martindale Thirty-sixth edition) (Pocket Clinical Drug Reference)

مضادات الهيستامين Antihistamines

Astemizole

ينخفض امتصاصه بوجود الطعام لذا يؤخذ على معدة فارغة
(الشامل في الأدوية السريرية)

Brompheniramine

يؤخذ مع الطعام أو الحليب (الشامل في الأدوية السريرية)

Cetirizine

يؤخر الطعام الزمن اللازم للوصول للتركيز المصلي الذروي
(يبطئ معدل الامتصاص) لكنه لا ينقص الكمية الممتصة من الدواء
يمكن تناوله بغض النظر عن الطعام

(AHFS Drug Information) (Martindale Thirty-sixth edition)

(Wilson and Gisvold's Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry eleventh edition)

Desloratadine

يؤخذ بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

fexofenadine hydrochloride

عندما يؤخذ الفيكسوفينادين لوحده (ليس في المستحضرات التي
يشرك معه البسودوافدرين) يمكن تناوله بغض النظر عن الطعام

أما الأقراص مديدة التحرر التي تحوي فيكسوفينادين و
بسودوافدرين تؤخذ بعيداً عن الطعام و ذلك لأن الطعام يؤثر بشكل
ملحوظ على معدل الامتصاص و الكمية الممتصة للفيكسوفينادين
من هذه الأقراص أما معدل الامتصاص و الكمية الممتصة
للبسودوافدرين من هذه الأقراص فإنه لا يتأثر بالطعام
(AHFS Drug Information)

Ketotifen Fumarate

يؤخذ مع الطعام

(British National Formulary 57) (Martindale Thirty-sixth edition)

Loratadine

تؤخذ الأقراص العادية و الأقراص المتفتتة فمويّاً و الأقراص التي
تحتوي الـ لوراتادين مع الـ بسودوافدرين سلفات بغض النظر عن
الطعام (AHFS Drug Information)

Meclozine Hydrochloride

(Meclizine Hydrochloride)

إن تناوله مع الطعام أو الحليب أو الماء يقلل من تأثيراته الجانبية
الهضمية (Pocket Clinical Drug Reference)

يمكن التخفيف من جفاف الفم و الإمساك الممكن حدوثهما بتناول
الكثير من السوائل (الشامل في الأدوية السريرية)

(Pyrilamine Maleate) Mepyramine Maleate

يؤخذ مع الطعام

(Wilson and Gisvold's Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical
Chemistry eleventh edition)

الستيرويدات القشرية Corticosteroids

Betamethasone

يؤخذ مستحضره الفموي مع الطعام أو الحليب
(الشامل في الأدوية السريرية)

Budesonide

لعلاج داء كرون يعطى على شكل كبسول معدل التحرر معد للتأثير
الموضعي في الجهاز الهضمي ,يؤخذ إما كجرعة وحيدة قبل
الفطور أو مقسمة لثلاث أقسام قبل وجبات الطعام بحوالي نصف
ساعة و ذلك حسب المستحضر
(Martindale Thirty-sixth edition)
تؤخر وجبة الطعام عالية الدسم التركيز المصلي الذروي حوالي
2.5 ساعة لكن الكمية الممتصة لا تتأثر
(AHFS Drug Information)

Cortisone Acetate

يؤخذ مع الحليب أو الطعام (الشامل في الأدوية السريرية)

Dexamethasone

يؤخذ مع الوجبات الطعامية لتخفيف الاضطرابات الهضمية التي قد
يسببها (الشامل في الأدوية السريرية)

Hydrocortisone

تؤخذ الجرعة الفموية مع الطعام لتخفيف الاضطرابات الهضمية
التي قد يسببها (الشامل في الأدوية السريرية)
يطبق المعجون الفموي بعد وجبات الطعام و وقت النوم
(AHFS Drug Information)

Methylprednisolone

يؤخذ مستحضره الفموي مع الطعام أو الحليب لتخفيف تأثيراته
الجانبية الهضمية
(Pocket Clinical Drug Reference) (الشامل في الأدوية السريرية)

Prednisolone

يتأثر امتصاصه الأولي بوجود الطعام لكن التوافر الحيوي لا يتأثر
يؤخذ مع الطعام للتخفيف من تأثيراته الجانبية الهضمية
(Martindale Thirty-sixth edition) (Pocket Clinical Drug Reference)
(الشامل في الأدوية السريرية)

Prednisone

يؤخذ مع الطعام لتخفيف الانزعاج الهضمي الذي قد ينجم عنه
(Pocket Clinical Drug Reference) (الشامل في الأدوية السريرية)

Triamcinolone

يؤخذ مستحضره الفموي مع الطعام
(Pocket Clinical Drug Reference)
يطبق المعجون الفموي عند النوم و عند الضرورة يطبق 2-3
مرات بعد وجبات الطعام (AHFS Drug Information)

أدوية السكري Antidiabetics

Aldose Reductase Inhibitors

Epalrestat

يؤخذ قبل وجبات الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

Alpha-glucosidase Inhibitors

Acarbose

يؤخذ مع بداية الطعام أو قبله مباشرة

(AHFS Drug Information) (Martindale Thirty-sixth edition)
(British National Formulary 57) (Pocket Clinical Drug Reference)
(الشامل في الأدوية السريرية)

Miglitol

يؤخذ مع أول لقمة من كل وجبة طعام رئيسية

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)
(الشامل في الأدوية السريرية)

Biguanides

Metformin Hydrochloride

يبلغ توافره الحيوي المطلق بعد تناول جرعة فموية وحيدة 500 مغ حوالي 50-60% و ينخفض إذا أخذ مع الطعام لكن هذا الدواء قد يسبب عسرة هضم ملحوظة و للتخفيف منها يؤخذ مع وجبات الطعام كما أن تناوله مع الطعام يقلل من الامتصاص المعوي للغلوكوز

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)
(Pharmacotherapy handbook Eighth Edition)
(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)
(British National Formulary 57)
(الشامل في الأدوية السريرية)

Dipeptidylpeptidase-4 inhibitors

Sitagliptin

يؤخذ مع الطعام أو بدونه

(Martindale Thirty-sixth edition)
(Pocket Clinical Drug Reference)

Vildagliptin

يؤخذ مع الطعام أو بدونه (Martindale Thirty-sixth edition)

Meglitinides

Nateglinide

يؤخذ خلال 30 دقيقة قبل وجبات الطعام و في حال عدم تناول وجبة الطعام تحذف الجرعة و ذلك لأنه يسبب انخفاض في سكر الدم

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

(Pharmacotherapy handbook Eighth Edition)

(الشامل في الأدوية السريرية) (British National Formulary 57)

Repaglinide

يؤخذ خلال 30 دقيقة قبل وجبات الطعام الرئيسية و في حال عدم تناول وجبة الطعام تحذف الجرعة و ذلك لأنه يسبب انخفاض في سكر الدم

(Martindale Thirty-sixth edition) (British National Formulary 57)

(Pharmacotherapy handbook Eighth Edition)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Sulfonylureas

Acetohexamide

يؤخذ قبل الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

يؤخذ مع الطعام عند الإصابة بالغلتيان أو الثقل الشرسوفي
(الشامل في الأدوية السريرية)

Chlorpropamide

قد يسبب انزعاجاً هضماً لذا يؤخذ مع الطعام

(British National Formulary 57) (Martindale Thirty-sixth edition)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Glibenclamide (Glyburide)

يؤخذ مع الطعام (لا يؤثر الطعام على امتصاصه)

(Pocket Clinical Drug Reference) (الشامل في الأدوية السريرية)

Gliclazide

تؤخذ الأقراص فوراً التحرر مع الطعام

(الشامل في الأدوية السريرية)

Tolazamide

يؤخذ مع الطعام (الشامل في الأدوية السريرية)

Tolbutamide

يؤخذ مع الطعام أو بعده مباشرة (British National Formulary 57)

Thiazolidinediones

Pioglitazone

يؤخذ مع الطعام أو بدونه

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

(AHFS Drug Information)

Rosiglitazone

يؤخذ مع الطعام أو بدونه

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

(AHFS Drug Information)

Troglitazone

يزداد امتصاصه بشكل كبير بوجود الطعام, يؤخذ مع الطعام

(الشامل في الأدوية السريرية) (Martindale Thirty-sixth edition)

أدوية أخرى :

Exenatide

يؤخذ خلال ساعة قبل الطعام (قبل الطعام ب 0-60 دقيقة), لا يؤخذ
بعد الطعام

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

(Pharmacotherapy handbook Eighth Edition)

(British National Formulary 57)

Guar Gum

يؤخذ مع الطعام أو قبله مباشرة حيث تحرك الحبيبات مع 200مل
من أحد السوائل الباردة أو تمزج مع الطعام مع شرب 200مل من

السوائل (Martindale Thirty-sixth edition)

Liraglutide

يعطى حقناً تحت الجلد , الجرعة يمكن أن تعطى بشكل مستقل عن وجبات الطعام

(Pharmacotherapy handbook Eighth Edition)

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

Pramlintide

يعطى حقناً تحت الجلد , يؤخذ مباشرة قبل وجبات الطعام الرئيسية

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

(Pharmacotherapy handbook Eighth Edition)

مزيلاا القلق و المهدئاا و المنوماا و مضاداا الذاان

Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics

Acamprosate

ينخفض توافره الحيوي إذا أخذ مع الطعام, فالطعام يخفض التركيز البلازمي الذروي بمقدار 42% و AUC بمقدار 23% لكن هذا التأثير ليس له أهمية سريرية, يؤخذ ثلاث مرات باليوم بغض النظر عن الطعام, بالنسبة للمرضى الذين يتناولون ثلاث وجبات بانتظام يومياً يمكن أن يتناولوا الدواء مع وجبات الطعام لزيادة المطاوعة

(Martindale Thirty-sixth edition) (AHFS Drug Information)

Alprazolam

إن الطعام عالى الدسم يغير معدل الامتصاص و ليس الكمية الممتصة للأقراص المتفتتة و المديدة التحرر

(AHFS Drug Information)

Aripiprazole

يؤخذ بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Buspirone hydrochloride

يؤخذ مع الطعام حيث أن الطعام يزيد من توافره الحيوي

(الشامل فى الأدوية السريرية) (Martindale Thirty-sixth edition)

Clozapine

إن الطعام ليس له تأثير على معدل الامتصاص أو الكمية الممتصة
،يؤخذ بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Ethchlorvynol

قد يسبب عند بعض المرضى نتيجة الامتصاص السريع دوخة و
رنح و يمكن تخفيف ذلك بتناوله مع الطعام لذا يؤخذ مع الطعام
(Martindale Thirty-sixth edition) (الشامل في الأدوية السريرية)

Olanzapine

إن الطعام ليس له تأثير على امتصاص الأولانزابين من الجهاز
الهضمي
يؤخذ بغض النظر عن وجبات الطعام
(AHFS Drug Information) (Pocket Clinical Drug Reference)

Paliperidone

إن الطعام يزيد معدل الامتصاص و الكمية الممتصة ,يؤخذ في
الصباح بغض النظر عن الطعام (لكن يؤخذ دائماً مع الفطور أو
دائماً على معدة فارغة)
(AHFS Drug Information) (Pocket Clinical Drug Reference)
(British National Formulary 57)

Prochlorperazine

يؤخذ مع الطعام أو الحليب أو كأس كامل من الماء لتقليل
الاضطرابات المعوية (Pocket Clinical Drug Reference)

Quazepam

إن الطعام لا يؤثر على امتصاصه من الجهاز الهضمي

(AHFS Drug Information)

Quetiapine Fumarate

يؤخذ بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Ramelteon

يجب ألا يؤخذ مع وجبة طعام مرتفعة الدسم أو بعدها مباشرة

(Martindale Thirty-sixth edition) (Pocket Clinical Drug Reference)

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

Risperidone

إن الطعام لا يؤثر على معدل الامتصاص أو الكمية الممتصة, يمكن أن يؤخذ بغض النظر عن وجبات الطعام, لا يمزج المحلول الفموي مع الشاي أو الكولا (يتوافق المحلول الفموي مع الماء و القهوة و عصير البرتقال و الحليب قليل الدسم)

(AHFS Drug Information) (Pocket Clinical Drug Reference)

Zaleplon

إن تناوله مع وجبة طعام كبيرة أو ذات محتوى عالي من الدسم يؤخر الامتصاص و ينقصه و يخفض التراكيز الذروية ,يؤخذ بغض النظر عن الطعام لكن يجب تجنب تناوله مع طعام عالي الدسم

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

(AHFS Drug Information)

Ziprasidone

يؤخذ مع الطعام حيث أن وجود الطعام يضاعف الامتصاص

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

(الشامل في الأدوية السريرية) (AHFS Drug Information)

Zolpidem Tartrate

إن الطعام يمكن أن يخفض معدل الامتصاص و الكمية الممتصة
يؤخذ على معدة فارغة للحصول على تأثيره المنوم بسرعة (و ذلك
قبل الذهاب للنوم مباشرة)

(AHFS Drug Information) (Pocket Clinical Drug Reference)

(الشامل في الأدوية السريرية)

مضادات الاكتئاب Antidepressants

مثبطات إعادة قبط السيروتونين الانتقائية

Citalopram Hydrobromide

ليس للطعام تأثير هام على امتصاص السيتالوبرام لذا يؤخذ بغض
النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Escitalopram oxalate

يؤخذ بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Fluoxetine

يمتص بسهولة عبر الجهاز الهضمي و لا يتأثر توافره الحيوي
بتناول الطعام لكن امتصاصه يتأخر حوالي 1-2 ساعة , يؤخذ بغض
النظر عن الطعام

(AHFS Drug Information) (Martindale Thirty-sixth edition)

Fluvoxamine

يمتص بسهولة عبر الجهاز الهضمي و لا يتأثر توافره الحيوي
بتناول الطعام , يؤخذ بغض النظر عن الطعام

(AHFS Drug Information) (Martindale Thirty-sixth edition)

Paroxetine hydrochloride

إن الطعام لا يؤثر على امتصاصه بشكل هام, يؤخذ بغض النظر عن الطعام (لكن تناوله مع الطعام يقلل تأثيراته الجانبية الهضمية)
(AHFS Drug Information)

Sertraline

إن تناول الأقراص مع الطعام يزيد الكمية الممتصة قليلاً و التركيز الذروي يزيد حوالي 25% و الزمن اللازم للوصول للتركيز الذروي ينخفض من حوالي 8 ساعات إلى 5.5 ساعة لكن هذه التغيرات ليس لها أهمية سريرية أما تناول المحلول الفموي مع الطعام يزيد الزمن اللازم للوصول للتركيز الذروي من 5.9 ساعة إلى 7 ساعات (AHFS Drug Information)

مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقة

Clomipramine hydrochloride

إن الطعام ليس له تأثير مهم على التوافر الحيوي لكبسولات الكلوميبرامين (AHFS Drug Information)

Imipramine

لا يؤثر الطعام على امتصاصه, يؤخذ بغض النظر عن الطعام
(AHFS Drug Information)

مثبطات أنزيم المونو أمينو أوكسيداز

و تضم : الموكلوبيميديد و الفينيلزين سلفات و الترانيكسبيرومين
سلفات

يجب تجنب الأطعمة التي تحوي التيرامين خلال فترة استخدامها

Moclobemide

يؤخذ بعد الطعام

(British National Formulary 57) (Martindale Thirty-sixth edition)

مضادات الاكتئاب الأخرى

Bupropion

ليس للطعام تأثير هام على التركيز المصلي الذروي أو الكمية
المتصلة للأقراص مديدة التحرر (AHFS Drug Information)

Duloxetine

يمتص بشكل جيد من الجهاز الهضمي و يصل تركيزه المصلي إلى
الذروة بعد 6 ساعات من تناول الجرعة الفموية لكن تناول الطعام
يؤخر الوصول إلى التركيز المصلي الذروي إلى 10 ساعات و
تنقص الكمية المتصلة حوالي 10% , يؤخذ بغض النظر عن الطعام
(AHFS Drug Information) (Martindale Thirty-sixth edition)

Lithium

يمتص 60-100% من الليثيوم من الجهاز الهضمي و لا تتأثر الكمية الممتصة بوجود الطعام , يؤخذ مع الطعام لتجنب الإصابة بالانزعاج الهضمي الذي قد يسببه, يجب الإكثار من تناول السوائل و الملح لتجنب الإصابة بالتجفاف و خاصة في الصيف (الشامل في الأدوية السريرية)

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

(Pharmacotherapy handbook Eighth Edition)

Mirtazapine

يؤخذ بغض النظر عن الطعام فالطعام ليس له تأثير مهم على امتصاصه من الجهاز الهضمي (AHFS Drug Information)

Nefazodone

إن امتصاصه يتأخر و ينخفض بوجود الطعام لكن ذلك ليس هام سريريا , يؤخذ بغض النظر عن الطعام (يمكن تخفيف شدة انخفاض التوتر الشرياني بالوضعة و خفة الرأس الناجمين عنه بتناوله مع الطعام)

(AHFS Drug Information) (Martindale Thirty-sixth edition)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Trazodone

يمتص بسهولة عبر الجهاز الهضمي و يتأثر امتصاصه بالطعام , فعندما يؤخذ بعد فترة قصيرة من تناول الطعام تزداد الكمية الممتصة لكن ينقص التركيز المصلي الذروي و يزداد الزمن اللازم للوصول إليه مقارنة مع تناوله على معدة فارغة , فعند تناوله بعد

الطعام يصل التركيز المصلي للذروة بعد ساعتين من أخذ الجرعة
أما على معدة فارغة فإنه يصل للذروة بعد ساعة (يؤخذ بعد فترة
قصيرة من وجبة الطعام)

(الشامل في الأدوية السريرية) (Martindale Thirty-sixth edition)

Venlafaxine

إن الطعام لا يؤثر على امتصاص الفينلافاكسين من الجهاز
الهضمي, يؤخذ مع الطعام لتقليل تأثيراته الجانبية الهضمية

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

(AHFS Drug Information)

الأدوية المضادة للشقيقة Antimigraine Drugs

Methysergide

يؤخذ مع وجبات الطعام لتقليل تأثيراته الجانبية الهضمية

(AHFS Drug Information) (Martindale Thirty-sixth edition)

(الشامل في الأدوية السريرية) (British National Formulary 57)

شادات مستقبلات 5HT₁

Almotriptan

لا يؤثر الطعام على حرائكه الدوائية, يؤخذ بغض النظر عن وجبات الطعام (AHFS Drug Information)

Frovatriptan

يصل التركيز المصلي للذروة بعد 2-4 ساعات من تناوله فمويًا لكن الطعام قد يؤخر الزمن حوالي ساعة لكنه لا يؤثر على توافره الحيوي

يؤخذ بغض النظر عن الطعام

(AHFS Drug Information) (Martindale Thirty-sixth edition)

Naratriptan

لا يؤثر الطعام على حرائكه الدوائية (AHFS Drug Information)

Rizatriptan

يصل التركيز المصلي للذروة عند تناوله فمويًا بعد حوالي 1-1.5 ساعة أو 1.6-2.5 ساعة وذلك حسب الصياغة الصيدلانية, ويتأخر الزمن اللازم للوصول للتركيز الذروي في حالة الأقراص عند تناولها مع الطعام بحوالي ساعة

تؤخذ الأقراص العادية و المتفتتة بغض النظر عن الطعام

(AHFS Drug Information) (Martindale Thirty-sixth edition)

Sumatriptan

إن الطعام لا يؤثر بشكل ملحوظ على توافره الحيوي بعد تناوله فمويًا لكنه يطيل الزمن اللازم للوصول للتركيز الذروي ,يؤخذ مع السوائل فوراً عند بدء ظهور أعراض الشقيقة

(الشامل في الأدوية السريرية) (AHFS Drug Information)

Zolmitriptan

لا يؤثر الطعام على توافره الحيوي بشكل هام , تؤخذ الأقراص العادية و المتفتتة بغض النظر عن الطعام

(AHFS Drug Information)

الأدوية المضادة لباركنسون Antiparkinsonian Drugs

Benzatropine Mesilate

في حال الإصابة بانزعاج هضمي عند تناوله على معدة فارغة
يؤخذ مع أو بعد الطعام مباشرة

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Biperiden

يؤخذ مع أو بعد الطعام لتخفيف الانزعاج الهضمي

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

(AHFS Drug Information)

Bromocriptine

يؤخذ مع الطعام لتخفيف التأثيرات الهضمية التي يسببها

(British National Formulary 57) (Martindale Thirty-sixth edition)

(الشامل في الأدوية السريرية) (AHFS Drug Information)

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

Cabergoline

يؤخذ مع الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

Carbidopa

يؤخذ مع الطعام لتجنب الإصابة بانز عا ج هضمي

(الشامل في الأدوية السريرية)

Entacapone

لا يتأثر الامتصاص بشكل هام بوجود الطعام ,يؤخذ بغض النظر
عن الطعام

(AHFS Drug Information) (Martindale Thirty-sixth edition)

Levodopa

يؤخذ مع الطعام لتخفيف الاضطرابات الهضمية التي يسببها

(AHFS Drug Information) (الشامل في الأدوية السريرية)

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

Lisuride maleate

يؤخذ مع الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

Pergolide Mesilate

يؤخذ مع الطعام أو الحليب (الشامل في الأدوية السريرية)

Pramipexole

يصل التركيز المصلي للذروة خلال ساعتين من تناوله فمويًا على معدة فارغة و خلال ثلاث ساعات عند تناوله بعد الطعام (إن الطعام ينقص معدل الامتصاص لكنه لا ينقص الكمية الممتصة) يؤخذ مع الطعام للتخفيف من الغثيان

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

(Martindale Thirty-sixth edition)

Procyclidine Hydrochloride

يؤخذ مع الطعام لتخفيف الانزعاج الهضمي, يمكن تخفيف جفاف الفم و الإمساك الممكن حدوثهما بتناول كميات كبيرة من السوائل

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Profenamine (Ethopropazine)

يؤخذ مع الطعام لتخفيف الانزعاج الهضمي

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

Rasagiline

يؤخذ بغض النظر عن الطعام ,يجب تجنب الأطعمة و الأشربة الغنية بالتيرامين

(Pocket Clinical Drug Reference) (AHFS Drug Information)

Ropinirole

إن معدل الامتصاص ينخفض عند تناوله مع الطعام لكن الكمية الممتصة لا تنخفض, يؤخذ بغض النظر عن الطعام لكن في حال حدوث غثيان يؤخذ مع الطعام للتخفيف من ذلك

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

(AHFS Drug Information) (Martindale Thirty-sixth edition)

Tolcapone

على الرغم من أن الطعام يؤخر و ينقص امتصاصه (ينقص توافره الحيوي حوالي 10-20 %) يمكن تناوله بغض النظر عن الطعام

(AHFS Drug Information) (Martindale Thirty-sixth edition)

Trihexyphenidyl hydrochloride

(Benzhexol Hydrochloride)

يؤخذ مع الطعام لتخفيف الانزعاج الهضمي

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

(الشامل في الأدوية السريرية)

مضادات الصرع Antiepileptics

يمكن تقليل التأثيرات الجانبية الهضمية التي تسببها معظم مضادات الصرع بتناولها مع الطعام أو كمية كبيرة من الماء

(AHFS Drug Information)

Acetazolamide

لا يؤثر الطعام على امتصاص الكبسولات مديدة التحرر, يؤخذ مع الطعام

(AHFS Drug Information) (الشامل في الأدوية السريرية)

Carbamazepine

تؤخذ الأقراص العادية و المعلق مع الطعام أما الكبسولات مديدة التحرر تؤخذ بغض النظر عن الطعام

(AHFS Drug Information)

Ethosuximide

يؤخذ مع الطعام إذا سبب اضطراب هضمي

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Ethotoin

يؤخذ بعد وجبات الطعام

(AHFS Drug Information) (Martindale Thirty-sixth edition)

Felbamate

تؤخذ الأقراص بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Gabapentin

لا يؤثر الطعام على معدل امتصاصه, يمكن تناوله مع الطعام أو بدونه

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

(الشامل في الأدوية السريرية) (AHFS Drug Information)

Lamotrigine

إن الطعام لا يؤثر على معدل امتصاصه, يؤخذ بغض النظر عن الطعام (يمكن تناوله مع الطعام في حال حدوث انزعاج هضمي)

(الشامل في الأدوية السريرية) (AHFS Drug Information)

Levetiracetam

يؤخذ بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Mesuximide (Methsuximide)

يؤخذ مع الطعام (الشامل في الأدوية السريرية)

Oxcarbazepine

يؤخذ بغض النظر عن وجبات الطعام

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

(AHFS Drug Information) (Pocket Clinical Drug Reference)

Phenobarbital

يؤخذ مع الطعام إذا سبب اضطراب هضمي, تتناول مدة تأثير الباربيتورات عند المريض الذي يتناول حمية فقيرة بالبروتين, و هناك احتمال ضعف تأثيره عند تناول الفواكه الطازجة الغنية بفيتامين س و ذلك لأن فيتامين س يطرد هذا الدواء من مواضع ارتباطه بالبروتينات البلازمية مما يؤدي لزيادة معدل إطراره

(الشامل في الأدوية السريرية)

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

Phenytoin

يؤخذ مع الطعام أو بعده و ذلك للتقليل من الاضطرابات الهضمية التي يسببها كما أن الطعام يحسن توافره الحيوي (يزيد الامتصاص)

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

(British National Formulary 57) (Martindale Thirty-sixth edition)

Pregabalin

يمتص بسرعة عبر الجهاز الهضمي و يبلغ توافره الحيوي 90% , ينخفض معدل الامتصاص إذا أخذ مع الطعام لكن الكمية الممتصة لا تتأثر, يؤخذ بغض النظر عن وجبات الطعام

Primidone

يمكن تناوله مع الطعام لتخفيف تأثيراته الجانبية الهضمية
إن تناول المريض لحمية فقيرة بالبروتين خلال فترة استخدامه
يسبب زيادة مدة تأثيره لذا يجب الانتباه لذلك و إن تناول المشروبات
الطازجة الغنية بفيتامين س يسبب انزياحه من مواضع ارتباطه
بالبروتينات البلازمية و بالتالي يزداد معدل إطراره البولي و تنقص
شدة تأثيره

(الشامل في الأدوية السريرية)

Rufinamide

يؤخذ مع الطعام حيث أن الطعام يزيد التوافر الحيوي لهذا الدواء
بحوالي 34-40%

(Martindale Thirty-sixth edition)

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

Stiripentol

يؤخذ مع الطعام لكن ليس مع منتجات الحليب أو المشروبات
الغازية أو عصير الفواكه أو الأطعمة و الأشرطة الحاوية على
الكافئين أو التيوفيللين

(Martindale Thirty-sixth edition)

Tiagabine

يؤخذ مع الطعام لتجنب الارتفاع السريع للتركيز المصلي و بالتالي
تقليل تأثيراته الجانبية (إن الطعام يقلل سرعة امتصاصه لكنه لا
يؤثر على الكمية الممتصة)

(AHFS Drug Information) (Martindale Thirty-sixth edition)

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

(Pharmacotherapy handbook Eighth Edition)

(الشامل في الأدوية السريرية) (Pocket Clinical Drug Reference)

Topiramate

لا يتأثر توافره الحيوي بوجود الطعام, يمكن تناوله بغض النظر عن
الطعام

(AHFS Drug Information) (Martindale Thirty-sixth edition)

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

(الشامل في الأدوية السريرية) (Pocket Clinical Drug Reference)

Valproate

يمكن تقليل تأثيراته الجانبية الهضمية بتناوله مع الطعام أو بعده

(Pharmacotherapy handbook Eighth Edition)

(AHFS Drug Information) (Martindale Thirty-sixth edition)

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Zonisamide

إن وجود الطعام لا يؤثر على توافره الحيوي لكن الزمن اللازم
للوصول للتركيز المصلي الذروي يتأخر, يمكن تناوله مع أو بدون
طعام

(AHFS Drug Information) (Martindale Thirty-sixth edition)

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

مضادات الخرف Antidementia Drugs

Codergocrine Mesilate

يفضل تناوله قبل الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

Donepezil hydrochloride

إن الطعام لا يؤثر على معدل الامتصاص و الكمية الممتصة لذا
يمكن تناوله مع الطعام أو بدونه (AHFS Drug Information)

Galantamine

إن وجود الطعام يؤخر الامتصاص لكن الكمية الممتصة لا تتأثر,
يعطى مع الطعام لتخفيف تأثيراته الجانبية الهضمية مع تناول كمية
كافية من السوائل

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

(AHFS Drug Information)

Idebenone

يؤخذ بعد الطعام

(Martindale Thirty-sixth edition)

Memantine

يعطى بغض النظر عن وجبات الطعام

(AHFS Drug Information) (Pocket Clinical Drug Reference)

Rivastigmine

الطعام يؤخر امتصاصه حوالي ساعة و نصف لكنه يزيد الكمية
المتصلة و يخفض التركيز المصلي الذروي, يؤخذ مع الطعام و
ذلك لأن تأثيراته الجانبية الهضمية تتعلق بتراكيزه المصلية الذروية
المرتفعة

(Martindale Thirty-sixth edition) (AHFS Drug Information)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Tacrine

يخفض الطعام امتصاصه حوالي 30-40%, يؤخذ على معدة
فارغة لتحسين الامتصاص لكنه إذا سبب اضطرابات هضمية يمكن
تناوله مع الطعام

(Martindale Thirty-sixth edition)

أدوية النقرس Antigout Drugs

Allopurinol

يؤخذ بعد الطعام للتخفيف من تهيج المعدة الذي يسببه و يجب تناول كمية كبيرة من السوائل (على الأقل 10-12 كأس من الماء كل يوم) و ذلك لمنع ترسب الكزانتين في الكلية

(AHFS Drug Information) (Martindale Thirty-sixth edition)

(British National Formulary 57) (الشامل في الأدوية السريرية)

Colchicine

إن تناوله مع الطعام لا يؤثر على معدل الامتصاص لكنه ينقص الكمية الممتصة حوالي 15% ,يؤخذ بغض النظر عن الطعام

(AHFS Drug Information)

Probenecid

قد يسبب مشاكل هضمية لذا يؤخذ مع الطعام أو مضادات الحموضة مع شرب كميات وافرة من الماء لتجنب الإصابة بحصيات حمض البول (الشامل في الأدوية السريرية) (Pocket Clinical Drug Reference)

Sulfinpyrazone

يؤخذ مع الطعام أو الحليب مع شرب كمية كبيرة من السوائل

(British National Formulary 57) (الشامل في الأدوية السريرية)

مرخيات العضلات Muscle Relaxants

Baclofen

وجد في دراسة أن الطعام لم يكن له تأثير هام على معدل الامتصاص وكميته

يفضل تناوله مع أو بعد الطعام أو الحليب

(British National Formulary 57) (Martindale Thirty-sixth edition)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Chlorzoxazone

يؤخذ مع وجبات الطعام لتخفيف الاضطرابات الهضمية

(Pocket Clinical Drug Reference)

Eperisone Hydrochloride

يؤخذ بعد الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

Methocarbamol

يؤخذ مع الطعام لتخفيف تأثيراته الجانبية الهضمية

(Pocket Clinical Drug Reference)

Tizanidine

تزداد الكمية الممتصة حوالي 30% عند تناوله مع الطعام, يؤخذ بشكل ثابت فيما يتعلق بالطعام (إما دائماً مع الطعام أو دائماً على معدة فارغة)

(AHFS Drug Information)

الأدوية المؤثرة على العظام

Bisphosphonates

لا تمتص بشكل جيد من الجهاز الهضمي و يبلغ توافرها الحيوي عند تناولها على معدة فارغة 0.7% بالنسبة للأليندرونات و الريزيدرونات و 6% بالنسبة للإيتيدرونات و التيلودرونات و إن الطعام يضعف امتصاص هذه الأدوية أكثر خصوصاً المنتجات الحاوية على الكالسيوم و الكاتيونات متعددة التكافؤ الأخرى مثل ألنيوم , حديد , مغنزيوم بضمن ذلك مضادات الحموضة و المكملات المعدنية , و بعض المليينات التناضحية أيضاً تضعف امتصاص الـ bisphosphonates المعطاة فمويّاً . و يجب عدم الاستلقاء لمدة نصف ساعة بعد تناولها

(Martindale Thirty-sixth edition)

و هي تضم :

Alendronate

تؤخذ الأقراص عند الاستيقاظ على معدة فارغة قبل الفطور بـ نصف ساعة على الأقل و يجب شرب الكثير من الماء ليس أقل من 200 مل لكن ليس الماء المعدني و يجب تجنب الاستلقاء لمدة نصف ساعة بعد تناوله

(الشامل في الأدوية السريرية) (Martindale Thirty-sixth edition)

Clodronate

إن امتصاصه ضعيف من الجهاز الهضمي و ينقص بوجود الطعام خصوصاً الحاوي على الكالسيوم و الكاتيونات متعددة التكافؤ الأخرى, يبلغ توافره الحيوي 1-4% فقط

يجب تجنب الطعام لساعة على الأقل قبل تناول الجرعة و بعدها خصوصاً الحاوي على الكالسيوم مثل الحليب و يجب تناول كمية كافية من السوائل

(British National Formulary 57) (Martindale Thirty-sixth edition)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Etidronate

ينقص امتصاصه بوجود الطعام خصوصاً الحاوي على الكالسيوم و الكاتيونات متعددة التكافؤ الأخرى , يجب تجنب الطعام لساعتين قبل و بعد الجرعة الفموية

(British National Formulary 57) (Martindale Thirty-sixth edition)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Ibandronate

إن توافره الحيوي ينقص بمقدار 90% عندما يؤخذ مع الطعام, و حوالي 30% عندما يؤخذ قبل الطعام بنصف ساعة و حوالي 75% عندما يؤخذ بعد الطعام بساعتين

يؤخذ قبل ساعة على الأقل من تناول الفطور مع كأس كامل من الماء (180-240 مل) لكن ليس الماء المعدني و يجب تجنب الاستلقاء لمدة ساعة على الأقل بعد تناوله

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

(AHFS Drug Information)

Risedronate

ينقص امتصاصه بوجود الطعام خصوصاً الحاوي على الكالسيوم و

الكاتيونات متعددة التكافؤ الأخرى, يبلغ متوسط توافره الحيوي 0.63% على معدة فارغة و ينخفض حوالي 30% عندما يؤخذ قبل الفطور بساعة و حوالي 55% عندما يؤخذ قبل الفطور بنصف ساعة يؤخذ على معدة فارغة قبل الطعام بنصف ساعة على الأقل مع كأس ماء كبير و يجب تجنب الاستلقاء لمدة 30-60 دقيقة بعد تناول الدواء

(British National Formulary 57) (Martindale Thirty-sixth edition)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Tiludronate

ينقص امتصاصه بوجود الطعام خصوصاً الحاوي على الكالسيوم و الكاتيونات متعددة التكافؤ الأخرى

يبلغ توافره الحيوي 6% على معدة فارغة و ينخفض حوالي 90% عندما يؤخذ خلال ساعتين من تناول الطعام

لضمان امتصاص كافي يجب أن يؤخذ مع الكثير من الماء (على الأقل 200 مل) و قبل الطعام أو بعده بساعتين على الأقل

(British National Formulary 57) (Martindale Thirty-sixth edition)

(الشامل في الأدوية السريرية)

أدوية أخرى

Cinacalcet Hydrochloride

تبلغ التراكيز المصلية ذروتها عند تناولها فمويّاً بعد 2-6 ساعات و تزيد بشكل كبير عندما يؤخذ مع الطعام

(Martindale Thirty-sixth edition)

Strontium Ranelate

يجب ألا يؤخذ مع الطعام أو مضادات الحموضة فالحليب و
الأطعمة الحاوية على كالسيوم قد تخفض من توافره الحيوي, يبلغ
التوافره الحيوي المطلق حوالي 25% بعد تناوله فمويًا و يخفض
الطعام أو الكالسيوم التوافر الحيوي بحوالي 60-70%
يفضل تناوله بالليل بعد ساعتين على الأقل من الطعام

(Martindale Thirty-sixth edition)

الهرمونات الدرقية و مضادات الدرق

Thyroid and Antithyroid Drugs

الأدوية المستخدمة في علاج قصور الدرق

Levothyroxine Sodium

(Thyroxine sodium)

يؤخذ على معدة فارغة قبل الفطور فالطعام يعيق امتصاصه

(British National Formulary 57) (Martindale Thirty-sixth edition)

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Thyroid

يؤخذ قبل الفطور (Pocket Clinical Drug Reference)

مضادات الدرق

Benzylthiouracil

يفضل تناوله مع الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

Potassium iodide

يؤخذ مع الطعام (لتقليل الانزعاج الهضمي) أو يمدد بكميات وافرة

من الحليب أو الماء أو العصير و عند استخدامه كمقشع يؤخذ مع

كأس كامل من الماء

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)
(الشامل في الأدوية السريرية)

Propylthiouracil

يؤخذ في نفس الوقت فيما يتعلق بوجبات الطعام يومياً
(Pocket Clinical Drug Reference)

Thiamazole (Methimazole)

يؤخذ بشكل ثابت فيما يتعلق بالطعام أي دائماً مع الطعام أو دائماً
بدونه
(Pocket Clinical Drug Reference)

مضادات الورم Antineoplastics

Altretamine

إن الطعام ينقص معدل الامتصاص و الكمية الممتصة للألتريتامين
يوصي المصنعون بتقسيم الجرعة إلى 4 مرات (مثلاً جرعة بعد كل
وجبة طعام و جرعة وقت النوم)

(AHFS Drug Information)

Anastrozole

إن الطعام يخفض معدل الامتصاص لكنه لا يؤثر على الكمية
المتصة, يؤخذ بغض النظر عن الطعام

(Martindale Thirty-sixth edition) (AHFS Drug Information)

Bexarotene

يؤخذ مع وجبة الطعام (يتحسن امتصاصه بوجود وجبة طعام
دسمة)

(British National Formulary 57) (Martindale Thirty-sixth edition)

(Wilson and Gisvold's Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical
Chemistry eleventh edition)

Bicalutamide

يؤخذ بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Capecitabine

إن الطعام ينقص معدل الامتصاص و الكمية الممتصة, تبلىع
الأقراص مع الماء خلال 30 دقيقة بعد وجبة الطعام

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

Chlorambucil

ينقص تناوله مع الطعام من توافره الحيوي بنسبة 10-20%
(الشامل في الأدوية السريرية)

Dasatinib

يؤخذ بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Erlotinib

يبلغ توافره الحيوي 60% و قد يزداد بوجود الطعام لحوالي 100%
, يؤخذ قبل الطعام بساعة أو بعده بساعتين على الأقل
(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

Estramustine

يؤخذ على معدة فارغة قبل الطعام بساعة أو بعده بساعتين على
الأقل و يجب تجنب تناوله بشكل خاص مع الحليب و مشتقاته
(British National Formulary 57) (Martindale Thirty-sixth edition)
(الشامل في الأدوية السريرية)

Etoposide

لا تتأثر الكمية الممتصة بالطعام
(AHFS Drug Information)

Exemestane

إن توافره الحيوي يتعلق بالاستقلاب بالمرور الأول لكنه يزداد عندما يؤخذ مع الطعام, يفضل تناوله بعد وجبة الطعام

(Martindale Thirty-sixth edition) (AHFS Drug Information)

(Wilson and Gisvold's Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry eleventh edition)

Flutamide

يؤخذ بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Gefitinib

يؤخذ بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Imatinib Mesilate

يؤخذ مع الطعام و كأس كبير من الماء للتخفيف من الاضطرابات الهضمية

(AHFS Drug Information) (Martindale Thirty-sixth edition)

(Pocket Clinical Drug Reference)

Lapatinib Tosilate

يؤخذ دائماً في نفس الوقت فيما يتعلق بالطعام إما قبل الطعام بساعة أو بعده بساعة

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

(British National Formulary 57)

Lenalidomide

إن تناوله مع الطعام يخفض التراكيز البلازمية لكنه لا ينقص الكمية الممتصة

(Martindale Thirty-sixth edition)

Letrozole

لا يؤثر الطعام على امتصاص الليتروزول, يؤخذ بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Lomustine

يؤخذ على معدة فارغة مع السوائل و يجب عدم تناول الطعام لساعتين بعد تناوله (الشامل في الأدوية السريرية)

Melphalan

يبلغ متوسط التوافر الحيوي لهذا الدواء 56% لكنه قد يتراوح بين 25-89% , ينخفض توافره الحيوي بشكل هام بوجود الطعام (ينخفض بحدود 45%)

ينصح البعض بعدم تناوله مع الطعام, لكن المريض الذي غير تناوله من بعد الطعام إلى قبل الطعام يجب أن يراقب خشية حدوث سمية (Martindale Thirty-sixth edition)

Mercaptopurine

يؤخذ مستحضره الفموي مع وجبات الطعام و ليس على معدة فارغة (الشامل في الأدوية السريرية)

Methotrexate

قد يسبب الطعام انخفاض معدل امتصاصه و لذلك يؤخذ على معدة فارغة (الشامل في الأدوية السريرية)

Mitotane

يمتص 40% من الجرعة المتناولة فموياً و يزداد الامتصاص بوجود الطعام, يفضل تناوله مع وجبات الطعام (من الشائع أن

يسبب غثيان و إسهال بجرعة أكثر من 2 غ باليوم و يمكن تجنب ذلك بتناوله مع الطعام)

(Pharmacotherapy handbook Eighth Edition)

(Martindale Thirty-sixth edition)

Nilotinib

يزداد توافره الحيوي ضعفين تقريباً عند تناوله مع الطعام خصوصاً الوجبة الغنية بالدسم ,يؤخذ قبل الطعام بساعة أو بعده بساعتين على الأقل (Martindale Thirty-sixth edition)

Nilutamide

يمكن تناوله بغض النظر عن مواعيد الوجبات الطعامية (الشامل في الأدوية السريرية) (AHFS Drug Information)

Procarbazine Hydrochloride

يؤخذ مع الطعام أو السوائل إذا سبب انزعاج هضمي
يجب تجنب الأطعمة الغنية بالتيرمين خلال فترة استخدام هذا الدواء
و ذلك لأنه يملك فعالية ضعيفة مثبطة لخميرة MAO و يجب تجنب الكحول و الكافئين
(الشامل في الأدوية السريرية) (Pocket Clinical Drug Reference)

Sorafenib

ينخفض الامتصاص حوالي 30% بعد وجبة طعام عالية الدسم,
يؤخذ قبل الطعام بساعة أو بعده بساعتين على الأقل
(Martindale Thirty-sixth edition)

Sunitinib Malate

إن توافره الحيوي لا يتأثر بالطعام , يؤخذ بغض النظر عن الطعام

(Martindale Thirty-sixth edition) (Pocket Clinical Drug Reference)

Temozolomide

إن الطعام يخفض من معدل الامتصاص و الكمية الممتصة لذا يؤخذ

بشكل ثابت فيما يتعلق بالطعام لضمان توافر حيوي ثابت

يمكن تناوله مع الطعام لكن تناوله على معدة فارغة يقلل من حدوث

الغثيان و الإقياء

(AHFS Drug Information) (Martindale Thirty-sixth edition)

Topotecan

يبلغ توافره الحيوي بعد تناوله فموياً 40% و ليس للطعام تأثير مهم

على الحرائك الدوائية للتوبوتيكان (Martindale Thirty-sixth edition)

Toremifene Citrate

لا يؤثر الطعام على امتصاص التوريميفين , يؤخذ بغض النظر عن

الطعام (AHFS Drug Information)

Vorinostat

يبلغ متوسط الزمن اللازم ليصل للتركيز المصلي الذروي بعد

تناوله فموياً مع وجبة طعام عالية الدسم 4 ساعات و ينخفض لساعة

و نصف عند تناوله على معدة فارغة , فوجبة الطعام عالية الدسم

تخفض معدل الامتصاص لكنها تزيد الكمية الممتصة , يؤخذ مع

الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

الأدوية حسب الأحرف الأبجدية

Abacavir

مضاد للفيروسات التكهنية يستخدم في علاج الـ HIV
إن الطعام يؤخر الامتصاص بعض الشيء لكن الكمية الممتصة لا
تتأثر, يمكن تناوله مع الطعام أو بدونه
(Martindale Thirty-sixth edition) (الشامل في الأدوية السريرية)

Acamprosate

يستخدم لمنع عودة الإدمان على الكحول عند الذين أقلعوا عنه
ينخفض توافره الحيوي إذا أخذ مع الطعام, فالطعام يخفض التركيز
البلازمي الذروي بمقدار 42% و AUC بمقدار 23% لكن هذا
التأثير ليس له أهمية سريرية, يؤخذ ثلاث مرات باليوم بغض النظر
عن الطعام, بالنسبة للمرضى الذين يتناولون ثلاث وجبات بانتظام
يوميًا يمكن أن يتناولوا الدواء مع وجبات الطعام لزيادة المطاوعة
(Martindale Thirty-sixth edition) (AHFS Drug Information)

Acarbose

مثبط لخميرة ألفا- غلوكوزيداز يستخدم لخفض سكر الدم
يؤخذ مع بداية الطعام أو قبله مباشرة
(Martindale Thirty-sixth edition) (AHFS Drug Information)
(British National Formulary 57) (Pocket Clinical Drug Reference)
(الشامل في الأدوية السريرية)

Acebutolol

خافض للضغط من حاصرات بيتا
ينقص الطعام من معدل امتصاصه (السرعة) بشكل قليل و ينقص

التركيز المصلي الذروي للأسيتوتولول و مستقبله الرئيسي (diacetolol) , لكن الكمية الممتصة لا تتأثر بشكل هام يمكن تناوله بعيداً عن وجبات الطعام (الشامل في الأدوية السريرية) (AHFS Drug Information)

Acemetacin

مضاد التهاب غير ستيرويدي
يؤخذ الأسيميتاسين مع الطعام (British National Formulary 57)

Acetazolamide

مدر و مضاد اختلاج و يستخدم في علاج داء المرتفعات و يستخدم
لخفض ضغط العين
لا يؤثر الطعام على امتصاص الكبسولات مديدة التحرر, يؤخذ
الأسيتازولاميد مع الطعام
(الشامل في الأدوية السريرية) (AHFS Drug Information)

Acetohexamide

خافض لسكر الدم ينتمي لمجموعة السلفونيل يوريا
يؤخذ قبل الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)
يؤخذ مع الطعام عند الإصابة بالغلتيان أو الثقل الشرسوفي
(الشامل في الأدوية السريرية)

Acetohydroxamic Acid

يستخدم للوقاية من الحصيات البولية الستروفييتية و يستخدم كمساعد
في علاج انتانات الجهاز البولي المزمنة

ينصح المصنعون بتناوله على معدة فارغة (AHFS Drug Information)

Acipimox

دواء خافض للشحوم

يؤخذ مع وجبات الطعام

(الشامل في الأدوية السريرية) (Martindale Thirty-sixth edition)

Acitretin

دواء شبيه بالريتينوئيد يستخدم لعلاج الصدف الشديد

يبلغ توافره الحيوي حوالي 60-70% و يزداد بوجود الطعام, يؤخذ

مع الوجبة الرئيسية (إن تناوله مع الطعام يزيد من تحمله)

(Wilson and Gisvold's Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry eleventh edition)

(Martindale Thirty-sixth edition) (AHFS Drug Information)

(Pharmacotherapy handbook Eighth Edition)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Activated Charcoal

(الفحم الفعال)

يستخدم في العلاج الإسعافي لبعض حالات التسمم و يستخدم

كمضاد إسهال و مضاد نفخة

في حال استخدامه في الاضطرابات الهضمية مثل النفخة و عسر

الهضم يؤخذ بعد الوجبات الطعامية أو عند ظهور أول علامات

الانزعاج البطني

(الشامل في الأدوية السريرية) (AHFS Drug Information)

Acyclovir

مضاد فيروسي

إن الطعام لا يؤثر على امتصاصه, يؤخذ بغض النظر عن الطعام
(AHFS Drug Information) (الشامل في الأدوية السريرية)

Adefovir

مضاد للفيروسات التقهقرية يستخدم لعلاج التهاب الكبد المزمن ب
يتأخر امتصاصه عندما يؤخذ مع الطعام لكنه لا ينقص, يؤخذ بغض
النظر عن الطعام

(AHFS Drug Information) (Martindale Thirty-sixth edition)

Albendazole

دواء طارد للديدان

إن امتصاصه من الجهاز الهضمي ضعيف و يزداد بنسبة 4-5
أضعاف عند تناوله مع وجبة دسمة لذا يؤخذ مع الطعام
(Martindale Thirty-sixth edition) (الشامل في الأدوية السريرية)

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

(Wilson and Gisvold's Textbook of Organic Medicinal and
Pharmaceutical Chemistry eleventh edition)

Alendronate

من مشتقات الفوسفات الثنائية

يستخدم لعلاج تخلخل العظام و داء باجيت العظمي
ينقص امتصاص الأليندرونات بوجود الطعام خصوصاً المنتجات
الحاوية على الكالسيوم و الكاتيونات متعددة التكافؤ الأخرى

تؤخذ الأقراص عند الاستيقاظ على معدة فارغة قبل الفطور بـ نصف ساعة على الأقل و يجب شرب الكثير من الماء ليس أقل من 200مل لكن ليس الماء المعدني و يجب تجنب الاستلقاء لمدة نصف ساعة بعد تناوله

(الشامل في الأدوية السريرية) (Martindale Thirty-sixth edition)

Alfuzosin Hydrochloride

حاصر لمستقبلات ألفا الأدرينية يستخدم لتدبير الأعراض الوظيفية الناجمة عن فرط تنسج البروستات الحميد إن امتصاصه من المستحضرات معدلة التحرر يتحسن إذا أخذ مع الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

يؤخذ بعد الطعام و في نفس الوقت كل يوم (Pocket Clinical Drug Reference) (الشامل في الأدوية السريرية)

Aliskiren Fumarate

دواء يستخدم في علاج فرط ضغط الدم ينخفض امتصاصه بشكل هام عند تناوله مع وجبة طعام عالية الدسم. يؤخذ قبل أو بعد الطعام لكن المرضى يجب أن يقيموا نمط روتيني فيما يتعلق بوجبات الطعام (Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

Allopurinol

يستخدم للوقاية من هجمة النقرس و الوقاية من الاعتلال الكلوي بفرط حمض البول و الوقاية من نكس حصيات أو كسالات الكالسيوم يؤخذ بعد الطعام للتخفيف من تهيج المعدة الذي يسببه و يجب تناول

كمية كبيرة من السوائل (على الأقل 10-12 كأس من الماء كل يوم)
و ذلك لمنع ترسب الكزانتين في الكلية

(AHFS Drug Information) (Martindale Thirty-sixth edition)

(British National Formulary 57) (الشامل في الأدوية السريرية)

Almotriptan

شاد انتقائي لمستقبلات السيروتونين $5-HT_1$ يستخدم في علاج نوبة
صداع الشقيقة الحادة

لا يؤثر الطعام على حرائكه الدوائية

يؤخذ بغض النظر عن وجبات الطعام

(AHFS Drug Information)

Alosetron

حاصر لمستقبلات $5-HT_3$ يستخدم لعلاج متلازمة الأمعاء الهیوجة
عندما يكون الإسهال هو المسيطر و ذلك عند النساء اللواتي لم
يستجبن على العلاج التقليدي أما فعاليته عند الرجال فهي غير مثبتة
إن معدل الامتصاص و الكمية الممتصة ينخفضان بعض الشيء

بوجود الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

فالطعام ينقص الامتصاص 25% و يتأخر التركيز المصلي الذروي
15 دقيقة, يؤخذ بغض النظر عن وجبات الطعام

(AHFS Drug Information)

Alprazolam

دواء حال للقلق من البنزوديازيبينات

إن الطعام عالي الدسم يغير معدل الامتصاص و ليس الكمية

المتنصة للأقراص المتنفتة و المتنفة التحرر

(AHFS Drug Information)

Altretamine

مضاد ورم

إن الطعام ينقص معدل الامتصاص و الكمية المتنصة للألترتامين
يوصي المصنعون بتقسيم الجرعة إلى 4 مرات (مثلاً جرعة بعد كل
وجبة طعام و جرعة وقت النوم) (AHFS Drug Information)

Aluminium hydroxide

يستخدم لعلاج فرط الحموضة المعوية و علاج فرط فوسفور الدم
إن وجود الطعام في المعدة أو وجود العوامل الأخرى التي تبطئ
التفريغ المعدي تزيد من تفاعل هيدروكسيد الألمنيوم و تحوله إلى
كلور الألمنيوم

يؤخذ بين وجبات الطعام و في وقت النوم

(Martindale Thirty-sixth edition)

أما لعلاج فرط فوسفات الدم فيؤخذ مع وجبات الطعام أو خلال
عشرين دقيقة من تناولها

(British National Formulary 57) (Martindale Thirty-sixth edition)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Ambrisentan

يستخدم في علاج ارتفاع الضغط الرئوي الوظيفي نمط 2 أو 3
لا يؤثر الطعام على امتصاصه, يؤخذ بغض النظر عن وجبات

الطعام (AHFS Drug Information)

Amiloride

مدر حافظ للبوتاسيوم

يبلغ توافره الحيوي 50% و ينخفض بوجود الطعام, لكن تناوله مع الطعام أو الحليب يقلل من تأثيراته الجانبية الهضمية (إن الأميلوريد من المدرات الحافظة للبوتاسيوم لذا يجب تجنب الأطعمة الحاوية على كمية كبيرة من البوتاسيوم مثل الموز و البرتقال)

(Martindale Thirty-sixth edition) (Pocket Clinical Drug Reference)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Aminosalicylic Acid and its salts

دواء مضاد للتدرن و بنفس الوقت مضاد التهاب غير ستيرويدي
إن التأثيرات الهضمية لهذا الدواء شائعة (غثيان , إقياء , إسهال) و
يمكن التخفيف منها بتناول الدواء مع الطعام أو مع مضادات

الحموضة (Martindale Thirty-sixth edition)

Amiodarone

دواء مضاد لاضطراب النظم

إن الطعام يرفع من معدل الامتصاص و الكمية الممتصة
للأميودارون, يؤخذ مع الطعام

(الشامل في الأدوية السريرية) (Martindale Thirty-sixth edition)

Amlodipine

دواء خافض للضغط الشرياني ينتمي لحاصرات قنوات الكالسيوم
لا يؤثر الطعام على امتصاص الأملوديبيين, يؤخذ بغض النظر عن

الطعام (Martindale Thirty-sixth edition) (AHFS Drug Information)

Amoxicillin

صاد حيوي من البنسلينات

لا يؤثر الطعام على توافره الحيوي أو له تأثير صغير, يؤخذ بغض النظر عن الطعام

(Wilson and Gisvold's Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry eleventh edition)

(AHFS Drug Information)

Amoxicillin and Clavulanate

يمكن تناوله مع الطعام أو وجبة خفيفة لتقليل تأثيراته الجانبية

الهضمية (AHFS Drug Information) (Pocket Clinical Drug Reference)

Ampicillin

صاد حيوي من البنسلينات

أقل من نصف الجرعة تمتص و ينقص الطعام من امتصاصه أكثر
لذا يؤخذ على معدة فارغة مع شرب كأس كامل من الماء (قبل
الطعام بنصف ساعة على الأقل أو بعده بساعتين)

(Martindale Thirty-sixth edition) (British National Formulary 57)

(Pocket Clinical Drug Reference) (AHFS Drug Information)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Amprenavir

مضاد فيروسي يستخدم في علاج الـ HIV

ينقص توافره الحيوي عند تناوله مع طعام عالي الدسم, يؤخذ بغض النظر عن الطعام لكن يجب تجنب الطعام عالي الدسم حتى لا ينقص

امتصاصه (AHFS Drug Information)

Anastrozole

هرمون مضاد للاستروجين مضاد للأورام يستخدم لعلاج سرطان الثدي

إن الطعام يخفض معدل الامتصاص (السرعة) لكنه لا يؤثر على الكمية الممتصة

يؤخذ بغض النظر عن الطعام

(Martindale Thirty-sixth edition) (AHFS Drug Information)

Aprepitant

مضاد إقياء

يؤخذ بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Aripiprazole

دواء مضاد للنفاس يستخدم في علاج الفصام

يؤخذ بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Artemether and Lumefantrine

أدوية مضادة للملاريا

يؤخذ هذا المزيج مع الطعام , فالطعام يزيد التوافر الحيوي لهما
Artemether : يزداد توافره الحيوي ضعفين إلى ثلاثة أضعاف عند تناوله بعد وجبة طعام عالية الدسم بالمقارنة مع تناوله على معدة فارغة

Lumefantrine يزداد توافره الحيوي ستة عشر ضعفاً عند تناوله

بعد وجبة طعام عالية الدسم بالمقارنة مع تناوله على معدة فارغة

(AHFS Drug Information)

Aspirin

مضاد التهاب غير ستيرويدي

يمكن أن يبطئ الطعام معدل امتصاص الأسبرين لكنه لا يؤثر على الكمية الممتصة, يفضل تناولها مع الطعام أو كمية كبيرة (240مل) من الماء أو الحليب لتقليل الانزعاج المعدي

(الشامل في الأدوية السريرية) (AHFS Drug Information)

Astemizole

مضاد هيستامين H₁ يستخدم لعلاج التحسس (يفيد في الوقاية أكثر من فائدته في الحالات الحادة و ذلك لأن بدء تأثيره بطيء و متأخر) ينخفض امتصاص الأستيميزول بوجود الطعام لذا يؤخذ على معدة فارغة (الشامل في الأدوية السريرية)

Atazanavir

مضاد للفيروسات التقهقرية يستخدم في علاج الـ HIV إن توافره الحيوي يتحسن إذا أخذ مع الطعام, يؤخذ مع الطعام (Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition) (الشامل في الأدوية السريرية)

Atenolol

حاصر انتقائي بيتا₁

يؤخذ الأتينولول بغض النظر عن الطعام (الشامل في الأدوية السريرية)

Atomoxetine hydrochloride

مثبط انتقائي لعودة قبط النور أدرينالين يستخدم لعلاج اضطراب
نقص التركيز

يؤخذ بغض النظر عن الطعام

(AHFS Drug Information)

Atorvastatin

دواء خافض للشحوم

إن الطعام يمكن أن يخفض التوافر الحيوي للأتورفاستاتين لكن ذلك
لا يؤثر على فعاليته الخافضة للشحوم

يؤخذ بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Atovaquone

مضاد للأوالي

إن التوافر الحيوي للمستحضرات الفموية السائلة أفضل من
الأقراص و يتحسن التوافر الحيوي إذا أخذ مع الطعام و خصوصاً
عالي الدسم لذا يؤخذ مع الطعام

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

(الشامل في الأدوية السريرية) (British National Formulary 57)

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

(Wilson and Gisvold's Textbook of Organic Medicinal and
Pharmaceutical Chemistry eleventh edition)

Auranofin

من مركبات أملاح الذهب يعطى في التهاب المفاصل الروماتويدي
و الصداقي و يشترك مع غيره من الأدوية لعلاج الفقاع

يؤخذ بعد الانتهاء من تناول الطعام بفترة قصيرة
(الشامل في الأدوية السريرية)

Azathioprine

مثبط للمناعة, مضاد للأورام
يمكن تخفيف تأثيراته الجانبية الهضمية بتناوله بعد الطعام
(AHFS Drug Information)

Azithromycin

صاد حيوي من الماكروليدات
يؤخذ الكبسول و المعلق معدل التحرر على معدة فارغة أما
الأقراص يمكن تناولها مع الطعام
(Martindale Thirty-sixth edition) (الشامل في الأدوية السريرية)

Bacampicillin

صاد حيوي من البنسلينات
لا يتأثر امتصاص هذا الدواء من الأقراص بوجود الطعام في المعدة
(Martindale Thirty-sixth edition)

Baclofen

مرخي للعضلات الهيكلية مركزي التأثير
وجد في دراسة أن الطعام لم يكن له تأثير هام على معدل
الامتصاص و كميته, يفضل تناوله مع أو بعد الطعام أو الحليب
(British National Formulary 57) (Martindale Thirty-sixth edition)
(الشامل في الأدوية السريرية)

Benazepril

خافض للضغط من مثبطات الأنزيم المحول للأنجوتنسين
لا يؤثر الطعام على امتصاص البنازيبيريل بشكل ملحوظ, يمكن
تناوله بغض النظر عن وجبات الطعام
يخضع لاستقلاب شديد و سريع في الكبد حيث يتشكل مستقلب فعال
هو بينازيبيريلات و الذي يبلغ عمره النصفى 1,5 – 2 ساعة إذا
تناوله المريض على معدة فارغة و 2-4 ساعات إذا تناوله بعد
الطعام (الشامل في الأدوية السريرية)

Benfluorex

دواء خافض للشحوم
يؤخذ مع وجبات الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

Benzatropine Mesilate

مضاد للكولين, مضاد لباركنسون
في حال الإصابة بانزعاج هضمي عند تناوله على معدة فارغة
يؤخذ مع أو بعد الطعام مباشرة
(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)
(الشامل في الأدوية السريرية)

Benzthiazide

مدر ينتمي لزمرة التيازيدات
يمكن تناول البنزثيازيد مع الطعام أو مع الحليب
(الشامل في الأدوية السريرية)

Benzylpenicillin (Penicillin G)

صاد حيوي

إن وجود الطعام في الجهاز الهضمي ينقص امتصاصه لذا يؤخذ
قبل الطعام بنصف ساعة على الأقل أو بعده بـ 2-3 ساعات

(Martindale Thirty-sixth edition)

Benzylthiouracil

دواء مضاد للدرق

يفضل تناوله مع الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

Bepriidil

حاصر لقنوات الكالسيوم يستخدم لعلاج الخناق المزمن المستقر
إن تناوله بعد الطعام ينقص معدل الامتصاص و ليس الكمية
الامتصة لذا يمكن تناوله بغض النظر عن الطعام

(AHFS Drug Information)

Betacarotene

طليعة فيتامين أ

يفضل تناوله مع الطعام و ذلك لأن امتصاصه يعتمد على وجود
الصفراء و الدسم القابلة للامتصاص

(Wilson and Gisvold's Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical
Chemistry eleventh edition)

(AHFS Drug Information) (Martindale Thirty-sixth edition)

Betahistine

شاد للمستقبلات الهيسامينية H1 يستخدم في داء مينير

يفضل تناوله مع الطعام

(British National Formulary 57) (Martindale Thirty-sixth edition)

Betamethasone

ستيروئيد قشري سكري

يؤخذ مستحضره الفموي مع الطعام أو الحليب

(الشامل في الأدوية السريرية)

Betaxolol Hydrochloride

حاصر بيتا

لا يتأثر امتصاصه من الجهاز الهضمي بالطعام

(AHFS Drug Information)

Bethanechol Chloride

دواء مقلد للكولين, يستخدم في علاج الاحتباس البولي و في علاج

القلس المعدي المريئي و في الحالات المترافقة بنقص حركية

الجهاز الهضمي

تؤخذ الجرعة الفموية على معدة فارغة قبل الطعام بساعة أو بعده

بساعتين لتخفيف الإصابة بالغثيان و الإقياء

(Martindale Thirty-sixth edition) (AHFS Drug Information)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Bexarotene

مشتق من فيتامين أ, مضاد للأورام

يؤخذ مع وجبة الطعام

(يتحسن امتصاص البكساروتين بوجود وجبة طعام دسمة)

(British National Formulary 57) (Martindale Thirty-sixth edition)

(Wilson and Gisvold's Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical
Chemistry eleventh edition)

Bezafibrate

دواء خافض للشحوم

يؤخذ البيزافيبيرات مع أو بعد الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

Bicalutamide

مضاد للأندروجين, مضاد للأورام

يؤخذ بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Biperiden

دواء مضاد لباركنسون

يؤخذ مع أو بعد الطعام لتخفيف الانزعاج الهضمي

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

(AHFS Drug Information)

Bisacodyl

ملين

يؤخذ على معدة فارغة و يجب تجنب الحليب أو مضادات

الحموضة خلال ساعة من تناوله

(الشامل في الأدوية السريرية) (Pocket Clinical Drug Reference)

Bisoprolol Fumarate

حاصر بيتا1

لا يتأثر امتصاصه بوجود الطعام (AHFS Drug Information)
يؤخذ بغض النظر عن وجبات الطعام (الشامل في الأدوية السريرية)

Bosentan

يستخدم لعلاج ارتفاع التوتر الشرياني الرئوي
يؤخذ البوزينتات بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Bromocriptine

دواء مضاد لباركنسون و يستخدم في ورم الخلايا المفرزة
للبرولاكتين و ضخامة النهايات و قصور الغدد التناسلية و العقم عند
الرجال و النساء و لعلاج ثر اللبن
يؤخذ مع الطعام لتخفيف التأثيرات الهضمية التي يسببها

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

(British National Formulary 57) (Martindale Thirty-sixth edition)

(AHFS Drug Information) (الشامل في الأدوية السريرية)

Brompheniramine

حاصر هيستامين H₁, مضاد تحسس

يؤخذ البرومفينيرامين مع الطعام أو الحليب
(الشامل في الأدوية السريرية)

Budesonide

ستيروئيد قشري

لعلاج داء كرون يعطى البوديزونايد على شكل كبسول معدل التحرر معد للتأثير الموضعي في الجهاز الهضمي ,يؤخذ إما كجرعة وحيدة قبل الفطور أو مقسمة لثلاث أقسام قبل وجبات الطعام بحوالي نصف ساعة و ذلك حسب المستحضر

(Martindale Thirty-sixth edition)

تؤخر وجبة الطعام عالية الدسم التركيز المصلي الذروي حوالي 2.5 ساعة لكن الكمية الممتصة لا تتأثر (AHFS Drug Information)

Bumetanide

خافض للضغط من مدرات العروة
يمكن تناول البوميتانيد مع الطعام أو الحليب
(الشامل في الأدوية السريرية)

Bupropion

مضاد للاكتئاب و يستخدم للمساعدة على إيقاف التدخين
ليس للطعام تأثير هام على التركيز المصلي الذروي أو الكمية
المتصلة للأقراص مديدة التحرر (AHFS Drug Information)

Buspirone hydrochloride

دواء حال للقلق
يؤخذ مع الطعام حيث أن الطعام يزيد من توافره الحيوي
(Martindale Thirty-sixth edition) (الشامل في الأدوية السريرية)

Cabergoline

يستخدم لعلاج فرط برولاكتين الدم و ثر اللبن

يؤخذ مع الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

Candesartan cilexetil

خافض للضغط من حاصرات مستقبلات الانجوتنسين 2

يؤخذ بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Capecitabine

دواء مضاد للأورام

إن الطعام ينقص معدل الامتصاص و الكمية الممتصة, تبلع
الأقراص مع الماء خلال 30 دقيقة بعد وجبة الطعام

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

Captopril

خافض للضغط من مثبطات الأنزيم المحول للأنجوتنسين

ينقص الطعام من امتصاصه بنسبة 30-40% لذا يؤخذ على معدة
فارغة

(الشامل في الأدوية السريرية) (Pocket Clinical Drug Reference)

Carbamazepine

دواء مضاد للصرع و يستخدم للوقاية من الاضطراب ثنائي القطب
و يستخدم لتسكين الآلام العصبية

تؤخذ الأقراص العادية و المعلق مع الطعام أما الكبسولات مديدة
التحرر تؤخذ بغض النظر عن الطعام

(AHFS Drug Information)

Carbenicillin

صاد حيوي من البنسلينات

يؤخذ مع كأس كبيرة من الماء و يفضل على معدة فارغة
(الشامل في الأدوية السريرية)

Carbidopa

يستخدم مع الليفودوبا

يؤخذ مع الطعام لتجنب الإصابة بانز عاج هضمي
(الشامل في الأدوية السريرية)

Carglumic Acid

يستخدم في علاج فرط أمونيا الدم عند مرضى عوز

N-acetylglutamate synthase

يؤخذ مباشرة قبل الطعام

(British National Formulary 57)

Carteolol Hydrochloride

حاصر بيتا1 و بيتا2

يمكن تناوله بغض النظر عن الطعام

(الشامل في الأدوية السريرية)

Carvedilol

خافض للضغط من حاصرات بيتا

يؤخذ مع الطعام لتخفيض خطر الإصابة بانخفاض الضغط
الشرياني حيث أن الطعام يخفض من معدل الامتصاص (السرعة)

دون أن يؤثر على الكمية الممتصة

(Martindale Thirty-sixth edition) (Pocket Clinical Drug Reference)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Cefaclor

صاد حيوي من السيفالوسبورينات

لا يؤثر الطعام على الكمية الممتصة من السيفاكلور كبسول بينما
يزيد امتصاصه من الأقراص مديدة التحرر لذا تؤخذ الأقراص
مديدة التحرر مع الطعام لتحسين الامتصاص

(AHFS Drug Information)

Cefadroxil

صاد حيوي من السيفالوسبورينات

إن الطعام لا يؤثر على امتصاص السيفادروكسيل, يمكن تقليل
تأثيراته الجانبية الهضمية بتناوله مع الطعام

(AHFS Drug Information) (Martindale Thirty-sixth edition)

Cefalexin

صاد حيوي من السيفالوسبورينات

إذا أخذ السيفاليكسين مع الطعام يتأخر امتصاصه لكن الكمية الكلية
الممتصة لا تتغير

(Martindale Thirty-sixth edition) (الشامل في الأدوية السريرية)

Cefdinir

صاد حيوي من السيفالوسبورينات

إن تناول السيفدينير مع وجبة طعام عالية الدسم ينقص معدل الامتصاص بمقدار 16% و الكمية الممتصة بمقدار 10%

يؤخذ بغض النظر عن الطعام

(AHFS Drug Information)

Cefditoren pivoxil

صاد حيوي من السيفالوسبورينات جيل ثالث

يبلغ توافره الحيوي على معدة فارغة 14% و يزداد عندما يؤخذ مع

وجبة طعام مرتفعة الدسم لذا يؤخذ مع وجبات الطعام

(Martindale Thirty-sixth edition) (الشامل في الأدوية السريرية)

Cefixime

صاد حيوي من السيفالوسبورينات

يمتص 40-50% من الجرعة الفموية من الجهاز الهضمي سواء

أخذ مع الطعام أو بدونه لكن الطعام يؤخر زمن وصول التركيز

المصلي لذروته

(Martindale Thirty-sixth edition) (الشامل في الأدوية السريرية)

Cefpodoxime proxetil

صاد حيوي من السيفالوسبورينات

يبلغ توافره الحيوي 50% إذا أخذ على معدة فارغة و يزداد بوجود

الطعام لذا يفضل تناوله مع الطعام

(Martindale Thirty-sixth edition) (Pocket Clinical Drug Reference)

(Wilson and Gisvold's Textbook of Organic Medicinal and

Pharmaceutical Chemistry eleventh edition)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Cefprozil

صاد حيوي من السيفالوسبورينات
وجود الطعام لا يؤثر على امتصاصه أو له تأثير خفيف
(Martindale Thirty-sixth edition)

Cefradine

صاد حيوي من السيفالوسبورينات
يتأخر امتصاص السيفرادين بوجود الطعام لكن الكمية الكلية
الامتصة لا تتغير (Martindale Thirty-sixth edition)

Cefteram

صاد حيوي من السيفالوسبورينات
يؤخذ بعد وجبات الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

Ceftibuten

صاد حيوي من السيفالوسبورينات
إن الطعام يؤخر امتصاصه و ينقص الكمية الممتصة لذا يؤخذ على
معدة فارغة
(الشامل في الأدوية السريرية) (Martindale Thirty-sixth edition)

Cefuroxime axetil

صاد حيوي من السيفالوسبورينات
يزداد معدل امتصاصه عندما يعطى مع الطعام أو بعده بقليل لذا

يؤخذ مع الطعام أو بعده

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

(Wilson and Gisvold's Textbook of Organic Medicinal and
Pharmaceutical Chemistry eleventh edition)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Celecoxib

مضاد التهاب غير ستيرويدي

يزداد التوافر الحيوي للسيليكوكسيب عند تناوله مع وجبة طعام
عالية الدسم

يذكر المصنعون أن السيليكوكسيب بجرعات حتى 200مغ مرتين
باليوم يؤخذ بغض النظر عن الطعام أما الجرعات الأعلى (400مغ
مرتين باليوم) يؤخذ مع الطعام لتحسين الامتصاص

(AHFS Drug Information)

Celiprolol

من حاصرات بيتا

يؤخذ السيليبيرولول قبل الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

Cetirizine

مضاد هيستامين H₁ يستخدم لعلاج التحسس

يؤخر الطعام الزمن اللازم للوصول للتركيز المصلي الذروي
(يبطئ معدل الامتصاص) لكنه لا ينقص الكمية الممتصة من الدواء

يمكن تناول السيتريزين بغض النظر عن الطعام

(Wilson and Gisvold's Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical
Chemistry eleventh edition)

Chlorambucil

دواء مضاد للأورام

ينقص تناوله مع الطعام من توافره الحيوي بنسبة 10-20%

(الشامل في الأدوية السريرية)

Chloramphenicol

صاد حيوي

يؤخذ على معدة فارغة و لكن يمكن تناوله مع الطعام إذا سبب
انزعاجاً هضمياً فيما لو أخذ على معدة فارغة, قد ينقص هذا الدواء
معدل امتصاص فيتامين ب12 عبر الأمعاء و قد يحتاج المريض
الذي يتناوله لحمية غنية بفيتامينات ب2 و ب6 و ب12

(الشامل في الأدوية السريرية)

Chloroquine

دواء مضاد للملاريا و يستخدم لعلاج الأميبية الكبدية و الذئبة
الحمامية و التهاب المفاصل الرثياني و الفقاع و صلابة الجلد
يؤخذ مع الطعام لتخفيف الاضطرابات الهضمية التي يسببها كما أن
توافره الحيوي يزداد عند تناوله فموياً إذا أخذ مع الطعام و بعض
الأشربة

(الشامل في الأدوية السريرية) (Martindale Thirty-sixth edition)

Chlorothiazide

مدر تيازيدي ينتمي لزمرة السلفوناميدات

إن تناوله مع الطعام يزيد الكمية الممتصة (AHFS Drug Information)
يمكن تناول الكلوروتيازيد مع الطعام أو الحليب
(الشامل في الأدوية السريرية)

Chlorpropamide

خافض لسكر الدم ينتمي لمجموعة السلفونيل يوريا
قد يسبب انزعاجاً هضماً لذا يؤخذ مع الطعام
(British National Formulary 57) (Martindale Thirty-sixth edition)
(الشامل في الأدوية السريرية)

Chlortalidone

مدر من السلفوناميدات
يمكن تناول الكلورتاليدون مع الطعام أو الحليب
(الشامل في الأدوية السريرية)

Chlorzoxazone

مرخي عضلي مركزي التأثير
يؤخذ مع وجبات الطعام لتخفيف الاضطرابات الهضمية
(Pocket Clinical Drug Reference)

Cholera Vaccine

لقاح الكوليرا الفموي
الطعام و الشراب و الأدوية الفموية الأخرى يجب تجنبها خلال
ساعة قبل و بعد التلقيح
(British National Formulary 57) (Martindale Thirty-sixth edition)

Choline Magnesium Trisalicylate

مضاد التهاب لاستيرويدي

يؤخذ مع الطعام لتخفيف تأثيراته الجانبية الهضمية
قد يسبب تناول الأطعمة والأشربة الحاوية على الساليسيلات (مثل
البهار الهندي و الفلفل الحلو و السوس و الخمر البنديكتي و الخوخ
و الزبيب و الشاي و الجركين) تراكم الساليسيلات في جسم
المريض

(الشامل في الأدوية السريرية)

Choline Salicylate

مضاد التهاب لاستيرويدي

يؤخذ مع الطعام أو الحليب لتخفيف تأثيراته الجانبية الهضمية
(الشامل في الأدوية السريرية)

Cidofovir

دواء مضاد للفيروسات

يؤخذ مع البروبنسيد (يؤخذ مزيج سيدوفوفير و البروبنسيد بعد
الطعام للتخفيف من الغثيان و الإقياء الممكن أن يسببهما البروبنسيد)

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Cilostazol

موسع وعائي (يستخدم في أمراض الأوعية المحيطية) و مثبط
لتكدس الصفائح

يؤخذ قبل الطعام بنصف ساعة على الأقل أو بعده بساعتين

(British National Formulary 57) (Martindale Thirty-sixth edition)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Cimetidine

حاصر لمستقبلات الهيستامين H₂ يستخدم لعلاج القرحة المعدية و
العفجية و القلس المعدي المريئي و حالات فرط الإفراز المعدي و
معالجة متلازمة المعى القصير و لإنقاص تدرّك الأنزيمات
البنكرياسية المأخوذة بشكل إضافات

يؤخذ مع الطعام (الشامل في الأدوية السريرية)

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

لكن عند استخدامه لإنقاص تدرّك الأنزيمات البنكرياسية المأخوذة
بشكل إضافات يؤخذ قبل الطعام بـ 60-90 دقيقة

(Martindale Thirty-sixth edition)

يبلغ التركيز البلاسمي الذروة بعد حوالي ساعة من تناوله على معدة
فارغة (يمكن أن تظهر ذروة ثانية بعد حوالي 3 ساعات) أما عند
تناوله مع الطعام فإنه يبلغ الذروة بعد حوالي ساعتين و يؤخر
الطعام امتصاصه و يخفض الكمية الممتصة قليلاً

(Martindale Thirty-sixth edition)

Cinacalcet Hydrochloride

يستخدم في علاج فرط الدريقات الثانوي عند مرضى الكلية
المزمنين و الخاضعين للديليزة بالإضافة إلى تخفيض فرط كالسيوم
الدم عند مرضى كارسينوما الدريقة أو فرط الدريقات الأولي
تبلغ التراكيز المصلية ذروتها عند تناولها فمويّاً بعد 2-6 ساعات و
تزيد بشكل كبير عندما يؤخذ مع الطعام

(Martindale Thirty-sixth edition)

Cinitapride

يستخدم لعلاج خزل المعدة و القلس المعدي المريئي

يؤخذ قبل وجبات الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

Cinoxacin

صاد حيوي من الكينولونات

إن الطعام يخفض تركيزه المصلي الذروي بنسبة 30% و لكنه لا يؤثر على الكمية الكلية الممتصة, يمكن تناوله مع الطعام لتخفيف شدة الركودة المعدية التي قد يسببها هذا الدواء (الشامل في الأدوية السريرية)

Ciprofloxacin

صاد حيوي من الكينولونات

إن الطعام يؤخر امتصاصه لكنه لا يؤثر على الكمية الممتصة بشكل هام و التي تبلغ (20-35%) بعد تناوله فمويًا , يمكن تناوله مع الطعام (لكن ليس الأطعمة الغنية بالكالسيوم) لتخفيف الركودة المعدية التي يسببها مع شرب كمية كبيرة من السوائل

(Wilson and Gisvold's Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry eleventh edition)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Cisapride

يستخدم لعلاج القلس المعدي المريئي و عسر الهضم غير قرحي المنشأ و لعلاج الخزل المعدي و الإمساك المزمن

يؤخذ قبل الطعام بـ 15-30 دقيقة (Martindale Thirty-sixth edition)

Citalopram Hydrobromide

مضاد اكتئاب مثبط انتقائي لعودة قبط السيروتونين
ليس للطعام تأثير هام على امتصاص السيتالوبرام لذا يؤخذ بغض
النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Citrate salts

دواء مقلون
يفضل تناول المحاليل الفموية لأملاح السيترات بعد الطعام و ذلك
لتجنب تأثيرها المسهل (AHFS Drug Information)

Clarithromycin

صاد حيوي من الماكروليدات
يؤخر الطعام امتصاصه لكنه لا يؤثر على الكمية الممتصة أو حتى
أنه قد يزيدها , يؤخذ بغض النظر عن الطعام (يمكن تناوله مع
الطعام إذا سبب اضطرابات هضمية) (الشامل في الأدوية السريرية)

Clebopride

يستخدم مضاد للغثيان و الإقياء و في اضطرابات هضمية أخرى
يؤخذ قبل وجبات الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

Clidinium Bromide + Chlordiazepoxide

عند استخدامه لعلاج متلازمة الأمعاء الهیوجة و القرحة الهضمية
يؤخذ قبل وجبات الطعام و عند النوم (الشامل في الأدوية السريرية)

Clindamycin

صاد حيوي من اللينكوزاميدات

إن الطعام يؤخر من وصول تركيزه المصلي لذروته لكنه ليس له تأثير هام على الكمية الممتصة , يؤخذ بغض النظر عن الطعام مع كأس كامل من الماء لتجنب الإصابة بالتخريش المريئي

(AHFS Drug Information) (الشامل في الأدوية السريرية)

Clodronate

من مشتقات البيسفوسفونات يستخدم لعلاج فرط كلس الدم الناجم عن الخباثة

إن امتصاصه ضعيف من الجهاز الهضمي و ينقص بوجود الطعام خصوصاً الحاوي على الكالسيوم و الكاتيونات متعددة التكافؤ الأخرى, يبلغ توافره الحيوي 1-4% فقط

يجب تجنب الطعام لساعة على الأقل قبل تناول الجرعة و بعدها خصوصاً الحاوي على الكالسيوم مثل الحليب و أيضاً يجب تجنب الحديد و الإضافات المعدنية و مضادات الحموضة , و يجب تناول كمية كافية من السوائل

(British National Formulary 57) (Martindale Thirty-sixth edition)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Clofazimine

صاد حيوي يستخدم لعلاج الجذام

الامتصاص يكون أعظمي عندما يؤخذ مباشرة بعد الطعام , يؤخذ مع الطعام أو بعده مباشرة و ذلك للحصول على امتصاص أعظمي و للتخفيف من تأثيراته الجانبية الهضمية

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

(الشامل في الأدوية السريرية) (Martindale Thirty-sixth edition)

Clofibrate

دواء خافض لشحوم الدم

يمكن تناوله مع الطعام لتخفيف عسرة الهضم التي قد يسببها

(الشامل في الأدوية السريرية)

Clomipramine hydrochloride

مضاد اكتئاب ثلاثي الحلقة

إن الطعام ليس له تأثير مهم على التوافر الحيوي لكبسولات

الكلوميبرامين (AHFS Drug Information)

Clopidogrel Bisulfate

دواء مضاد لتكدس الصفائح

يؤخذ بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Cloxacillin

صاد حيوي من البنسلينات

ينقص امتصاص الكلوكزاسيللين بوجود الطعام في المعدة لذا يؤخذ

على معدة فارغة

(الشامل في الأدوية السريرية) (Martindale Thirty-sixth edition)

Clozapine

دواء مضاد للنفاس

إن الطعام ليس له تأثير على معدل الامتصاص أو الكمية الممتصة
يؤخذ بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Codergocrine Mesilate

دواء يستخدم في علاج الخرف
يفضل تناوله قبل الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

Colchicine

يستخدم الكولشيسين في علاج هجمات النقرس الحادة و الوقاية من
نكسها و يستخدم لتدبير حمى البحر المتوسط العائلية
إن تناوله مع الطعام لا يؤثر على معدل الامتصاص لكنه ينقص
الكمية الممتصة حوالي 15% , يؤخذ بغض النظر عن الطعام (AHFS
Drug Information)

Colesevelam Hydrochloride

دواء خافض للشحوم , يؤخذ مع الطعام و ذلك لأن الكوليستيريفيلام
يرتبط بالصفراء التي يتم إفرازها أثناء الطعام
(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)
(Pharmacotherapy handbook Eighth Edition) (AHFS Drug Information)
(الشامل في الأدوية السريرية)

Cortisone Acetate

ستيروئيد قشري
يؤخذ مع الحليب أو الطعام (الشامل في الأدوية السريرية)

Cyanocobalamin

فيتامين ب12

يؤخذ مستحضره الفموي بين وجبات الطعام

(British National Formulary 57) (Martindale Thirty-sixth edition)

Cyproterone Acetate

مضاد اندروجيني

يؤخذ بعد الطعام

(British National Formulary 57) (Martindale Thirty-sixth edition)

Dabigatran Etexilate

يستخدم للوقاية من venous thromboembolism

يؤخر الطعام من الزمن اللازم للوصول للتركيز الذروي لكن
التوافر الحيوي لا يتأثر

(Martindale Thirty-sixth edition)

Danazol

أندروجين

يزداد امتصاصه بشكل كبير إذا أخذ مع الطعام

(Martindale Thirty-sixth edition)

Darunavir

دواء مضاد للفيروسات يستخدم في علاج الـ HIV

إن الطعام يزيد التوافر الحيوي للدواء, يؤخذ مع الطعام

(Martindale Thirty-sixth edition) (Pocket Clinical Drug Reference)

Dasatinib

دواء مضاد للورم

يؤخذ بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Deferasirox

دواء يستخدم في علاج فرط حمل الحديد المزمن

يبلغ توافره الحيوي المطلق حوالي 70% و يزداد بوجود الطعام

يؤخذ على معدة فارغة قبل الطعام بنصف ساعة على الأقل

(Martindale Thirty-sixth edition)

Deferiprone

دواء يستخدم في علاج فرط حمل الحديد عند مرضى التلاسيميا

يمتص بسرعة من الجهاز الهضمي و بوجود الطعام يتباطأ

امتصاصه و ينقص التركيز المصلي الذروي

(Martindale Thirty-sixth edition)

Dehydrocholic Acid

يستخدم لتحسين التصريف الصفراوي و في العلاج المؤقت

للإمساك

يؤخذ بعد وجبات الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

Delavirdine mesylate

مضاد فيروسي

يؤخذ بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Demeclocycline

صاد حيوي من التتراسكليينات و يستخدم في علاج الشكل المزمن من متلازمة إفراز الهرمون المضاد للإدرار غير المناسب ينقص الطعام معدل امتصاصه لذا يؤخذ قبل الطعام بساعة أو بعده بساعتين مع شرب كمية وافرة من السوائل (الشامل في الأدوية السريرية) (Martindale Thirty-sixth edition)

Desloratadine

مضاد هيستامين H_1 يستخدم لعلاج التحسس يؤخذ الديسلوراتادين بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Dexamethasone

ستيروئيد قشري سكري و مضاد إقياء يؤخذ مع الوجبات الطعامية لتخفيف الاضطرابات الهضمية التي قد يسببها (الشامل في الأدوية السريرية)

Dexamfetamine Sulfate

(Dextroamphetamine Sulfate)

ينتمي لمجموعة الأمفيتامينات : منبه للجمله العصبية المركزية و محدث للقهم
لعلاج البدانة الخارجية المنشأ يؤخذ قبل الوجبة الطعامية ب 30-60

دقيقة

(الشامل في الأدوية السريرية) (AHFS Drug Information)

Dexfenfluramine

دواء محدث للقهم يشترك مع الحمية المناسبة لتخفيف وزن المريض
البدن

يؤخذ مع الطعام (الشامل في الأدوية السريرية)

Dexketoprofen

مضاد التهاب غير ستيرويدي

على الرغم من أنه ينصح بأخذ مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية
بعد الطعام لتخفيف التأثيرات الهضمية الناجمة عنها ينصح بتناول
ديكسكيتوبروفين قبل الطعام بنصف ساعة على الأقل في حال الألم
الحاد و ذلك لأن امتصاصه يتأخر إذا أخذ مع الطعام

(Martindale Thirty-sixth edition)

Dexmethylphenidate Hydrochloride

منبه مركزي يستخدم في علاج اضطراب نقص الانتباه مع فرط
النشاط

يؤخذ بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Dextropropoxyphene

(Propoxyphene)

مسكن ألم أفيوني

يمكن تناول الديكستروبروبوكسيفين مع الطعام حيث أن ذلك يزيد

توافره الحيوي لكن سرعة الامتصاص تتباطأ

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Diclofenac

مضاد التهاب غير ستيرويدي

لا تتأثر الكمية الممتصة بشكل هام بوجود الطعام, يؤخذ مع الطعام
أو الحليب لتخفيف تأثيراته الجانبية الهضمية

(AHFS Drug Information) (Pocket Clinical Drug Reference)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Dicloxacillin

صاد حيوي من البنسلينات

ينقص امتصاص الديكلوكزاسيللين بوجود الطعام في المعدة لذا
تؤخذ الجرعة الفموية على معدة فارغة

(Martindale Thirty-sixth edition) (Pocket Clinical Drug Reference)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Dicoumarol

مضاد تخثر

يزداد توافره الحيوي بوجود الطعام

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

Didanosine

دواء مضاد للفيروسات

عند تناوله مع الطعام تنخفض تراكيزه المصلية بنسبة 50% لذا
يؤخذ على معدة فارغة

(British National Formulary 57) (Martindale Thirty-sixth edition)

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

(Wilson and Gisvold's Textbook of Organic Medicinal and
Pharmaceutical Chemistry eleventh edition)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Diethylpropion Hydrochloride

دواء محدث للقمه يستخدم لفترة قصيرة في سياق علاج البدانة
الخارجية المنشأ

تؤخذ الأقراص العادية غير معدلة التحرر 3 مرات باليوم قبل
وجبات الطعام بساعة

(AHFS Drug Information) (Martindale Thirty-sixth edition)

Diflunisal

مضاد التهاب غير ستيرويدي

ينقص الطعام معدل امتصاصه (السرعة) قليلاً لكنه ليس له تأثير أو
يملك تأثير صغير على الكمية الممتصة, يؤخذ مع الطعام أو الحليب

أو الماء (AHFS Drug Information)

Digoxin

مقوي لقلوصية العضلة القلبية و مضاد لاضطراب النظم

يؤخر الطعام امتصاصه لكنه لا يؤثر على الكمية الممتصة

(Martindale Thirty-sixth edition) (الشامل في الأدوية السريرية)

Dihydrocodeine Tartrate

مسكن أفيوني

يؤخذ بعد الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

Diiodohydroxyquinoline (iodoquinol)

دواء مضاد للأوالي و له بعض الفعالية المضادة للجراثيم و الفطور
يمكن تناوله مع الطعام أو الحليب لتخفيف الانزعاج الهضمي الذي
قد يسببه (الشامل في الأدوية السريرية)

Dipheganil Metilsulfate (Dipheganil Methylsulfate)

حاصر موسكاريني يستخدم فموياً في علاج بطء القلب الأعراض
عند الأطفال و يستخدم موضعياً في علاج فرط التعرق
امتصاصه ليس جيداً من الجهاز الهضمي و خصوصاً بوجود
الطعام, يؤخذ بين وجبات الطعام

(Wilson and Gisvold's Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical
Chemistry eleventh edition)

Dipyridamole

مضاد لتكدس الصفائح و موسع للأوعية الإكليلية
يفضل تناول الديبيريدامول على معدة فارغة

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

(Martindale Thirty-sixth edition) (AHFS Drug Information)

Dirithromycin

صاد حيوي من الماكروليدات

يتحسن امتصاصه بوجود الطعام, يؤخذ مع الطعام أو خلال ساعة
من تناوله

(AHFS Drug Information) (Martindale Thirty-sixth edition)

Distigmine Bromide

يستخدم في علاج الوهن العضلي الوبيل
يؤخذ قبل الفطور بنصف ساعة

(British National Formulary 57) (Martindale Thirty-sixth edition)

Dofetilide

مضاد لاضطراب النظم

تستعمل الأطعمة التي تثبط الايزوزيم CYP3A4 من أنزيمات
السيتوكروم p450 بحذر مع هذا الدواء و ذلك لأنه يستقلب بهذا
الايزوزيم (مثل عصير فاكهة الكريب)
يؤخذ بغض النظر عن الطعام

(Martindale Thirty-sixth edition) (AHFS Drug Information)

Domperidone

دواء مضاد للدوبامين يستخدم لعلاج الغثيان و الإقياء و لعلاج
اضطرابات حركة الجهاز الهضمي

إن systemic bioavailability يبلغ 15% فقط عند تناوله فمويّاً على
معدة فارغة و يزداد عندما يؤخذ بعد الطعام

(Martindale Thirty-sixth edition)

لعلاج اضطرابات حركة الجهاز الهضمي يؤخذ قبل وجبات الطعام

ب 15-30 دقيقة

(الشامل في الأدوية السريرية)

Donepezil hydrochloride

مقلد للكولين يستخدم في علاج الخرف

إن الطعام لا يؤثر على معدل الامتصاص و الكمية الممتصة لذا

يمكن تناوله مع الطعام أو بدونه (AHFS Drug Information)

Doxazosin

خافض للضغط من حاصرات مستقبلات ألفا و يستخدم لتخفيف

أعراض الاحتباس البولي المرافق لضخامة المثانة الحميدة

ينقص الطعام متوسط التراكيز المصلية الذروية بمقدار 18% و

ينقص الـ AUC بمقدار 12% لكن ذلك ليس له أهمية سريرية

(AHFS Drug Information)

Doxycycline

صاد حيوي من التتراسكليينات

إن الدوكسيسيكليين له إلفة للارتباط بالكالسيوم أخفض من إلفة الكثير

من التتراسكليينات و لذلك امتصاصه أقل تأثراً بالطعام و الحليب)

ينقص معدل امتصاصه بنسبة 20% عند تناوله مع الطعام) يمكن

أن يؤخذ مع الطعام أو الحليب إذا سبب اضطرابات معدية مع شرب

كمية وافرة من السوائل و يجب عدم الاستلقاء لمدة 30 دقيقة بعد

تناوله لتجنب أذية المري

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

(الشامل في الأدوية السريرية) (British National Formulary 57)

Dronabinol

دواء مضاد إقياء و يستخدم لعلاج القهم الناجم عن الإصابة
بمتلازمة عوز المناعة المكتسب

لعلاج القهم يؤخذ قبل الغداء و قبل العشاء (الشامل في الأدوية السريرية)

Duloxetine

مضاد للاكتئاب مثبت انتقائي لعودة قبط كل من السيروتونين و
النورادرينالين

يمتص الدولوكسيتين بشكل جيد من الجهاز الهضمي و يصل
تركيزه المصلي إلى الذروة بعد 6 ساعات من تناول الجرعة
الفموية لكن تناول الطعام يؤخر الوصول إلى التركيز المصلي
الذروي إلى 10 ساعات و تنقص الكمية الممتصة حوالي 10%
يؤخذ بغض النظر عن الطعام

(AHFS Drug Information) (Martindale Thirty-sixth edition)

Dutasteride

مثبط لخميرة 5 الفا- ريديوكتاز يستخدم في علاج فرط تنسج
البروستات الحميد

يؤخذ بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Efavirenz

مضاد فيروسي

يزداد توافره الحيوي عند تناوله بعد وجبة طعام عالية الدسم لكن
تأثيراته الجانبية تزداد عند تناوله مع الطعام و ذلك بسبب ارتفاع

التراكيز البلازمية للدواء لذا يؤخذ على معدة فارغة و يفضل وقت النوم لأن ذلك يخفف التأثيرات الجانبية على الـ CNS

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

Emtricitabine

مضاد فيروسي

يؤخذ بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Enalapril

خافض للضغط من مثبطات الأنزيم المحول للأنجوتنسين
لا يؤثر الطعام على امتصاص الينالابريل , يؤخذ بغض النظر عن الطعام

تؤخذ الأقراص الحاوية على اينالابريل مع فيلوديبين بدون طعام أو مع وجبة طعام خفيفة و ذلك لأن تناولها مع وجبة طعام كبيرة يزيد التراكيز المصلية الذروية للفيلوديبين (AHFS Drug Information)

Encainide hydrochloride

مضاد لاضطراب النظم

إن معدل الامتصاص ينخفض قليلاً بوجود الطعام لكن الكمية الممتصة لا تتأثر, يمكن تخفيف بعض تأثيراته الجانبية بتناوله مع الطعام (AHFS Drug Information)

Entacapone

دواء مضاد لباركنسون

لا يتأثر الامتصاص بشكل هام بوجود الطعام , يؤخذ بغض النظر

عن الطعام

(AHFS Drug Information) (Martindale Thirty-sixth edition)

Epalrestat

يستخدم لعلاج مضاعفات السكري بما فيه اعتلال الأعصاب

يؤخذ قبل وجبات الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

Eperisone Hydrochloride

مرخي للعضلات الهيكلية مركزي التأثير و يملك أيضاً تأثير موسع للأوعية

يؤخذ بعد الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

Eplerenone

حاصر انتقائي لمستقبلات الألدوستيرون يستخدم لعلاج ارتفاع التوتر الشرياني و يستخدم لعلاج قصور القلب الاحتقاني التالي لاحتشاء العضلة القلبية

لا يؤثر الطعام على امتصاصه, يؤخذ بغض النظر عن وجبات الطعام

(AHFS Drug Information)

Eprosartan Mesilate

خافض للضغط من حاصرات مستقبلات الانجوتنسين 2

يؤخر الطعام من امتصاصه لكن ذلك ليس له أهمية سريرية , يؤخذ بغض النظر عن الطعام

(Martindale Thirty-sixth edition) (AHFS Drug Information)

Erdosteine

دواء حال للبلغم

لا يتأثر امتصاصه بوجود الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

Erlotinib

دواء مضاد للورم

يبلغ توافره الحيوي 60% و قد يزداد بوجود الطعام لحوالي 100%
, يؤخذ قبل الطعام بساعة أو بعده بساعتين على الأقل
(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

Erythromycin

صاد حيوي من الماكروليدات

إن الطعام ينقص امتصاص إريثرومايسين أساس و إريثرومايسين
ستيرات بالرغم من أن ذلك يعتمد إلى حد ما على المستحضر)
تؤخذ على معدة فارغة لكن يمكن تناولها مع الطعام عند حدوث
اضطرابات هضمية (

أما الاستر (إريثرومايسين إيتيل سوكسينات) فتأثير الطعام صغير
على امتصاصه (يؤخذ مع الطعام)

و يستخدم الإريثرومايسين لتحسين الإفراغ المعدي و حركية
الأمعاء و عند ذلك يؤخذ قبل وجبة الطعام بنصف ساعة

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Escitalopram oxalate

مضاد اكتئاب مثبط انتقائي لعودة قبط السيروتونين

يؤخذ الإيسيتالوبرام بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Eseridine salicylate

مشتق من الفيزوستغمين , مثبط لنشاط الكولين أستراز , يستخدم لعسر الهضم, يؤخذ قبل وجبات الطعام بنصف ساعة

(Martindale Thirty-sixth edition)

Esomeprazole

مثبط لمضخة البروتون ينقص إفراز حمض كلور الماء في المعدة يؤخذ قبل ساعة على الأقل من تناول الطعام و ذلك لان الـ AUC ينخفض حوالي 33-35% عند تناول 40مغ من هذا الدواء بعد الطعام

يمكن فتح الكبسولة و مزج الحثيرات مع كمية قليلة من طعام رخو و تبلع مباشرة دون مضغ

(Pocket Clinical Drug Reference) (AHFS Drug Information)

Estramustine

دواء مضاد للورم

يؤخذ على معدة فارغة قبل الطعام بساعة أو بعده بساعتين على الأقل و يجب تجنب تناوله بشكل خاص مع الحليب و مشتقاته

(British National Formulary 57) (Martindale Thirty-sixth edition)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Etacrynic Acid

دواء مدر, يؤخذ مع الطعام

(الشامل في الأدوية السريرية) (Martindale Thirty-sixth edition)

Ethambutol

دواء مضاد للتدرن

إن وجود الطعام في المعدة لا يقلل امتصاص الإيتامبوتول بشكل مهم لكن تناول طعام غني بالدهن أو معدلات الحموضة يمكن أن يؤخر الامتصاص و يخفض التركيز المصلي الذروي ,يمكن أن يسبب هذا الدواء وهناً معدياً لذا يؤخذ مع الطعام
(Martindale Thirty-sixth edition) (الشامل في الأدوية السريرية)

Ethchlorvynol

مهدئ و مركن

قد يسبب عند بعض المرضى نتيجة الامتصاص السريع دوخة و رنج و يمكن تخفيف ذلك بتناوله مع الطعام لذا يؤخذ مع الطعام
(Martindale Thirty-sixth edition) (الشامل في الأدوية السريرية)

Ethionamide

دواء مضاد للتدرن , يؤخذ مع الطعام

(Martindale Thirty-sixth edition) (الشامل في الأدوية السريرية)

Ethosuximide

دواء مضاد للصرع

يؤخذ الإيتوسوكسيميد مع الطعام إذا سبب اضطراب هضمي

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Ethotoin

دواء مضاد للصرع, يؤخذ بعد وجبات الطعام

(AHFS Drug Information) (Martindale Thirty-sixth edition)

Etidronate

من مشتقات البيسفوسفونات

ينقص امتصاصه بوجود الطعام خصوصاً الحاوي على الكالسيوم و الكاتيونات متعددة التكافؤ الأخرى , يجب تجنب الطعام لساعتين قبل و بعد الجرعة الفموية و يجب تجنب الحديد و الإضافات المعدنية و مضادات الحموضة

(British National Formulary 57) (Martindale Thirty-sixth edition)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Etodolac

مضاد التهاب غير ستيرويدي

إن الكمية الممتصة للإيتودولاك لا تتأثر بشكل هام بتناوله مع الطعام , يؤخذ مع الطعام أو الحليب أو الماء

(AHFS Drug Information) (الشامل في الأدوية السريرية)

Etoposide

دواء مضاد للأورام

لا تتأثر الكمية الممتصة بالطعام (AHFS Drug Information)

Etoricoxib

مضاد التهاب غير ستيرويدي انتقائي على سيكلو أوكسيجيناز 2

يمتص الإيتوريكوكسيب بشكل جيد بعد تناوله فمويًا , يصل التركيز المصلي لذروته بعد حوالي ساعة من تناوله على معدة فارغة عند الشخص البالغ و يؤخر الطعام الامتصاص بحوالي ساعتين لكنه لا يؤثر على الكمية الممتصة

(Martindale Thirty-sixth edition)

Etravirine

دواء مضاد للفيروسات

يزيد امتصاصه بوجود الطعام بحوالي 50% لذا يؤخذ بعد الطعام

(British National Formulary 57) (Martindale Thirty-sixth edition)

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

Etretinate

يستخدم فمويًا لعلاج الصدف

يمتص عبر الأمعاء الدقيقة و يتحسن امتصاصه عند تناوله مع الحليب أو مع وجبة دسمة, يؤخذ مع الطعام و يجب عدم تناول فيتامين أ خلال فترة تناوله (تزداد سميته عند إشراكه مع فيتامين أ)

(Martindale Thirty-sixth edition) (الشامل في الأدوية السريرية)

Exemestane

دواء مضاد للورم يستخدم في علاج سرطان الثدي

إن توافره الحيوي يتعلق بالاستقلاب بالمرور الأول لكنه يزداد عندما يؤخذ مع الطعام, يفضل تناوله بعد وجبة الطعام

(Martindale Thirty-sixth edition) (AHFS Drug Information)

(Wilson and Gisvold's Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical

Exenatide

دواء يستخدم كمساعد في علاج داء السكري نمط 2, يعطى حقناً تحت الجلد
يؤخذ خلال ساعة قبل الطعام (قبل الطعام بـ 0-60 دقيقة), لا يؤخذ بعد الطعام

(Martindale Thirty-sixth edition) (Pocket Clinical Drug Reference)

(Pharmacotherapy handbook Eighth Edition)

(British National Formulary 57)

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

Ezetimibe

خافض لشحوم الدم, يؤخذ مع الطعام أو بدونه

(AHFS Drug Information) (Pharmacotherapy handbook Eighth Edition)

Famciclovir

دواء مضاد للفيروسات يستخدم في علاج الحلا النطاقي و الحلا البسيط

يتأخر امتصاصه بوجود الطعام لكنه لا ينقص, يمكن تناوله مع الطعام أو بدونه

(Martindale Thirty-sixth edition) (الشامل في الأدوية السريرية)

Famotidine

حاصر لمستقبلات الهستامين H_2 يقلل من إفراز الحمض المعدي
لا يؤثر الطعام على توافره الحيوي بشكل ملحوظ

(Martindale Thirty-sixth edition)

(Wilson and Gisvold's Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry eleventh edition)

لعلاج حرقه الفؤاد يؤخذ قبل 15-60 دقيقة من تناول الطعام

المسبب لذلك (Pocket Clinical Drug Reference)

Felbamate

مضاد اختلاج

تؤخذ الأقراص بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Felodipine

خافض للضغط من حاصرات قنوات الكالسيوم

إن التراكيز الذروية للدواء ترتفع حوالي 60% عندما يعطى الفيلوديبيين مع وجبة طعام غنية بالدهن أو الكربوهيدرات و لم يلاحظ تغيرات على الحرائك الدوائية عند تناوله مع وجبة طعام خفيفة لذا يذكر المصنعون أن الفيلوديبيين يجب أن يؤخذ بدون طعام أو مع وجبة خفيفة (AHFS Drug Information)

Fenfluramine Hydrochloride

دواء محدث للقمه يستخدم في العلاج قصير الأمد للبدانة

يؤخذ قبل الوجبات الطعامية (الشامل في الأدوية السريرية)

Fenofibrate

دواء خافض للشحوم

يؤخذ مع الطعام لتحسين توافره الحيوي لكن ذلك ليس ضرورياً في

بعض المستحضرات (Martindale Thirty-sixth edition)

Fenoprofen

مضاد التهاب غير ستيرويدي

إن الطعام و الحليب يخفضان من معدل الامتصاص و الكمية
المتصلة للفينوبروفين ,يؤخذ مع الطعام لتخفيف تأثيراته الجانبية
الهضمية

(Martindale Thirty-sixth edition) (British National Formulary 57)

(AHFS Drug Information) (الشامل في الأدوية السريرية)

Fenspiride Hydrochloride

دواء يستخدم في الربو و اضطرابات تنفسية أخرى له خواص
موسعة للقصبات و مضادة للالتهاب

يؤخذ قبل وجبات الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

fexofenadine hydrochloride

مضاد هيسامين غير مركن, مضاد تحسس

عندما يؤخذ الفيكسوفينادين لوحده (ليس في المستحضرات التي
يشرك معه البسودوافدرين) يمكن تناوله بغض النظر عن الطعام

أما الأقراص مديدة التحرر التي تحوي فيكسوفينادين و
بسودوافدرين تؤخذ بعيداً عن الطعام و ذلك لأن الطعام يؤثر بشكل
ملحوظ على معدل الامتصاص و الكمية المتصلة للفيكسوفينادين
من هذه الأقراص أما معدل الامتصاص و الكمية المتصلة
للپسودوافدرين من هذه الأقراص فإنه لا يتأثر بالطعام

(AHFS Drug Information)

Finasteride

مضاد اندروجيني و مضاد للأورام يستخدم في علاج ورم البروستات و الصلع الذكوري و في علاج الشعرانية لدى النساء
يؤخذ بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Flecainide

دواء مضاد لاضطراب النظم
إن امتصاصه لا يتأثر بوجود الطعام أو مضادات الحموضة لكن الحليب يعيق امتصاصه عند الأطفال, فالأطفال الذين يأخذون جرعة عالية من الفليكينايد و يعتمدون على الحليب في غذائهم يجب تخفيض الجرعة إذا أوقفوا الحليب أو تم استبداله
(Martindale Thirty-sixth edition)

Flucloxacillin

صاد حيوي من البنسلينات
ينخفض امتصاص الفلوكلوكزاسيللين بوجود الطعام في المعدة لذا يؤخذ قبل وجبات الطعام بنصف ساعة على الأقل
(Martindale Thirty-sixth edition) (British National Formulary 57)
(الشامل في الأدوية السريرية)

Fluconazole

دواء مضاد للفطور
إن امتصاصه لا يتأثر بتغير حموضة الجهاز الهضمي أو وجود الطعام, يؤخذ بغض النظر عن الطعام
(AHFS Drug Information)

Flucytosine

دواء مضاد للفطور

إن الطعام يخفض معدل الامتصاص و ليس الكمية الممتصة ,يؤخذ
مع الطعام

(AHFS Drug Information) (الشامل في الأدوية السريرية)

Fluoride

مادة معدنية تستخدم للوقاية من تسوس الأسنان

يؤخذ مع الطعام لكن ليس مع الحليب لتخفيف العسرة الهضمية التي
قد تنجم عنه

عند استخدام المحلول المعد للمضمضة أو الجل يجب عدم تناول
الطعام لمدة 30 دقيقة التالية

(الشامل في الأدوية السريرية)

Fluoxetine

مضاد للاكتئاب مثبط انتقائي لعودة قبط السيروتونين

يمتص الفلوكسيتين بسهولة عبر الجهاز الهضمي و لا يتأثر توافره
الحيوي بتناول الطعام لكن امتصاصه يتأخر حوالي 1-2 ساعة
,يؤخذ بغض النظر عن الطعام

(AHFS Drug Information) (Martindale Thirty-sixth edition)

Flurbiprofen

مضاد التهاب غير ستيرويدي

إن تناول الفلوربيروفين مع الطعام يغير معدل الامتصاص و لا يغير الكمية الممتصة, يؤخذ مع الطعام للتخفيف من تأثيراته الهضمية

(AHFS Drug Information) (الشامل في الأدوية السريرية)

Flurithromycin

صاد حيوي من الماكروليدات

يؤخذ بعد الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

Flutamide

مضاد للأندروجين, مضاد للأورام

يؤخذ بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Fluvastatin

خافض للشحوم

يؤخذ الفلوفاستاتين مساءً بغض النظر عن الطعام

(AHFS Drug Information)

Fluvoxamine

مضاد للاكتئاب مثبط انتقائي لعودة السيروتونين

يمتص الفلوفوكسامين بسهولة عبر الجهاز الهضمي و لا يتأثر توافره الحيوي بتناول الطعام, يؤخذ بغض النظر عن الطعام

(AHFS Drug Information) (Martindale Thirty-sixth edition)

Folinic Acid (Leucovorin)

فيتامين مشتق من حمض الفوليك
يمكن تناوله مع الطعام أو بعيداً عنه (الشامل في الأدوية السريرية)

Fosamprenavir calcium

مضاد فيروسى
يؤخذ بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Fosfomycin Tromethamine

صاد حيوي يستخدم في علاج انتانات الجهاز البولي
يمكن تناوله مع الطعام أو بعيداً عنه و ذلك بعد حل المسحوق بـ
90-120 مل من الماء قبل تناوله
(الشامل في الأدوية السريرية)

Fosinopril

خافض للضغط من مثبطات الأنزيم المحول للأنجوتنسين
إن تناوله مع الطعام ينقص معدل الامتصاص و ليس الكمية
المتصة , يمكن تناوله مع الطعام
(AHFS Drug Information) (الشامل في الأدوية السريرية)

Frovatriptan

شاد انتقائي لمستقبلات السيروتونين 5-HT₁ يستخدم لعلاج نوبات
الشقيقة الحادة
إن الطعام لا يؤثر على توافره الحيوي
يصل التركيز المصلي للذروة بعد 2-4 ساعات من تناوله فمويًا لكن

الطعام قد يؤخر الزمن حوالي ساعة
يؤخذ مع السوائل بغض النظر عن الطعام
(AHFS Drug Information) (Martindale Thirty-sixth edition)

Furazolidone

صاد حيوي و مضاد أوالي
يجب تجنب الأطعمة الحاوية على التيرامين خلال فترة تناوله و
خلال أربعة أيام التالية للتوقف عنه
(الشامل في الأدوية السريرية)

Furosemide

دواء مدر
لا يؤثر الطعام على فعاليته المدرّة
(AHFS Drug Information)

Gabapentin

دواء مضاد للصرع و يستخدم في علاج آلام الاعتلالات العصبية
لا يؤثر الطعام على معدل امتصاصه
يمكن تناوله مع الطعام أو بدونه
(الشامل في الأدوية السريرية) (AHFS Drug Information)
(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

Galantamine

دواء يستخدم في علاج الخرف
إن وجود الطعام يؤخر الامتصاص لكن الكمية الممتصة لا تتأثر،

يعطى مع الطعام لتخفيف تأثيراته الجانبية الهضمية مع تناول كمية كافية من السوائل

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

(AHFS Drug Information)

Ganciclovir

دواء مضاد للفيروسات

يبلغ توافره الحيوي بعد تناوله فموياً على معدة فارغة 5% و يزداد بوجود الطعام لـ 6-9% و يبلغ حوالي 28-31 % عند تناوله بعد وجبة دسمة, لذا يؤخذ مع الطعام لزيادة امتصاصه

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Gatifloxacin

صاد حيوي من الكينولونات

يؤخذ بغض النظر عن الطعام و الحليب (AHFS Drug Information)

Gefitinib

مضاد للورم

يؤخذ بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Gemfibrozil

دواء خافض للشحوم

يؤخذ قبل الطعام بنصف ساعة لأن ذلك يرفع من توافره الحيوي

(Martindale Thirty-sixth edition) (Pocket Clinical Drug Reference)

(AHFS Drug Information) (الشامل في الأدوية السريرية)

Gemifloxacin

صاد حيوي من الكينولونات

يؤخذ بغض النظر عن الطعام مع شرب كميات كبيرة من السوائل

(AHFS Drug Information)

Ginkgo Biloba

يستخدم في الاضطرابات الوعائية الدماغية و الاضطرابات
الوعائية المحيطية

يؤخذ مع وجبات الطعام

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

Glibenclamide (Glyburide)

خافض لسكر الدم ينتمي لمجموعة السلفونيل يوريا

يؤخذ مع الطعام (لا يؤثر الطعام على امتصاصه)

(Pocket Clinical Drug Reference) (الشامل في الأدوية السريرية)

Gliclazide

خافض لسكر الدم ينتمي لمجموعة السلفونيل يوريا

تؤخذ الأقراص فوراً مع الطعام (الشامل في الأدوية السريرية)

Glutamic acid hydrochloride

يستخدم في علاج اللاهيدروكلورية أو نقص الهيدروكلورية حيث

يحرر حمض كلور الماء بالمعدة

يعطى مع الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

Glyceryl Trinitrate (Nitroglycerin)

دواء من مشتقات النترات موسع للشرايين

تؤخذ أقراصه الفموية على معدة فارغة مع كأس كامل من الماء

(الشامل في الأدوية السريرية) (Pocket Clinical Drug Reference)

Griseofulvin

دواء مضاد للفطور

يزداد امتصاصه عند تناوله مع وجبة طعام دسمة, يؤخذ مع أو بعد وجبات الطعام

(Martindale Thirty-sixth edition) (الشامل في الأدوية السريرية)

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

(Wilson and Gisvold's Textbook of Organic Medicinal and
Pharmaceutical Chemistry eleventh edition)

Guar Gum (صمغ الغوار)

عامل مساعد في علاج داء السكري و يستخدم لإبطاء التفرغ
المعدي عند بعض المصابين بمتلازمة الإغراق و يستخدم كمساعد
في علاج فرط شحميات الدم

يؤخذ مع الطعام أو قبله مباشرة حيث تحرك الحبيبات مع 200مل
من أحد السوائل الباردة أو تمزج مع الطعام مع شرب 200مل من

السوائل (Martindale Thirty-sixth edition)

Halofantrine

دواء مضاد للملاريا

يزداد توافره الحيوي عندما يؤخذ مع أو بعد الطعام خصوصاً
الطعام عالي المحتوى من الدسم لذا يجب تجنب الطعام الدسم لمدة
24 ساعة و يجب ألا يؤخذ على معدة ممتلئة لأن ذلك يزيد خطر
السمية القلبية (Martindale Thirty-sixth edition)

Hydralazine

دواء خافض للضغط الشرياني (موسع وعائي)
يزداد التوافر الحيوي للهيدراالازين بتناوله مع الطعام
(الشامل في الأدوية السريرية)

Hydrochlorothiazide

مدر تيازيدي
يمكن تناول الهيدروكلورثيازيد مع الحليب أو الطعام
(الشامل في الأدوية السريرية)

Hydrocortisone

ستيروئيد قشري سكري و معدني متوسط القوة
تؤخذ الجرعة الفموية مع الطعام لتخفيف الاضطرابات الهضمية
التي قد يسببها (الشامل في الأدوية السريرية)
يطبق المعجون الفموي بعد وجبات الطعام و وقت النوم
(AHFS Drug Information)

Hydromorphone Hydrochloride

مسكن أفيوني و مضاد للسعال
يؤخذ مع الطعام للتخفيف من عسرة الهضم التي قد يسببها

(الشامل في الأدوية السريرية)

Hydroquinine Hydrobromide

يستخدم في علاج المعص العضلي الليلي

يؤخذ بجرعة 200 ملغ مع وجبة الطعام المسائية و أخرى 100 ملغ
وقت النوم

(Martindale Thirty-sixth edition)

Hydrotalcite

(Aluminium magnesium carbonate hydroxide hydrate)

مضاد للحموضة

يؤخذ بين وجبات الطعام و في وقت النوم

(British National Formulary 57)

Hydroxychloroquine Sulfate

دواء مضاد للملاريا و يستخدم في علاج الذئبة الحمامية الجهازية و
التهاب المفاصل الرثياني

يؤخذ مع الطعام أو الحليب

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Hymecromone

مفرز للصفراء و مضاد لتشنج المرارة

يؤخذ في أوقات وجبات الطعام

(Martindale Thirty-sixth edition)

Hyoscine methobromide

(Methscopolamine Bromide)

يستخدم لتخفيف التشنجات المعدية المعوية

يؤخذ قبل وجبة الطعام بنصف ساعة

(Martindale Thirty-sixth edition)

Hyoscyamine

مضاد للكولين, مضاد للتشنج

لا يؤثر الطعام على امتصاصه (AHFS Drug Information)

Ibandronate

من مركبات البيسفوسفونات

ينقص امتصاص الإيباندرونات بوجود الطعام خصوصاً الحاوي

على الكالسيوم و الكاتيونات متعددة التكافؤ الأخرى

إن توافره الحيوي ينقص بمقدار 90% عندما يؤخذ مع الطعام, و

حوالي 30% عندما يؤخذ قبل الطعام بنصف ساعة و حوالي 75%

عندما يؤخذ بعد الطعام بساعتين

يؤخذ قبل ساعة على الأقل من تناول الفطور مع كأس كامل من

الماء (180-240 مل) لكن ليس الماء المعدني و يجب تجنب

الاستلقاء لمدة ساعة على الأقل بعد تناوله

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

(AHFS Drug Information)

Ibuprofen

مضاد التهاب غير ستيرويدي

ينقص الطعام من سرعة امتصاص الإيوبروفين لكن ذلك لا يؤثر على الكمية الممتصة , يؤخذ مع الطعام أو الحليب لتخفيف تأثيراته الجانبية الهضمية

(AHFS Drug Information) (الشامل في الأدوية السريرية)

Idebenone

يستخدم في الاختلال العقلي المرافق للاضطرابات الوعائية الدماغية و في مرض الزهايمر

يؤخذ بعد الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

Imatinib Mesilate

دواء مضاد للأورام

يؤخذ مع الطعام و كأس كبير من الماء للتخفيف من الاضطرابات الهضمية

(AHFS Drug Information) (Martindale Thirty-sixth edition)

(Pocket Clinical Drug Reference)

Imidafenacin

دواء حاصر مسكاريني يستخدم في علاج السلس البولي و التردد و الإلحاح البولي

يؤخذ بعد الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

imidapril hydrochloride

خافض للضغط من مثبطات الأنزيم المحول للانجوتنسين

يمتص بنسبة 70% و ينخفض الامتصاص بوجود الطعام لذا يؤخذ

قبل الطعام

(British National Formulary 57) (Martindale Thirty-sixth edition)

Imipramine

مضاد اكتئاب ثلاثي الحلقة

لا يؤثر الطعام على امتصاص الإيميبرامين, يؤخذ بغض النظر عن
الطعام (AHFS Drug Information)

Indapamide

دواء مدر

إن امتصاص الإنداباميد لا يتأثر بشكل هام بوجود الطعام أو
مضادات الحموضة
(AHFS Drug Information)

Indinavir

مضاد للفيروسات التقهقرية يستخدم في علاج متلازمة عوز المناعة
المكتسب

ينخفض الامتصاص عند تناوله مع وجبة طعام ذات محتوى عالي
من (السعرات الحرارية, الدسم, البروتين) لكنه يكون أقل تأثراً عند
تناوله مع وجبة طعام خفيفة, يؤخذ قبل الطعام بساعة أو بعده
بساعتين أو مع وجبة طعام خفيفة قليلة الدسم

(British National Formulary 57) (Martindale Thirty-sixth edition)

Indometacin

مضاد التهاب غير ستيرويدي

ينقص الطعام معدل امتصاص الاندوميتاسين دون أن يؤثر على الكمية الممتصة, يؤخذ مع الطعام لتخفيف تأثيراته الجانبية الهضمية

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

(الشامل في الأدوية السريرية) (Pocket Clinical Drug Reference)

Irbesartan

خافض للضغط من حاصرات مستقبلات الانجوتنسين 2

إن توافره الحيوي بعد تناوله فموياً لا يتأثر بالطعام لذا يمكن تناوله بغض النظر عن الطعام

(AHFS Drug Information)

Isoniazid

دواء مضاد للتدرن

يؤخذ على معدة فارغة لأن معدل الامتصاص و الكمية الممتصة ينخفضان بوجود الطعام

(Martindale Thirty-sixth edition)

isosorbide dinitrate

من مركبات النترات, موسع للأوعية الإكليلية

على الرغم من أن الطعام ينقص متوسط التراكيز المصلية الذروية بشكل هام إلا أن التوافر الحيوي الكلي لا يتأثر

(AHFS Drug Information)

Isotretinoin

يستخدم في علاج العد

يزداد امتصاصه بوجود الطعام

يؤخذ مع الطعام

(Martindale Thirty-sixth edition)

(Pharmacotherapy handbook Eighth Edition)

Isradipine

خافض للضغط من حاصرات قنوات الكالسيوم

بشكل عام يمكن تناول conventional capsules و extended-

release core tablets بغض النظر عن الطعام

فعند تناول conventional capsules مع الطعام ينقص معدل

الامتصاص و ليس الكمية الممتصة (يتأخر التركيز البلازمي

الذروي حوالي ساعة) أما عند تناول extended-release core

tablets مع الطعام فإن الكمية الممتصة تنخفض بحدود 25%

(AHFS Drug Information)

Itopride hydrochloride

له خواص مشابهة للميتوكلوبرميد يستخدم مضاد إقياء

يؤخذ قبل وجبات الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

Itraconazole

دواء مضاد للفطور

إن امتصاص الإيتراكونازول المحضر بشكل كبسولات يكون

أعظمي عندما يؤخذ مع الطعام أما المحضر بشكل محلول فموي

فإن امتصاصه أعظمي على معدة فارغة, لذا يؤخذ الكبسول مع

الطعام أما المحلول يؤخذ بدون طعام

(AHFS Drug Information) (Martindale Thirty-sixth edition)

(Pocket Clinical Drug Reference)

Ivabradine

دواء مثبط انتقائي للعقدة الجيبية يستخدم لعلاج الذبحة الصدرية في المرضى غير القادرين على تناول حاصرات بيتا
يبلغ التركيز المصلي الذروة بعد حوالي ساعة عند تناوله على معدة فارغة و بوجود الطعام يتأخر حوالي ساعة و تزداد الكمية الممتصة بمقدار 20-30%, يؤخذ مع الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

Ivermectin

دواء قاتل للديدان

يجب عدم تناول الطعام خلال ساعتين قبل أخذ الجرعة أو بعدها
(Martindale Thirty-sixth edition)

Ketoconazole

مضاد فطري

يؤخذ مع الطعام حيث أن ذلك يقلل من الاضطرابات الهضمية التي يسببها

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Ketoprofen

مضاد التهاب غير ستيرويدي

لا يتغير توافره الحيوي عندما يؤخذ مع الطعام لكن معدل الامتصاص يتباطأ , يؤخذ مع الطعام لتقليل تأثيراته الجانبية

الهضمية

(Martindale Thirty-sixth edition)(Pocket Clinical Drug Reference)

(الشامل في الأدوية السريرية) (AHFS Drug Information)

Ketorolac tromethamine

مضاد التهاب غير ستيرويدي

لا تتأثر الكمية الممتصة عند تناوله مع الطعام لكن معدل

الامتصاص ينخفض (AHFS Drug Information)

Ketotifen Fumarate

مضاد هيستامين H₁ يستخدم لعلاج التحسس

يؤخذ الكيتوتيفين مع الطعام

(British National Formulary 57) (Martindale Thirty-sixth edition)

Labetalol Hydrochloride

خافض للضغط من حاصرات بيتا

يتأخر امتصاصه بوجود الطعام لكن توافره الحيوي يزداد و ذلك من

المحتمل بسبب إنقاص الاستقلاب بالمرور الأول و/ أو التدفق

الدموي الكبدي

في دراسة أجريت بعد تناول جرعة وحيدة 200مغ من اللابيتالول

فموياً تبين أن متوسط توافره الحيوي المطلق عند تناوله على معدة

فارغة كان 26% و في حال وجود الطعام 36%

يؤخذ مع الطعام

(British National Formulary 57) (AHFS Drug Information)

(Martindale Thirty-sixth edition)

Lactitol

يستخدم لعلاج الإمساك و لعلاج الاعتلال الدماغي الكبدي
يؤخذ مع الطعام مع شرب كأس أو اثنين من السوائل
(Martindale Thirty-sixth edition)

Lactulose

يستخدم لعلاج الإمساك و الاعتلال الدماغي الكبدي
يمكن خلطه مع الطعام أو تمديده بالماء أو عصير الفواكه أو الحليب
للتخفيف من طعمه الغير مستساغ (Martindale Thirty-sixth edition)

Lamivudine

مضاد فيروسي
يؤخذ بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Lamotrigine

دواء مضاد للصرع
إن الطعام لا يؤثر على معدل امتصاصه ,يؤخذ بغض النظر عن
الطعام (يمكن تناوله مع الطعام في حال حدوث انزعاج هضمي)
(الشامل في الأدوية السريرية) (AHFS Drug Information)

Lansoprazole

مثبط لمضخة البروتون يقلل من إفراز حمض كلور الماء في المعدة
يبطئ الطعام امتصاص اللانسوبرازول و يخفض توافره الحيوي
بمقدار 50% تقريباً, لذا يؤخذ قبل الطعام

تحل حثيرات اللانوسوبرازول المعدة لتحضير معلق فموي بكمية قليلة من الماء و تبلع مباشرة و يمكن أن ترش محتويات الكبسولة و التي هي حثيرات ملبسة معوياً على كمية قليلة من طعام رخو مثل اللبن أو تمزج مع كمية قليلة من عصير الفواكه و تبلع
(الشامل في الأدوية السريرية) (Martindale Thirty-sixth edition)

Lanthanum Carbonate

دواء يستخدم في فرط فوسفات الدم
يؤخذ مع الطعام أو بعده مباشرة

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

(British National Formulary 57)

Lapatinib Tosilate

دواء مضاد للورم
يؤخذ دائماً في نفس الوقت فيما يتعلق بالطعام إما قبل الطعام بساعة أو بعده بساعة

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

(British National Formulary 57)

Leflunomide

مضاد للربو معدل لسير المرض
يمكن تناول الليفلونوميد بغض النظر عن الطعام
(AHFS Drug Information)

Lenalidomide

دواء معدل للمناعة و مضاد للورم

إن تناوله مع الطعام يخفض التراكيز البلازمية لكنه لا ينقص الكمية
المتصة (Martindale Thirty-sixth edition)

Letrozole

مضاد للورم

لا يؤثر الطعام على امتصاص الليتروزول, يؤخذ بغض النظر عن
الطعام (AHFS Drug Information)

Levetiracetam

مضاد اختلاج

يؤخذ بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Levodopa

يستخدم في علاج داء باركنسون و يستخدم لتشخيص عوز هرمون
النمو

يؤخذ مع الطعام لتخفيف الاضطرابات الهضمية التي يسببها

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

(الشامل في الأدوية السريرية) (AHFS Drug Information)

Levofloxacin

صاد حيوي من الكينولونات

يمكن تناوله مع الطعام أو بدونه مع شرب كميات وافرة من السوائل

(الشامل في الأدوية السريرية)

Levothyroxine Sodium (Thyroxine sodium)

يستخدم في علاج قصور الدرق

يؤخذ على معدة فارغة قبل الفطور فالطعام يعيق امتصاصه

(British National Formulary 57) (Martindale Thirty-sixth edition)

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Lincomycin

صاد حيوي من اللينكوزاميدات

إن الطعام يخفض لدرجة كبيرة من معدل الامتصاص و الكمية

المتصة لذا يؤخذ قبل الطعام بساعة على الأقل

و يؤخذ مع كأس كبيرة من الماء لتجنب الإصابة بالتقرح المريئي

(Martindale Thirty-sixth edition) (الشامل في الأدوية السريرية)

Linezolid

صاد حيوي من زمرة أوكسازوليدون

يؤخذ بغض النظر عن الطعام

ييدي هذا الدواء تأثيراً خفيفاً مثبطاً لخميرة المونو أمينو أوكسيداز

لذا يجب تجنب تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالتيرامين

(British National Formulary 57) (Pocket Clinical Drug Reference)

(AHFS Drug Information)

Liraglutide

خافض لسكر الدم يعطى حقناً تحت الجلد

الجرعة يمكن أن تعطى بشكل مستقل عن وجبات الطعام

(Pharmacotherapy handbook Eighth Edition)

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

Lisinopril

خافض للضغط من مثبطات الأنزيم المحول للأنجوتنسين
يمتص الليزينوبريل جيداً عبر الجهاز الهضمي و لا يتأثر
امتصاصه بوجود الطعام

(AHFS Drug Information) (الشامل في الأدوية السريرية)

Lisuride maleate

دواء مضاد لباركنسون و يستخدم في الاضطرابات المترافقة بفرط
برولاكتين الدم و ضخامة النهايات و ألم الثدي

يؤخذ مع الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

Lithium

مضاد للاكتئاب و مضاد للهوس

يمتص 60-100% من الليثيوم من الجهاز الهضمي و لا تتأثر
الكمية الممتصة بوجود الطعام

يؤخذ مع الطعام لتجنب الإصابة بالانزعاج الهضمي الذي قد يسببه,
يجب الإكثار من تناول السوائل و الملح لتجنب الإصابة بالتجفاف و
خاصة في الصيف

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

(Pharmacotherapy handbook Eighth Edition) (الشامل في الأدوية السريرية)

Lomustine

دواء مضاد للأورام

يؤخذ على معدة فارغة مع السوائل و يجب عدم تناول الطعام
لساعتين بعد تناوله
(الشامل في الأدوية السريرية)

Lopinavir

مضاد للفيروسات يستخدم في علاج الـ HIV
يتحسن توافره الحيوي عندما يؤخذ مع وجبة طعام عالية الدسم,
الأقراص الملبسة بالفلم تؤخذ مع الطعام أو بدونه أما السوفت
كبسول و المحلول تؤخذ مع الطعام
(Martindale Thirty-sixth edition)

Loracarbef

صاد حيوي ينتمي لمجموعة Carbacephems المشابهة
للسيفالوسبورينات
يؤخذ على معدة فارغة
(الشامل في الأدوية السريرية) (Martindale Thirty-sixth edition)

Loratadine

مضاد هيستامين H₁ يستخدم لعلاج التحسس
تؤخذ الأقراص العادية و الأقراص المتفتتة فمويًا و الأقراص التي
تحتوي الـ لوراتادين مع الـ بسودوافدرين سلفات بغض النظر عن
الطعام (AHFS Drug Information)

Losartan Potassium

خافض للضغط من حاصرات مستقبلات الانجوتنسين 2

إن الطعام ينقص معدل الامتصاص و التراكيز الذروية لكن مقدار التأثير غير مهم سريرياً (AHFS Drug Information)

Lovastatin

دواء خافض للشحوم

يؤخذ مع الطعام

(Martindale Thirty-sixth edition) (الشامل في الأدوية السريرية)

Lubiprostone

يستخدم لعلاج الإمساك المزمن مجهول السبب

إن التأثير الجانبي الأكثر شيوعاً لهذا الدواء هو الغثيان و الذي يعتمد على الجرعة و لكن يمكن تخفيف الأعراض بتناوله مع الطعام

(Martindale Thirty-sixth edition)

(Pharmacotherapy handbook Eighth Edition)

Mebendazole

دواء مضاد للديدان

يمكن تناوله مع الطعام فوجود الطعام في الجهاز الهضمي لا يؤثر

على عمل الدواء (الشامل في الأدوية السريرية) (AHFS Drug Information)

Mebeverine hydrochloride

مرخي للعضلات الملساء يستخدم لعلاج تشنجات الجهاز الهضمي

يؤخذ قبل الطعام بعشرين دقيقة (British National Formulary 57)

Mecamylamine Hydrochloride

دواء خافض للضغط الشرياني

يؤخذ بعد الطعام مباشرة و بنفس المواعيد كل يوم

(الشامل في الأدوية السريرية)

Mecasermin

يستخدم في علاج فشل النمو عند الأطفال و المراهقين الذين لديهم عوز أولي حاد بعامل النمو I المشابه للانسولين (IGF-I) , يعطى حقناً تحت الجلد

من الشائع أن يسبب هبوط سكر الدم كتأثير جانبي و يمكن تفادي ذلك بتناول هذا الدواء خلال 20 دقيقة قبل الطعام أو بعده و إذا كان المريض غير قادر على تناول الطعام لأي سبب كان يجب أن تلغى الجرعة و إذا سبب هبوط سكر على الرغم من تناول طعام كافي يجب تخفيض الجرعة (Martindale Thirty-sixth edition)

Meclofenamic acid

(Meclofenamate Sodium)

مضاد التهاب غير ستيرويدي

إن الطعام ينقص معدل الامتصاص و الكمية الممتصة, يؤخذ مع الطعام أو الحليب لتخفيف تأثيراته الجانبية الهضمية

(AHFS Drug Information) (الشامل في الأدوية السريرية)

Meclozine Hydrochloride

(Meclizine Hydrochlorid)

مضاد إقياء و حاصر لمستقبلات الهيستامين H1 يستخدم في المعالجة

و الوقاية من الغثيان و الإقياء المرافقين لداء الحركة و في علاج
الدوار الناتج عن داء مينير و الاضطرابات الدهليزية الأخرى
إن تناوله مع الطعام أو الحليب أو الماء يقلل من تأثيراته الجانبية
الهضمية (Pocket Clinical Drug Reference)
يمكن التخفيف من جفاف الفم و الإمساك الممكن حدوثهما بتناول
الكثير من السوائل (الشامل في الأدوية السريرية)

Mefenamic Acid

مضاد التهاب غير ستيرويدي
يؤخذ مع الطعام أو الحليب لتخفيف تأثيراته الجانبية الهضمية
(AHFS Drug Information) (الشامل في الأدوية السريرية)

Mefloquine Hydrochloride

دواء مضاد للملاريا
لا يؤخذ على معدة فارغة بل يؤخذ معه كأس كبير من الماء على
الأقل (الشامل في الأدوية السريرية)

Megestrol

هرمون مشتق من البروجستين
يستخدم في المعالجة التلطيفية لكارسينوما الثدي و بطانة الرحم و
يستخدم كفاتح للشهية
يمكن إعطائه مع الطعام (Pocket Clinical Drug Reference)

Melphalan

دواء مضاد للأورام

يبلغ متوسط التوافر الحيوي لهذا الدواء 56% لكنه قد يتراوح بين 25-89%، ينخفض توافره الحيوي بشكل هام بوجود الطعام (ينخفض بحدود 45%)

ينصح البعض بعدم تناوله مع الطعام, لكن المريض الذي غير تناوله من بعد الطعام إلى قبل الطعام يجب أن يراقب خشية حدوث سمية (Martindale Thirty-sixth edition)

Memantine

يستخدم الميمانتين لعلاج العتاهة المتوسطة إلى الشديدة المرافقة لداء الزهايمر

يعطى بغض النظر عن وجبات الطعام

(AHFS Drug Information) (Pocket Clinical Drug Reference)

Mepacrine

مضاد أوالي

يؤخذ بعد الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

Mepyramine Maleate

(Pyrilamine Maleate)

مضاد هيستامين مركن, مضاد تحسس

يؤخذ مع الطعام

(Wilson and Gisvold's Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry eleventh edition)

Mercaptamine

يستخدم في الداء السيستيني

يؤخذ مع أو بعد الطعام , و يمكن فتح الكبسولة و رش محتوياتها
على الطعام لكن يجب تجنب إضافته إلى المشروبات الحمضية مثل
عصير البرتقال

(British National Formulary 57) (Martindale Thirty-sixth edition)

Mercaptopurine

دواء مضاد للورم

يؤخذ مستحضره الفموي مع وجبات الطعام و ليس على معدة
فارغة (الشامل في الأدوية السريرية)

Mesuximide (Methsuximide)

دواء مضاد للصرع

يؤخذ مع الطعام (الشامل في الأدوية السريرية)

Metamfetamine Hydrochloride

يستخدم لعلاج متلازمة السلوك المضطرب عند الأطفال و البدانة
الخارجية المنشأ و السبخ
لعلاج البدانة تؤخذ الأقراص العادية قبل نصف ساعة من موعد كل
وجبة طعام
(الشامل في الأدوية السريرية)

Metformin Hydrochloride

خافض لسكر الدم

يبلغ توافره الحيوي المطلق بعد تناول جرعة فموية وحيدة 500 مغ
حوالي 50-60% و ينخفض إذا أخذ مع الطعام لكن هذا الدواء قد

يسبب عسرة هضم ملحوظة و للتخفيف منها يؤخذ مع وجبات
الطعام كما أن تناوله مع الطعام يقلل من الامتصاص المعوي
للغلوكوز

(Martindale Thirty-sixth edition) (Pocket Clinical Drug Reference)

(Pharmacotherapy handbook Eighth Edition)

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

(الشامل في الأدوية السريرية) (British National Formulary 57)

Methacycline

صاد حيوي من التتراسكليينات

يفضل تناوله قبل ساعة من الطعام أو بعده بساعتين

(Martindale Thirty-sixth edition)

Methazolamide

مدر مثبت لخميرة كاربونيك انهيدراز يستخدم في علاج الزرق

يؤخذ مع الطعام (الشامل في الأدوية السريرية)

Methenamine

صاد حيوي يستخدم لعلاج الانتانات البولية

يؤخذ مع الطعام لتخفيف الانزعاج الهضمي الذي قد يسببه و يؤخذ

مع فيتامين س لحمضنة البول مع شرب كميات كبيرة من السوائل و

يجب تجنب الأطعمة المقلونة (مشنقات الحليب) بشكل مفرط أو

الأدوية التي تسبب ارتفاع PH البول

(الشامل في الأدوية السريرية)

Methocarbamol

مرخي للعضلات الهيكلية

يؤخذ مع الطعام لتخفيف تأثيراته الجانبية الهضمية

(Pocket Clinical Drug Reference)

Methotrexate

دواء مضاد للأورام و مثبت للمناعة و مضاد للاستقلاب يستخدم في

علاج الأورام و الصداف و التهاب المفاصل الرثياني

قد يسبب الطعام انخفاض معدل امتصاصه و لذلك يؤخذ على معدة

فارغة (الشامل في الأدوية السريرية)

Methoxsalen

يستخدم في علاج الصداف و البهق

تزداد الكمية الممتصة و التركيز المصلي الذروي عد تناوله مع

الطعام

إن التحسس الضوئي يتعلق بتركيز الميتوكساليين المصلي لذا يؤخذ

بشكل ثابت فيما يتعلق بالطعام

يمكن تخفيف الغثيان الذي قد ينجم عن مستحضره الفموي بتناوله

مع الحليب أو الطعام أو بتقسيم الجرعة على دفعتين يفصل بينهما

30 دقيقة

يجب تجنب الأطعمة التي تحوي الفروكومارين (اليم, الليمون

,التين,البقدونس,الكرفس,الثوم,الجزر,الخردل),فتناول كمية

كبيرة منها يزيد خطر التسمم ضوئي الأحداث

(AHFS Drug Information) (الشامل في الأدوية السريرية)

Methylprednisolone

ستيروئيد قشري سكري

يؤخذ مستحضره الفموي مع الطعام أو الحليب لتخفيف تأثيراته
الجانبية الهضمية

(Pocket Clinical Drug Reference) (الشامل في الأدوية السريرية)

Methylthioninium Chloride

زرقة الميتيلين (methylene blue)

يستخدم لعلاج الانسمام بالسيانيد و لعلاج methaemoglobinaemia
و يستخدم كمطهر و يستخدم كصبغة تشخيصية
يؤخذ بعد الطعام مع كأس ماء كبيرة

(AHFS Drug Information) (الشامل في الأدوية السريرية)

Methysergide

مشتق من قلويدات الإرغوت يستخدم للوقاية من الصداع الوعائي
يؤخذ مع وجبات الطعام لتقليل تأثيراته الجانبية الهضمية

(AHFS Drug Information) (Martindale Thirty-sixth edition)

(British National Formulary 57) (الشامل في الأدوية السريرية)

Metoclopramide

مضاد إقياء يستخدم في علاج القلس المعدي المريئي و الخزل
المعدي و الوقاية من الغثيان التالي للعلاج الكيماوي و الجراحة
لعلاج القلس المعدي المريئي و خزل المعدة يؤخذ قبل نصف ساعة
من تناول الطعام و عند النوم

(AHFS Drug Information) (Pocket Clinical Drug Reference)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Metolazone

مدر من زمرة السلفوناميدات

يؤخذ صباحاً مع الطعام (Pocket Clinical Drug Reference)

Metoprolol

خافض للضغط من حاصرات بيتا

يتحسن التوافر الحيوي للميتوبرولول تترتات بتناوله مع الطعام.

ينصح بتناوله مع الطعام أو بعده مباشرة

إن الطعام لا يؤثر على التوافر الحيوي للميتوبرولول سوكسينات في

الأقراص مديدة التحرر

(AHFS Drug Information)

Metyrapone

يستخدم لتقييم وظيفة hypothalamic-pituitary

إن تناوله مع الحليب أو بعد الطعام يقلل من تأثيراته الجانبية

الهضمية

(Martindale Thirty-sixth edition) (AHFS Drug Information)

Mexiletine Hydrochloride

دواء مضاد لاضطراب النظم و يستخدم لعلاج اعتلال الأعصاب

السكري المنشأ

يؤخذ مع الطعام و يتبع بشرب كمية كبيرة من السوائل لتجنب

الإصابة بالتقرح المريئي

(Martindale Thirty-sixth edition) (Pocket Clinical Drug Reference)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Midodrine Hydrochloride

شاد لمستقبلات ألفا، يستخدم لعلاج انخفاض الضغط و خاصة
انخفاض الضغط الانتصابي و يستخدم كمساعد في علاج السلس
البولي

لا يؤثر الطعام على امتصاصه لذا يؤخذ بغض النظر عن الطعام

(AHFS Drug Information)

Mifepristone

مضاد للبروجيسترون يستخدم لإنهاء الحمل

يؤخذ بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Miglitol

خافض لسكر الدم مثبط لخميرة ألفا-غلوكوزيداز

يؤخذ مع أول لقمة من كل وجبة طعام رئيسية

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Miglustat

يستخدم للمساعدة على منع تراكم glucosylceramide عند

مرضى داء غوشيه نمط 1

تبين في دراسة أن التركيز المصلي الذروي ينخفض حوالي 37%

عندما يؤخذ مع الطعام لكن الطعام ليس له تأثير هام سريرياً على

الكمية الممتصة (المساحة تحت المنحنى تنخفض حوالي 14%)

يؤخذ مع الطعام أو بدونه (Martindale Thirty-sixth edition)

Minocycline

صاد حيوي من التتراسكليينات

لا يتأثر امتصاصه بشكل هام بوجود الطعام أو كميات معتدلة من الحليب فالمينوسيكليين لديه إلفة للارتباط بالكالسيوم أخفض من تلك التي للتتراسيكليين و لذلك امتصاصه أقل تأثراً بوجود الطعام أو الحليب

يؤخذ مع الكثير من السوائل و يجب عدم الاستلقاء لمدة نصف ساعة بعد تناوله لتجنب أذية المري

يمكن تناوله مع الطعام إذا سبب اضطراب هضمي

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

Mirtazapine

مضاد اكتئاب رباعي الحلقة

يؤخذ الميرتازابين بغض النظر عن الطعام فالطعام ليس له تأثير مهم على امتصاصه من الجهاز الهضمي (AHFS Drug Information)

Misoprostol

هو عبارة عن بروستاغلاندين يستخدم في علاج القرحة المعدية و المعوية بما في ذلك القرحة الناجمة عن استخدام مضادات الالتهاب اللاستيرويدية و يستخدم للوقاية من القرحة التي تسببها هذه الأدوية, و يستخدم في إنهاء الحمل و في تحريض الولادة و في علاج النزف بعد الولادة

يتمتص بسرعة من الجهاز الهضمي و يخفض الطعام معدل الامتصاص لكن الكمية الممتصة لا تنقص
يؤخذ مع الطعام (إن تناوله مع الطعام أو بعده مباشرة يخفف من شدة الإسهال الذي يسببه)

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

(Wilson and Gisvold's Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry eleventh edition)

(British National Formulary 57) (الشامل في الأدوية السريرية)

Mitotane

دواء مضاد للأورام

يتمتص 40% من الجرعة المتناولة فمويًا و يزداد الامتصاص بوجود الطعام, يفضل تناوله مع وجبات الطعام (من الشائع أن يسبب غثيان و إسهال بجرعة أكثر من 2 غ باليوم و يمكن تجنب ذلك بتناوله مع الطعام)

(Pharmacotherapy handbook Eighth Edition)

(Martindale Thirty-sixth edition)

Moclobemide

مضاد للاكتئاب, مثبط عكوس لأنزيم المونو أمينو أوكسيداز
يؤخذ الموكلوبيميديد بعد الطعام ,و يجب تجنب تناول كمية كبيرة من الأطعمة الغنية بالتيرامين

(British National Formulary 57) (Martindale Thirty-sixth edition)

Modafinil

منبه مركزي

إن الطعام يؤخر امتصاصه حوالي نصف ساعة لكنه لا يؤثر على الكمية الممتصة

يؤخذ بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Moexipril

خافض للضغط من مثبطات الأنزيم المحول للأنجوتنسين

ينخفض توافره الحيوي بوجود الطعام لذا يؤخذ على معدة فارغة

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Montelukast

ضاد لمستقبلات اللوكوترين يستخدم للوقاية من الربو

إن الطعام لا يغير توافره الحيوي , يؤخذ مساءً بغض النظر عن الطعام , يعطى للأطفال على شكل أقراص قابلة للمضغ أو حبيبات فموية تعطى مباشرة في الفم أو تمزج مع كمية صغيرة من الطعام البارد الرخو و ليس السائل و يؤخذ فوراً

(Martindale Thirty-sixth edition) (British National Formulary 57)

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

(Pharmacotherapy handbook Eighth Edition)

Moracizine(Moricizine)

دواء مضاد لاضطراب النظم

يؤخذ على معدة فارغة و ليس مع الطعام لئلا يضطرب و يتأخر

امتصاصه (الشامل في الأدوية السريرية)

Moxifloxacin

صاد حيوي من الكينولونات

يؤخذ بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Nadolol

خافض للضغط من حاصرات بيتا

إن وجود الطعام لا يؤثر على معدل امتصاص النادولول أو الكمية

المتصة (AHFS Drug Information)

Nafcillin

صاد حيوي من البنسلينات

يمتص بشكل ناقص و غير منتظم من الجهاز الهضمي و خاصة

عندما يؤخذ بعد الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

Nalidixic Acid

صاد حيوي من الكينولونات يستخدم لعلاج انتانات الجهاز البولي

يؤخذ قبل وجبة الطعام بساعة لكن في حال حدوث عسرة هضم

يمكن تناوله مع الطعام (الشامل في الأدوية السريرية)

Naltrexone

ضاد أفيوني يستخدم في علاج إدمان الأفيونات و الكحول

يمكن تقليل تأثيراته الجانبية الهضمية بتناوله مع الطعام أو بعده

(AHFS Drug Information)

Naproxen

مضاد التهاب غير ستيرويدي

يخفض الطعام من معدل امتصاصه لكنه لا يؤثر على الكمية
المتصلة, إن تناوله مع الطعام أو الحليب يقلل من تأثيراته الجانبية
الهضمية

(Martindale Thirty-sixth edition) (AHFS Drug Information)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Naratriptan

شاد انتقائي لمستقبلات السيروتونين 5-HT₁ يستخدم لعلاج نوبات
الشقيقة الحادة

لا يؤثر الطعام على حرائكه الدوائية

(AHFS Drug Information)

Nateglinide

خافض لسكر الدم

يؤخذ خلال 30 دقيقة قبل وجبات الطعام و في حال عدم تناول
وجبة الطعام تحذف الجرعة و ذلك لأنه يسبب انخفاض في سكر
الدم

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

(Pharmacotherapy handbook Eighth Edition)

(British National Formulary 57) (الشامل في الأدوية السريرية)

Nebivolol

خافض للضغط من حاصرات بيتا

يؤخذ بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Nefazodone

مضاد للاكتئاب

إن امتصاص النيفازودون يتأخر و ينخفض بوجود الطعام لكن ذلك ليس هام سريرياً , يؤخذ بغض النظر عن الطعام (يمكن تخفيف شدة انخفاض التوتر الشرياني بالوضعة و خفة الرأس الناجمين عنه بتناوله مع الطعام)

(AHFS Drug Information) (Martindale Thirty-sixth edition)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Nelfinavir

مضاد للفيروسات يستخدم في علاج الـ HIV

يتحسن امتصاصه عند تناوله مع الطعام لذا يؤخذ مع الطعام
إن المستحضر المحضر على شكل مسحوق فموي يجب ألا يؤخذ مع الأطعمة أو الأشربة الحامضية لأن ذلك ينتج عنه طعم مر
(Martindale Thirty-sixth edition) (الشامل في الأدوية السريرية)

Neomycin Sulfate

صاد حيوي من الأمينو غلوكوزيدات

يستخدم أيضاً لعلاج فرط كولسترول الدم عند البالغين حيث يؤخذ فمويّاً مع وجبات الطعام أو بعدها مباشرة

(AHFS Drug Information)

Neostigmine

يستخدم في علاج الوهن العضلي الوبيل, و يستخدم لمعاكسة تأثير
المرخيات العضلية غير النازعة للاستقطاب بعد الانتهاء من العمل
الجراحي

لعلاج الوهن العضلي الوبيل يؤخذ قبل الطعام بنصف ساعة

(Martindale Thirty-sixth edition)

Nevirapine

مضاد للفيروسات يستخدم في علاج متلازمة عوز المناعة المكتسب
عند البالغين

لا يتأثر الامتصاص بوجود الطعام أو مضادات الحموضة لذا يمكن
تناوله مع الطعام أو بدونه

(Martindale Thirty-sixth edition) (AHFS Drug Information)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Nicardipine

خافض للضغط الشرياني ينتمي لحاصرات قنوات الكالسيوم

إن وجبة الطعام عالية الدسم تنقص التوافر الحيوي للكبسولات

العادية و المديدة التحرر (AHFS Drug Information)

تؤخذ أقراصه المديدة مع الطعام (ليس مع الوجبات الدسمة) ويجب

تجنب تناول الكحول و تخفيف كمية الكافئين المأخوذة خلال فترة

استخدامه (الشامل في الأدوية السريرية)

Nicotinic Acid (Niacin)

فيتامين ب3 و يستخدم في علاج فرط شحوم الدم و في علاج الداء الوعائي المحيطي و الاضطرابات الدورانية و البلاغرا يمكن تخفيف بعض تأثيراته الجانبية بتناوله مع الطعام لعلاج فرط شحوم الدم يؤخذ مع أو بعد وجبات الطعام (الشامل في الأدوية السريرية) (Martindale Thirty-sixth edition)

Nilotinib

دواء مضاد للورم

يزداد توافره الحيوي ضعفين تقريباً عند تناوله مع الطعام خصوصاً الوجبة الغنية بالدهن, يؤخذ قبل الطعام بساعة أو بعده بساعتين على الأقل (Martindale Thirty-sixth edition)

Nilutamide

دواء مضاد للورم و مضاد للأندروجين

يمكن تناوله بغض النظر عن مواعيد الوجبات الغذائية (الشامل في الأدوية السريرية) (AHFS Drug Information)

Nimodipine

حاصر لقنوات الكالسيوم

إن وجود الطعام ينقص الكمية الممتصة بشكل هام , فالتراكيز المصلية الذروية تنخفض حوالي 68% و التوافر الحيوي ينخفض حوالي 38% , يفضل تناوله قبل الطعام بساعة على الأقل أو بعده بساعتين (AHFS Drug Information)

Nisoldipine

خافض للضغط من حاصرات قنوات الكالسيوم
تؤخذ مستحضراته معدلة التحرر على معدة فارغة و يجب ألا يؤخذ
مع وجبة طعام عالية الدسم لأن ذلك يرفع تركيزه المصلي الذروي
بشدة

(Martindale Thirty-sixth edition) (Pocket Clinical Drug Reference)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Nitazoxanide

مضاد أوالي

إن امتصاصه يتحسن إذا أعطي مع الطعام لذا يؤخذ مع الطعام

(AHFS Drug Information) (Martindale Thirty-sixth edition)

Nitisinone

يستخدم في فرط تيروزين الدم الوراثي نمط1

يؤخذ قبل وجبات الطعام بساعة على الأقل

يمكن فتح الكبسولة و رش محتوياتها على كمية صغيرة من الطعام

أو تعلق بكمية صغيرة من الماء أو حليب الأطفال مباشرة قبل

الاستخدام

(AHFS Drug Information)

Nitrofurantoin

صاد حيوي لعلاج الانتانات البولية

إن تناوله مع الطعام يؤخر امتصاصه لكنه يزيد من توافره الحيوي

و يطيل مدة التراكيز العلاجية البولية لذا يؤخذ مع الطعام أو الحليب

من أجل زيادة توافره الحيوي و لتخفيف شدة تأثيراته الجانبية
الهضمية

(Martindale Thirty-sixth edition) (Pocket Clinical Drug Reference)

(British National Formulary 57) (الشامل في الأدوية السريرية)

Nitroxoline

صاد حيوي و له خواص مضادة للفطور

يؤخذ قبل الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

Norfloxacin

صاد حيوي من الكينولونات

يؤخذ قبل ساعة على الأقل من تناول الطعام أو بعد ذلك بساعتين

(Martindale Thirty-sixth edition) (الشامل في الأدوية السريرية)

Nystatin

دواء مضاد للفطور

يجب أن يبقى الدواء ملاصقاً للمنطقة المصابة أطول فترة ممكنة لذا
يجب تجنب تناول الطعام أو الشراب خلال ساعة من أخذ الجرعة

(Martindale Thirty-sixth edition)

Octatropine Methylbromide

(Anisotropine Methylbromide)

مضاد للكولين يستخدم مع أدوية أخرى لعلاج القرحة الهضمية و
لتخفيف التشنجات الحشوية

يؤخذ قبل وجبة الطعام بـ 30-60 دقيقة, يمكن تخفيف جفاف الفم

بشرب السوائل بشكل متكرر أو مضغ علكة خالية من السكر
(الشامل في الأدوية السريرية)

Ofloxacin

صاد حيوي من الكينولونات

يؤخر الطعام امتصاصه لكن تأثيره خفيف على الكمية الممتصة

(Martindale Thirty-sixth edition)

Olanzapine

مضاد للذهان

إن الطعام ليس له تأثير على امتصاص الأولانزابين من الجهاز
الهضمي

يؤخذ بغض النظر عن وجبات الطعام

(AHFS Drug Information) (Pocket Clinical Drug Reference)

Olmesartan medoxomil

خافض للضغط من حاصرات مستقبلات الانجوتنسين 2

يؤخذ الأولميسارتان ميدوكسوميل بغض النظر عن الطعام

(AHFS Drug Information)

Olsalazine

دواء مضاد للالتهاب مشتق من مركب 5-أمينوساليسيليك أسيد

يستخدم في التهاب الكولون القرصي

يؤخذ بعد وجبات الطعام (من الشائع أن يسبب إسهال كتأثير جانبي

و هذا يخف بتناوله بعد الطعام)

(British National Formulary 57) (Martindale Thirty-sixth edition)

Omeprazole

مثبط لمضخة البروتون يثبط إفراز الحمض المعدي
تؤخذ الكبسولات متأخرة التحرر قبل الطعام (يفضل قبل نصف
ساعة من الطعام)
تؤخذ الكبسولات فورية التحرر و المعلق الفموي قبل الطعام بساعة
على الأقل

(AHFS Drug Information)

Ondansetron

مضاد للإقياء
إن الطعام يزيد قليلاً من توافره الحيوي ,يؤخذ بغض النظر عن
الطعام (الشامل في الأدوية السريرية) (AHFS Drug Information)

Orlistat

مثبط لأنزيم الليباز يستخدم كعلاج مساعد في حالة البدانة
يؤخذ قبل وجبة الطعام مباشرة أو خلالها أو خلال ساعة أقصى حد
من تناولها

و إذا كانت وجبة الطعام لا تحوي دسم تحذف الجرعة

(AHFS Drug Information) (Martindale Thirty-sixth edition)

(British National Formulary 57) (Pocket Clinical Drug Reference)

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

Ornidazole

مضاد أوالي

يؤخذ بعد الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

Osetamivir

مضاد فيروسي

إن تناول الأوسيلتاميفير فوسفات مع الطعام ليس له تأثير على التراكيز المصلية الذروية أو الـ AUC للأوسيلتاميفير كاربوكسيلات يؤخذ بغض النظر عن الطعام لكن تناول مع الطعام يحسن من تحمله الهضمي

(AHFS Drug Information)

Oxacillin

صاد حيوي من البنسلينات

ينخفض امتصاص الأوكزاسيللين بوجود الطعام بالمعدة لكنه أقل تأثراً من الكلوكزاسيللين تؤخذ الجرعة الفموية على معدة فارغة

(Martindale Thirty-sixth edition) (الشامل في الأدوية السريرية)

Oxamniquine

دواء طارد للديدان

يفضل تناوله بعد الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

Oxaprozin

مضاد التهاب غير ستيرويدي

ينخفض معدل الامتصاص و ليس الكمية الممتصة عند تناوله مع الطعام

يؤخذ مع الطعام

(Pocket Clinical Drug Reference) (AHFS Drug Information)

Oxcarbazepine

مضاد اختلاج

يؤخذ بغض النظر عن وجبات الطعام

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

(AHFS Drug Information) (Pocket Clinical Drug Reference)

Oxycodone

مسكن أفيوني

ليس للطعام تأثير هام على الكمية الممتصة للأقراص مديدة التحرر،
تزداد الكمية الممتصة للمحلول الفموي عند تناوله مع وجبة طعام
عالية الدسم بنسبة 27% لكن معدل الامتصاص لا يتأثر

(AHFS Drug Information)

Oxymorphone Hydrochloride

مسكن أفيوني

يزداد امتصاصه بعد وجبة غنية بالدسم، المستحضرات الفموية
يجب أن تؤخذ على معدة فارغة (Martindale Thirty-sixth edition)

Oxytetracycline

صاد حيوي من التتراسكليينات

يؤخذ قبل الطعام بساعة أو بعده بساعتين

(الشامل في الأدوية السريرية) (Martindale Thirty-sixth edition)

Paliperidone

مضاد ذهان (المستقلب الفعال الرئيسي للريسبيريدون)
إن الطعام يزيد معدل الامتصاص و الكمية الممتصة ,يؤخذ في
الصباح بغض النظر عن الطعام لكن يؤخذ دائماً مع الفطور أو دائماً
على معدة فارغة

(Pocket Clinical Drug Reference) (British National Formulary 57)

(AHFS Drug Information)

Pancreatin (amylase+lipase+protease)

أنزيمات بنكرياسية

يتعطل بحمض المعدة لذا يؤخذ مع الطعام أو قبله أو بعده مباشرة
يمكن تخفيض حموضة المعدة بتناول الرانيتيدين أو السيميتيدين قبل
ساعة أو مثبطات مضخة البروتون مثل الأوميبرازول أو تناول
مضادات الحموضة مع الجرعة

كما أنه يتعطل بالحرارة لذا يجب تجنب الأطعمة أو السوائل عالية
الحرارة عند مزج الدواء معها و المزيج الناتج يجب ألا يبقى أكثر
من ساعة

(British National Formulary 57)

Pantoprazole

مثبط لمضخة البروتون يثبط إفراز الحمض المعدي
إن الطعام يؤخر امتصاصه من الأقراص متأخرة التحرر لكنه لا
يؤثر على الكمية الممتصة أو التركيز المصلي الذروي
يمكن تناول الأقراص متأخرة التحرر بغض النظر عن الطعام أما
المعلق متأخر التحرر يؤخذ قبل الطعام بنصف ساعة

(AHFS Drug Information)

Paroxetine hydrochloride

مضاد للاكتئاب مثبت انتقائي لعودة قبط السيروتونين
إن الطعام لا يؤثر على امتصاص الباروكسيتين بشكل هام, يؤخذ
بغض النظر عن الطعام (لكن تناوله مع الطعام يقلل تأثيراته الجانبية
الهضمية)

(AHFS Drug Information)

Pefloxacin Mesilate

صاد حيوي من الكينولونات
يؤخذ مع الطعام (الشامل في الأدوية السريرية)

Pemirolast Potassium

يستخدم في علاج الربو المزمن و في الوقاية من التهاب الأنف
التحسسي و التهاب الملتحمة التحسسي
يؤخذ بعد الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

Penicillamine

ترياق لعلاج التسمم بالنحاس و الرصاص و الزئبق و يستخدم في
علاج داء ويلسون و بيلة السيستئين و التهاب المفاصل الرثياني
ينقص امتصاصه الفموي إذا أخذ مع الحديد أو المعادن الأخرى أو
مضادات الحموضة أو الطعام لذا يؤخذ على معدة فارغة (قبل
الطعام بساعة على الأقل أو بعده بساعتين)

(Martindale Thirty-sixth edition) (AHFS Drug Information)

(British National Formulary 57) (الشامل في الأدوية السريرية)

Pentazocine

مسكن أفيوني

يفضل تناوله بعد الطعام

(British National Formulary 57) (Martindale Thirty-sixth edition)

Pentosan Polysulfate Sodium

دواء مشابه للهيبارن له خواص مضادة للتخثر و حالة للفيبرين و
مضاد للالتهاب يستخدم في الاضطرابات الانصمامية الخثارية و
في التهاب المثانة الخلالي و في التهاب البروستات و في داء
كروتزفلد-ياكوب (الاعتلال الدماغي الفيروسي الاسفنجي)
يؤخذ مع الماء قبل ساعة من وجبة الطعام أو بعدها بساعتين
(الشامل في الأدوية السريرية)

Pentoxifylline

يستخدم في علاج أمراض الأوعية المحيطية و الدماغية
يؤخذ البينتوكسيفيللين مع وجبات الطعام لتخفيف الاضطرابات
الهضمية التي يسببها

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

(AHFS Drug Information) (الشامل في الأدوية السريرية)

Peppermint Oil

(زيت النعناع)

يستخدم زيت النعنع لعلاج تشنج الأمعاء و النفخة
تبلع الكبسولة الملبسة معوياً بالكامل دون مضغ قبل الطعام بـ 0,5-

Pergolide Mesilate

دواء مضاد لباركنسون و يستخدم في الاضطرابات المترافقة بفرط
برولاكتين الدم و ضخامة النهايات و يستخدم في متلازمة تملل
الساقين و في متلازمة توريت

يؤخذ مع الطعام أو الحليب (الشامل في الأدوية السريرية)

Phenazopyridine hydrochloride

مسكن و مخدر موضعي لمخاطية السبيل البولي
يؤخذ بعد الطعام

(AHFS Drug Information) (British National Formulary 57)

(Martindale Thirty-sixth edition) (الشامل في الأدوية السريرية)

Phendimetrazine tartrate

دواء مقهم (مفقد للشهية) يستخدم في المعالجة قصيرة الأمد للسمنة

يؤخذ قبل الطعام بساعة (AHFS Drug Information)

Phenelzine Sulfate

مضاد اكتئاب مثبط لخميرة المونو أمينو أوكسيداز

يجب تجنب تناول الأطعمة أو الأشربة التي تحوي التيرامين أو
التربتوفان لأن تناولها خلال فترة استخدام هذا الدواء قد يسبب
ارتفاع توتر شرياني شديد كما يجب تجنب الكحول و الكافئين

(Pocket Clinical Drug Reference) (الشامل في الأدوية السريرية)

Phenobarbital

دواء مضاد للصرع و مهدئ و مركن و يستخدم لخفض بيليروبين الدم

يؤخذ مع الطعام إذا سبب اضطراب هضمي ,تتطاول مدة تأثير الباربيتورات عند المريض الذي يتناول حمية فقيرة بالبروتين, و هناك احتمال ضعف تأثيره عند تناول الفواكه الطازجة الغنية بفيتامين س و ذلك لأن فيتامين س يطرد هذا الدواء من مواضع ارتباطه بالبروتينات البلازمية مما يؤدي لزيادة معدل إطراره (الشامل في الأدوية السريرية)

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

Phenoxymethyl penicillin (Penisilin V)

صاد حيوي من البنسلينات

يفضل تناوله على معدة فارغة لأن ذلك يجعل امتصاصه أفضل ,لكن يمكن تناوله مع الطعام فتأثير الطعام على امتصاصه ضعيف

(Martindale Thirty-sixth edition) (AHFS Drug Information)

Phentermine

دواء محدث للقمه, يستخدم في العلاج قصير الأمد للبدانة

يؤخذ قبل نصف ساعة من موعد تناول الطعام

(الشامل في الأدوية السريرية)

Phenytoin

دواء مضاد للصرع و يستخدم لعلاج اللانظميات البطينية و علاج

انحلال البشرة الفقاعي

يؤخذ مع الطعام أو بعده و ذلك للتقليل من الاضطرابات الهضمية
التي يسببها كما أن الطعام يحسن توافره الحيوي (يزيد الامتصاص)

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

(British National Formulary 57) (Martindale Thirty-sixth edition)

Pilocarpine

دواء مقلد للكولين يستخدم مستحضره العيني في علاج الزرق و
معاكسة موسعات الحدقة و شالات العضلة الهدبية و يستخدم
مستحضره الفموي في علاج جفاف الفم

لعلاج جفاف الفم يؤخذ مع الطعام أو بعده مباشرة

لا تؤخذ أقراصه مع الوجبات الغنية بالدهن لأنها تنقص معدل
امتصاصه

(British National Formulary 57) (Martindale Thirty-sixth edition)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Pinaverium Bromide

حاصر لقنوات الكالسيوم يستخدم في متلازمة الأمعاء الهیوجة و
يستخدم في الاضطرابات الوظيفية التي تصيب السبيل الصفراوي

يؤخذ خلال وجبات الطعام مع كأس كبيرة من الماء و يجب عدم
تناوله قبل الاستلقاء لأنه يسبب جزراً معدياً مريئياً

(Martindale Thirty-sixth edition) (الشامل في الأدوية السريرية)

Pindolol

خافض للضغط من حاصرات بيتا

لا يتأثر التوافر الحيوي للبيندولول بالطعام ,فالطعام يزيد معدل

الامتصاص و ليس الكمية الممتصة (AHFS Drug Information)

Pioglitazone

خافض لسكر الدم, يؤخذ مع الطعام أو بدونه

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

(AHFS Drug Information)

Piperazine

دواء طارد للديدان

يؤخذ على معدة فارغة (الشامل في الأدوية السريرية)

Pirenzepine

مضاد للمسكارين يستخدم في علاج القرحة الهضمية

يبلغ توافره الحيوي 20-30% و ينخفض بوجود الطعام حتى 10-

20% (Martindale Thirty-sixth edition)

Piroxicam

مضاد التهاب غير ستيرويدي

إن الطعام ينقص معدل الامتصاص و ليس الكمية الممتصة

يؤخذ مع الطعام

(Pocket Clinical Drug Reference) (AHFS Drug Information)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Pivampicillin

صاد حيوي من البنسلينات

لا يتأثر امتصاص البيفامبيسيلين بشكل هام بوجود الطعام لكن
الانزعاج الهضمي الذي يسببه يكون أكثر تواتراً عندما يؤخذ على
معدة فارغة لذا يؤخذ مع الطعام

(Martindale Thirty-sixth edition)

Pivmecillinam

صاد حيوي من البنسلينات

إن وجود الطعام في المعدة ليس له تأثير هام على امتصاصه , يؤخذ
أثناء وجبة الطعام مع نصف كأس ماء على الأقل وذلك بوضعية
قائمة

(Martindale Thirty-sixth edition) (British National Formulary 57)

Polythiazide

مدر تيازيدي من مشتقات السلفوناميد

يمكن تناوله مع الطعام أو الحليب (الشامل في الأدوية السريرية)

Posaconazole

دواء مضاد للفطور

يزداد توافره الحيوي بوجود الطعام, يؤخذ مع وجبة طعام كاملة
لتحسين امتصاصه

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

Potassium iodide

دواء مضاد للدرق و مقشع

يؤخذ مع الطعام (لتقليل الانزعاج الهضمي) أو يمدد بكميات وافرة
من الحليب أو الماء أو العصير و عند استخدامه كمقشع يؤخذ مع
كأس كامل من الماء

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Potassium Aminobenzoate

يستخدم في علاج الاضطرابات المختلفة المتعلقة بفرط التليف مثل
تصلب الجلد و داء بيروني

يجب تجنب استخدامه خلال الصوم أو فقدان الشهية أو تناول كميات
منخفضة من الطعام و ذلك لتجنب التطور المحتمل لنقص سكر الدم
يؤخذ بعد الطعام

(Martindale Thirty-sixth edition) (British National Formulary 57)

Pramipexole

يستخدم لعلاج داء باركنسون و متلازمة تلمل الساقين
يصل التركيز المصلي للذروة خلال ساعتين من تناوله فمويّاً على
معدة فارغة و خلال ثلاث ساعات عند تناوله بعد الطعام (إن الطعام
ينقص معدل الامتصاص لكنه لا ينقص الكمية الممتصة) يؤخذ مع
الطعام للتخفيف من الغثيان

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

(Martindale Thirty-sixth edition)

Pramlintide

دواء يستخدم في علاج داء السكري, يعطى حقناً تحت الجلد

يؤخذ مباشرة قبل وجبات الطعام الرئيسية

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

(Pharmacotherapy handbook Eighth Edition)

Prasugrel

مضاد للصفائح

يؤخذ بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Pravastatin

خافض لشحوم الدم

يؤخذ بغض النظر عن الطعام و في أي وقت من اليوم

(AHFS Drug Information)

Praziquantel

دواء مضاد للديدان , يؤخذ مع الطعام

(Martindale Thirty-sixth edition) (الشامل في الأدوية السريرية)

Prazosin

خافض للضغط من حاصرات ألفا

تشير دراسة أن وجود الطعام يؤخر الامتصاص عند بعض المرضى لكن الكمية الممتصة لا تتأثر, إن تناوله مع الطعام يخفف من حدوث انخفاض الضغط و الدوخة عند بعض المرضى

(AHFS Drug Information)

Prednisolone

ستيرويد قشري

يتأثر امتصاصه الأولي بوجود الطعام لكن التوافر الحيوي لا يتأثر
يؤخذ مع الطعام للتخفيف من تأثيراته الجانبية الهضمية

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Prednisone

ستيروئيد قشري

يؤخذ مع الطعام لتخفيف الانزعاج الهضمي الذي قد ينجم عنه

(Pocket Clinical Drug Reference)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Pregabalin

دواء مضاد للصرع و يستخدم في اضطراب القلق المعمم و لعلاج
آلام الاعتلالات العصبية

يمتص بسرعة عبر الجهاز الهضمي و يبلغ توافره الحيوي 90% ,
ينخفض معدل الامتصاص إذا أخذ مع الطعام لكن الكمية الممتصة
لا تتأثر

يؤخذ بغض النظر عن وجبات الطعام

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

Primaquine Phosphate

دواء مضاد للملاريا

يؤخذ مع الطعام للتخفيف من تأثيراته الجانبية الهضمية

(Martindale Thirty-sixth edition) (الشامل في الأدوية السريرية)

Primidone

مضاد اختلاج باربيتوري

يمكن تناوله مع الطعام لتخفيف تأثيراته الجانبية الهضمية
إن تناول المريض لحمية فقيرة بالبروتين خلال فترة استخدامه
يسبب زيادة مدة تأثيره لذا يجب الانتباه لذلك و إن تناول المشروبات
الطازجة الغنية بفيتامين س يسبب انزياعه من مواضع ارتباطه
بالبروتينات البلازمية و بالتالي يزداد معدل إطراره البولي و تنقص
شدة تأثيره

(الشامل في الأدوية السريرية)

Probenecid

دواء مدر لحمض البول يستخدم لعلاج فرط حمض البول في الدم
المرافق للنقرس المزمن و لعلاج فرط حمض البول في الدم الذي
يسببه العلاج بالمدرات, يشترك مع بعض الصادات من زمرة
البيتالاكتام لإطالة فترة تأثيرها و يعطى مع المضاد الفيروسي
cidofovir لتخفيف السمية الكلوية التي يسببها السيدوفوفير
قد يسبب مشاكل هضمية لذا يؤخذ مع الطعام أو مضادات الحموضة
مع شرب كميات وافرة من الماء لتجنب الإصابة بحصيات حمض
البول

(الشامل في الأدوية السريرية) (Pocket Clinical Drug Reference)

Probucol

دواء خافض للشحوم

يؤخذ البروبوكول مرتين يومياً مع وجبات الطعام

(الشامل في الأدوية السريرية)

procainamide hydrochloride

مضاد لاضطراب النظم

يتباطأ امتصاصه بوجود الطعام في الجهاز الهضمي

(AHFS Drug Information)

Procarbazine Hydrochloride

دواء مضاد للأورام

يؤخذ مع الطعام أو السوائل إذا سبب انزعاج هضمي

يجب تجنب الأطعمة الغنية بالتيرامين خلال فترة استخدام هذا الدواء و ذلك لأنه يملك فعالية ضعيفة مثبطة لخميرة MAO و يجب تجنب الكحول و الكافئين

(الشامل في الأدوية السريرية) (Pocket Clinical Drug Reference)

Prochlorperazine

مشتق فينوتيازيني مضاد للذهان و مضاد للإقياء

يؤخذ مع الطعام أو الحليب أو كأس كامل من الماء لتقليل الاضطرابات المعدية

(Pocket Clinical Drug Reference)

Procyclidine Hydrochloride

دواء مضاد للكولين يستخدم في علاج داء باركنسون

يؤخذ مع الطعام لتخفيف الانزعاج الهضمي, يمكن تخفيف جفاف الفم و الإمساك الممكن حدوثهما بتناول كميات كبيرة من السوائل

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Profenamine (Ethopropazine)

دواء مضاد لباركنسون

يؤخذ مع الطعام لتخفيف الانزعاج الهضمي

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

Proglumide

يستخدم في علاج القرحة الهضمية واضطرابات هضمية أخرى

يؤخذ قبل وجبات الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

Proguanil Hydrochloride

دواء مضاد للملاريا

يؤخذ بعد الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

Propantheline bromide

مضاد للمسكارين يستخدم في التشنجات المعدية المعوية و في

القرحة الهضمية و يستخدم في علاج السلس البولي و تشنجات

الحالب و المثانة و في فرط التعرق

ينخفض توافره الحيوي بوجود الطعام , يؤخذ قبل وجبات الطعام بـ

30-60 دقيقة

(Martindale Thirty-sixth edition)

Propranolol

حاصر بيتا

تؤخذ الأقراص العادية قبل وجبات الطعام و وقت النوم

(AHFS Drug Information)

Propylthiouracil

دواء مضاد للدرق

يؤخذ في نفس الوقت فيما يتعلق بوجبات الطعام يومياً

(Pocket Clinical Drug Reference)

Prussian Blue

يستخدم هذا الدواء في علاج التسمم بالتاليوم و السيزيوم المشع

يؤخذ مع الطعام (AHFS Drug Information)

Pseudoephedrine

مقلد ودي, مضاد للاحتقان

يؤخذ مع الطعام (Pocket Clinical Drug Reference)

إن الطعام يؤخر امتصاص البسودوافدرين المحضر على شكل محلول لكنه لا يؤثر على امتصاص المستحضرات مديدة التحرر

تؤخذ الأقراص مديدة التحرر التي تحوي فيكسوفينادين و بسودوافدرين بعيداً عن الطعام و ذلك لأن الطعام يؤثر بشكل ملحوظ على معدل الامتصاص و الكمية الممتصة للفيكسوفينادين من هذه الأقراص أما معدل الامتصاص و الكمية الممتصة للبسودوافدرين من هذه الأقراص فإنه لا يتأثر بالطعام

(الشامل في الأدوية السريرية) (AHFS Drug Information)

Pyrantel

طارد للديدان

يؤخذ كجرعة وحيدة بغض النظر عن الطعام (يمكن أن تمزج مع الطعام أو الحليب أو العصير أو تؤخذ على معدة فارغة)

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

(AHFS Drug Information)

Pyrazinamide

دواء مضاد للتدرن

هناك دراسة بأن التوافر الحيوي للريفامبيسين و الإيزونيازيد لكن ليس البيرازيناميد ينقص بوجود الطعام لكن هناك دراسة أخرى بأن التركيز المصلي الذروي ينخفض قليلاً عندما يؤخذ البيرازيناميد مع وجبة طعام عالية المحتوى من الدسم، و اقترح أن يؤخذ على معدة فارغة

(Martindale Thirty-sixth edition)

Pyrimethamine

دواء مضاد للملاريا

يؤخذ مع الطعام لتخفيف الإقياء الذي قد يسببه

(الشامل في الأدوية السريرية)

Quazepam

مهدئ و مركن بنزوديازيبيني

إن الطعام لا يؤثر على امتصاصه من الجهاز الهضمي

(AHFS Drug Information)

Quetiapine Fumarate

مضاد للنفساس يستخدم لعلاج الفصام

يؤخذ بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Quinagolide Hydrochloride

يستخدم في الاضطرابات المرتبطة بفرط برولاكتين الدم

يؤخذ مع الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

Quinapril Hydrochloride

خافض للضغط من مثبطات الأنزيم المحول للأنجوتنسين

إن معدل الامتصاص و الكمية الممتصة ينخفضان حوالي 25-

30% عند تناوله مع وجبة طعام عالية الدسم

عند تناول مزيج كينابريل هيدروكلوريد و هيدروكلوروتيازيد مع

وجبة طعام دسمة تبين أن معدل الامتصاص (السرعة) للكينابريل

ينخفض حوالي 14% و معدل الامتصاص للهيدروكلوروتيازيد

ينخفض حوالي 12% مقارنة بتناوله على معدة فارغة أما الكمية

المتصة لا تتأثر لذا يمكن تناول هذا المزيج بغض النظر عن

الطعام

(AHFS Drug Information)

Quinethazone

مدر تيازيدي

يمكن تناوله مع الحليب أو الطعام (الشامل في الأدوية السريرية)

Quinidine

مضاد لاضطراب النظم و مضاد للملاريا

يمكن تقليل تأثيراته الجانبية الهضمية بتناول الجرعة الفموية مع الطعام أو مضادات الحموضة لكن ذلك قد يؤخر الامتصاص كما يجب الانتباه أن مضادات الحموضة و الأطعمة التي تقلون البول تنقص طرح الكينيدين

إن عصير فاكهة الكريب يؤخر امتصاصه و يثبط استقلاب الكينيدين إلى 3 هيدروكسي كينيدين في الأمعاء لذا يجب تجنبه

(AHFS Drug Information) (Pocket Clinical Drug Reference)

Quinine

دواء مضاد للملاريا

يؤخذ مع الطعام (Pocket Clinical Drug Reference)

Rabeprazole

مثبط لمضخة البروتون يثبط إفراز الحمض المعدي

إن الطعام عالي الدسم يؤخر الامتصاص لكنه لا يؤثر على الكمية الممتصة , يؤخذ بغض النظر عن الطعام لكن في حالة قرحة الاثني عشر يؤخذ بعد وجبة الصباح

(AHFS Drug Information)

Racecadotril

مضاد للإسهال يثبط خميرة الإنكفاليناز مما يؤدي لتثبيط تخرب المورفينات الداخلية

يؤخذ قبل وجبات الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

Raloxifene Hydrochloride

معدل انتقائي لمستقبلات الإستروجين يستخدم للوقاية من هشاشة العظام و علاجه بعد سن اليأس
يؤخذ بغض النظر عن موعد تناول الطعام
(الشامل في الأدوية السريرية) (AHFS Drug Information)

Raltegravir

دواء مضاد للفيروسات
يؤخذ مع أو بدون طعام
(Martindale Thirty-sixth edition)

Ramelteon

دواء منوم يستخدم لعلاج الأرق
يجب ألا يؤخذ مع وجبة طعام مرتفعة الدسم أو بعدها مباشرة
(Martindale Thirty-sixth edition) (Pocket Clinical Drug Reference)
(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

Ramipril

خافض للضغط من مثبطات الأنزيم المحول للأنجوتنسين
إن معدل الامتصاص و ليس الكمية الممتصة ينخفض بتناول هذا الدواء مع الطعام
(AHFS Drug Information)

Ranitidine

دواء حاصر لمستقبلات الهستامين H_2 يقلل من إفراز الحمض المعدي

يبلغ توافره الحيوي الفموي 50-60 % و لا يتأثر بشكل هام بوجود الطعام

(Martindale Thirty-sixth edition)

(Wilson and Gisvold's Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry eleventh edition)

Ranitidine Bismuth Citrate

يستخدم في علاج القرحة الهضمية
يؤخذ مع الطعام للحصول على فعالية قصوى
(الشامل في الأدوية السريرية)

Rasagiline

دواء يستخدم في علاج باركنسون
يؤخذ بغض النظر عن الطعام ,يجب تجنب الأطعمة و الأشرية
الغنية بالتيرامين

(Pocket Clinical Drug Reference) (AHFS Drug Information)

Repaglinide

خافض لسكر الدم
يؤخذ خلال 30 دقيقة قبل وجبات الطعام الرئيسية و في حال عدم تناول وجبة الطعام تحذف الجرعة و ذلك لأنه يسبب انخفاض في سكر الدم

(Martindale Thirty-sixth edition) (British National Formulary 57)

(Pharmacotherapy handbook Eighth Edition)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Reserpine

خافض للضغط من نبات الراولفيا
يؤخذ الريزيربين مع الحليب أو الطعام (الشامل في الأدوية السريرية)

Riboflavin (Vitamin B2)

تزداد الكمية الممتصة عند تناوله مع الطعام
يؤخذ مع الطعام

(AHFS Drug Information) (الشامل في الأدوية السريرية)

Rifabutin

دواء مضاد للمتفطرات
إن الطعام يؤخر امتصاصه لكنه لا يؤثر على الكمية الممتصة ,
يؤخذ بغض النظر عن وجبات الطعام (في حال وجود مشاكل
هضمية يمكن تناوله مع الطعام)

(Martindale Thirty-sixth edition) (Pocket Clinical Drug Reference)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Rifampicin (Rifampin)

صاد حيوي
إن الطعام يؤخر و ينقص امتصاصه بشكل كبير لذا ينصح بتناوله
على معدة فارغة للحصول على امتصاص أعظمي (على الرغم من
أن تناوله بعد الطعام يخفف الأعراض الهضمية التي يسببها)

(Martindale Thirty-sixth edition) (Pocket Clinical Drug Reference)

(Wilson and Gisvold's Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical
Chemistry eleventh edition)

Rifapentine

دواء مضاد للتدرن

يتحسن امتصاصه حوالي 50% عندما يؤخذ مع الطعام كما أن تناوله مع الطعام يقلل التأثيرات الجانبية الهضمية الممكن حدوثها

(Martindale Thirty-sixth edition)

Riluzole

يستخدم في علاج التصلب الجانبي الضموري

إن الطعام ينقص توافره الحيوي لذا يؤخذ على معدة فارغة قبل ساعة أو بعد ساعتين من تناول الطعام

(Martindale Thirty-sixth edition) (AHFS Drug Information)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Rimantadine hydrochloride

مضاد فيروسي

ليس للطعام تأثير مهم على امتصاص الريمانتادين

(AHFS Drug Information)

Rimonabant

يستخدم كمساعد في معالجة البدانة

يؤخذ قبل الفطور

(British National Formulary 57) (Martindale Thirty-sixth edition)

Risedronate

من مشتقات البيسفوسفونات يستخدم لعلاج داء باجيت العظمي و

لعلاج هشاشة العظام و الوقاية منه

ينقص امتصاص الريزيدرونات بوجود الطعام خصوصاً الحاوي على الكالسيوم و الكاتيونات متعددة التكافؤ الأخرى, يبلغ متوسط توافره الحيوي 0.63% على معدة فارغة و ينخفض حوالي 30% عندما يؤخذ قبل الفطور بساعة و حوالي 55% عندما يؤخذ قبل الفطور بنصف ساعة يؤخذ على معدة فارغة قبل الطعام بنصف ساعة على الأقل مع كأس ماء كبير و يجب تجنب الاستلقاء لمدة 30-60 دقيقة بعد تناول الدواء

(British National Formulary 57) (Martindale Thirty-sixth edition)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Risperidone

دواء مضاد للذهان

إن الطعام لا يؤثر على معدل الامتصاص أو الكمية الممتصة, يمكن أن يؤخذ بغض النظر عن وجبات الطعام, لا يمزج المحلول الفموي مع الشاي أو الكولا (يتوافق المحلول الفموي مع الماء و القهوة و عصير البرتقال و الحليب قليل الدسم)

(AHFS Drug Information) (Pocket Clinical Drug Reference)

Ritonavir

دواء مضاد فيروسي يستخدم في علاج متلازمة عوز المناعة المكتسب

إن امتصاصه يتحسن عندما يؤخذ مع الطعام كما أنه يتعلق بالجرعة يؤخذ مع الطعام

(Martindale Thirty-sixth edition)(Pocket Clinical Drug Reference)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Rivastigmine

دواء يستخدم في علاج الخرف

الطعام يؤخر امتصاص الريفاستيغمين حوالي ساعة و نصف لكنه يزيد الكمية الممتصة و يخفض التركيز المصلي الذروي, يؤخذ مع الطعام و ذلك لأن تأثيراته الجانبية الهضمية تتعلق بتراكيزه المصلية الذروية المرتفعة

(Martindale Thirty-sixth edition) (AHFS Drug Information)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Rizatriptan

شاد انتقائي لمستقبلات السيروتونين 5_{HT_1}

يصل التركيز المصلي للذروة عند تناوله فموياً بعد حوالي 1-1.5 ساعة أو 1.6-2.5 ساعة و ذلك حسب الصياغة الصيدلانية, و يتأخر الزمن اللازم للوصول للتركيز الذروي في حالة الأقراص عند تناولها مع الطعام حوالي ساعة

تؤخذ الأقراص العادية و المتفتتة بغض النظر عن الطعام

(AHFS Drug Information) (Martindale Thirty-sixth edition)

Rofecoxib

مضاد التهاب غير ستيرويدي انتقائي على سيكلوأكسجيناز 2

تؤخذ الأقراص بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Roflumilast

دواء يستخدم في علاج الربو و الداء الرئوي الانسدادي المزمن

يؤخذ مع الطعام أو بدونه

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

Ropinirole

دواء شاد للدوبامين يستخدم لعلاج داء باركنسون

إن معدل الامتصاص ينخفض عند تناوله مع الطعام لكن الكمية الممتصة لا تتخفض, يؤخذ بغض النظر عن الطعام لكن في حال حدوث غثيان يؤخذ مع الطعام للتخفيف من ذلك

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

(AHFS Drug Information) (Martindale Thirty-sixth edition)

Rosiglitazone

خافض لسكر الدم, يؤخذ مع الطعام أو بدونه

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

(AHFS Drug Information)

Rosuvastatin

خافض لشحوم الدم

يؤخذ بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Roxithromycin

صاد حيوي من الماكروليدات

ينخفض امتصاصه عندما يؤخذ بعد الطعام لذا يؤخذ قبل الطعام

(الشامل في الأدوية السريرية) (Martindale Thirty-sixth edition)

Rufinamide

دواء مضاد للصرع

يؤخذ مع الطعام حيث أن الطعام يزيد التوافر الحيوي لهذا الدواء
بحوالي 34-40%

(Martindale Thirty-sixth edition)

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

Sacrosidase

يستخدم في عوز sucrase-isomaltase الخلقي

يؤخذ مع كل وجبة طعام أو وجبة خفيفة

إن تناوله مع الطعام أو الحليب ينقص من تخرب هذا الإنزيم
بالببسين المعدي

يمدد محلول الـ Sacrosidase بـ 60-120 مل من الماء أو
الحليب بشرط ألا تكون ساخنة و ذلك لأن فعالية هذا الدواء تنقص
بالحرارة , و لا يمدد بعصير الفاكهة أو يؤخذ معه و ذلك لأن
حموضة العصير تنقص من فعالية هذا الإنزيم

تؤخذ نصف الجرعة عند بداية الوجبة و النصف الآخر في نهايتها

(AHFS Drug Information) (Martindale Thirty-sixth edition)

Salicylamide

من الساليسيلات

يفضل تناوله مع الطعام أو كمية كبيرة من الماء (240مل) أو

الحليب لتقليل تأثيراته الجانبية الهضمية (AHFS Drug Information)

Salicylate Salts

Choline salicylate, magnesium salicylate, sodium salicylate

تؤخذ مع الطعام أو كمية كبيرة (240مل) من الماء أو الحليب لتقليل
الانزعاج المعدي (AHFS Drug Information)

Salsalate

مضاد التهاب غير ستيرويدي من الساليسيلات
يؤخذ مع الطعام أو كمية كبيرة (240مل) من الماء أو الحليب
لتخفيف تأثيراته الجانبية الهضمية
(Martindale Thirty-sixth edition) (AHFS Drug Information)
(الشامل في الأدوية السريرية)

Saquinavir

مضاد للفيروسات القهقرية يستخدم في علاج متلازمة عوز المناعة
المكتسب
يمكن للطعام و لاسيما الغني بالدسم أن يزيد معدل امتصاصه
لخمسة أضعاف لذا يؤخذ خلال ساعتين من تناول وجبة طعام كاملة
(Pocket Clinical Drug Reference) (الشامل في الأدوية السريرية)

Secnidazole

صاد حيوي و مضاد أوالي
يؤخذ مع الطعام لتخفيف عدم التحمل الهضمي
(الشامل في الأدوية السريرية)

Seratrodest

يستخدم في المعالجة الوقائية للربو

يؤخذ بعد الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

Sertraline

مضاد للاكتئاب مثبت انتقائي لعودة قبط السيروتونين

إن تناول الأقراص مع الطعام يزيد الكمية الممتصة قليلاً و التركيز الذروي يزيد حوالي 25% و الزمن اللازم للوصول للتركيز الذروي ينخفض من حوالي 8 ساعات إلى 5.5 ساعة لكن هذه التغيرات ليس لها أهمية سريرية أما تناول المحلول الفموي مع الطعام يزيد الزمن اللازم للوصول للتركيز الذروي من 5.9 ساعة إلى 7 ساعات (AHFS Drug Information)

Sevelamer

دواء رابط للفوسفات

يؤخذ مع وجبات الطعام

(AHFS Drug Information) (Martindale Thirty-sixth edition)

(British National Formulary 57) (Pocket Clinical Drug Reference)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Sibutramine hydrochloride

دواء مقهم (مفقد للشهية)

يؤخذ صباحاً بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Sildenafil

مثبط لخميرة فوسفودي استيراز ,يستخدم لعلاج اضطراب الانتصاب عند الذكور و لعلاج ارتفاع التوتر الرئوي البدئي
ينخفض معدل امتصاصه عند تناوله مع الطعام و يزيد عصير فاكهة الكريب توافره الحيوي لكنه يؤخر امتصاصه
للحصول على تأثير أسرع يؤخذ على معدة فارغة و للحصول على امتصاص أعلى يجب تجنب تناوله مع وجبة طعام دسمة

(Pharmacotherapy handbook Eighth Edition)

(Martindale Thirty-sixth edition)

Simeticone

طارد للغازات الهضمية

يؤخذ بعد وجبات الطعام و عند النوم (AHFS Drug Information)

Simvastatin

خافض للشحوم

إن امتصاصه من الجهاز الهضمي لا يتأثر بشكل هام عندما يؤخذ مباشرة قبل وجبة طعام خفيفة الدسم (AHFS Drug Information)

Sirolimus

مثبط للمناعة

إن الطعام يؤثر على امتصاصه , يؤخذ بشكل ثابت فيما يتعلق بالطعام

(AHFS Drug Information) (British National Formulary 57)

Sitagliptin

خافض لسكر الدم, يؤخذ مع الطعام أو بدونه

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

Sitaxentan

يستخدم لعلاج ارتفاع الضغط الرئوي و فشل القلب
إن الطعام عالي الدسم يؤخر من امتصاصه لكن الكمية الممتصة لا
تتأثر

(Martindale Thirty-sixth edition)

Sodium Cellulose Phosphate

يستخدم في علاج فرط كالسيوم الدم و في علاج فرط كالسيوم البول
الامتصاصي نمط1 المترافق مع التشكل المتكرر للحصيات البولية
الحاوية على كالسيوم

يؤخذ مع وجبات الطعام و تنخفض كمية الكالسيوم المرتبطة معه
بشكل هام عند تناوله بعد أكثر من ساعة من الطعام

يمزج المسحوق من هذا الدواء مع 100-300 مل من الماء أو
عصير الفواكه و يؤخذ خلال نصف ساعة من تناول الوجبة (لا
يمزج مع الحليب أو الأشرطة الأخرى الغنية بالكاتيونات)

(AHFS Drug Information) (Martindale Thirty-sixth edition)

Sodium Cromoglicate

يستخدم في الوقاية من الاضطرابات الأرجية
يؤخذ قبل وجبات الطعام بنصف ساعة

(Pocket Clinical Drug Reference)

Sodium Oxybate

يستخدم لعلاج الجمدة عند مرضى السنة
يمتص من الجهاز الهضمي بسرعة لكن امتصاصه غير كامل و
يبلغ توافره الحيوي 25% , يتأخر امتصاصه و ينقص بوجود وجبة
طعام عالية الدسم

يؤخذ على معدة فارغة و قبل النوم مباشرة (بعد الطعام بـ 2-3
ساعات على الأقل) و الجرعة الثانية تؤخذ بعد 2.5-4 ساعات
يجب تمديد الجرعة بـ 60 مل من الماء

(Martindale Thirty-sixth edition)

Sodium Phenylbutyrate

يستخدم في فرط أمونيا الدم عند مرضى اضطراب دورة اليوريا
يؤخذ مع وجبات الطعام

(British National Formulary 57) (Martindale Thirty-sixth edition)

Solifenacin

دواء يستخدم في علاج السلس البولي و البوال المتكرر و الإلحاح
البولي

يؤخذ بغض النظر عن الطعام (Pocket Clinical Drug Reference)

Sorafenib

دواء مضاد للورم

ينخفض الامتصاص حوالي 30% بعد وجبة طعام عالية الدسم,
يؤخذ قبل الطعام بساعة أو بعده بساعتين على الأقل

(Martindale Thirty-sixth edition)

Sotalol Hydrochloride

حاصر بيتا يستخدم في علاج اللانظميات

ينخفض معدل امتصاصه بنسبة 20-30% عند تناوله مع الطعام

(الشامل في الأدوية السريرية)

Sparfloxacin

صاد حيوي من الكينولونات

يمكن تناوله مع الطعام أو بعيداً عنه مع شرب كمية كبيرة من

السوائل

(الشامل في الأدوية السريرية)

Spiramycin

صاد حيوي من الماكروليدات

ينخفض امتصاصه بوجود الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

Spironolactone

مدر حافظ للبوتاسيوم

يزداد معدل امتصاص السبيرونولاكتون عند تناوله مع الطعام ,

يؤخذ مع الطعام و يجب تجنب الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم أو

مستحضراته خلال فترة استخدام السبيرونولاكتون (Pocket Clinical

Drug Reference) (الشامل في الأدوية السريرية)

Stavudine

مضاد فيروسسي

يؤخذ بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Sterculia

ملين كتلوي, يؤخذ بعد وجبات الطعام

(British National Formulary 57) (Martindale Thirty-sixth edition)

Stiripentol

دواء مضاد للصرع

يؤخذ مع الطعام لكن ليس مع منتجات الحليب أو المشروبات
الغازية أو عصير الفواكه أو الأطعمة و الأشربة الحاوية على
الكافئين أو التيوفيللين

(Martindale Thirty-sixth edition)

Strontium Ranelate

يستخدم لعلاج تخلخل العظام التالي لسن الإياس
يجب ألا يؤخذ مع الطعام أو مضادات الحموضة فالحليب و
الأطعمة الحاوية على كالسيوم قد تخفض من توافره الحيوي, يبلغ
التوافره الحيوي المطلق حوالي 25% بعد تناوله فموياً و يخفض
الطعام أو الكالسيوم التوافر الحيوي بحوالي 60-70%
يفضل تناوله بالليل بعد ساعتين على الأقل من الطعام

(Martindale Thirty-sixth edition)

Sucralfate

يستخدم لعلاج القرحة الهضمية و التهاب المعدة المزمن
يؤخذ على معدة فارغة قبل وجبة الطعام بساعة

(AHFS Drug Information) (Martindale Thirty-sixth edition)
(British National Formulary 57) (Pocket Clinical Drug Reference)
(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)
(Wilson and Gisvold's Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry eleventh edition)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Sulfadiazine

صاد حيوي من السلفوناميدات

يؤخذ على معدة فارغة مع شرب كمية كبيرة من السوائل خلال فترة
استخدامه (الشامل في الأدوية السريرية)

Sulfafurazole (Sulfisoxazole)

صاد حيوي من السلفوناميدات

يؤخذ على معدة فارغة مع كأس من الماء (الشامل في الأدوية السريرية)

Sulfasalazine

دواء مضاد للالتهاب مشتق من مركب 5-أمينوساليسيليك أسيد
يستخدم في التهاب الكولون القرصي و داء كرون و تستخدم أقراصه
المغلقة معوياً في علاج التهاب المفاصل الرثياني
من الشائع أن يسبب عدم تحمل هضمي عند بداية استخدامه لذا
يؤخذ مع وجبات الطعام مع شرب كميات كبيرة من السوائل خلال
فترة استخدامه

(الشامل في الأدوية السريرية) (Pharmacotherapy handbook Eighth Edition)

Sulfinpyrazone

دواء طارح لحمض البول و له فعالية مضادة للصفائح
يؤخذ مع الطعام أو الحليب مع شرب كمية كبيرة من السوائل
(الشامل في الأدوية السريرية) (British National Formulary 57)

Sulindac

مضاد التهاب غير ستيرويدي
إن تناوله مع الطعام يخفض معدل الامتصاص و الكمية الممتصة
لكنه يؤخذ مع الطعام لتخفيف تأثيراته الجانبية الهضمية
(AHFS Drug Information) (Pocket Clinical Drug Reference)
(الشامل في الأدوية السريرية)

Sumatriptan

شاد انتقائي لمستقبلات السيروتونين 5-HT_1 يستخدم في علاج نوبات
الشقيقة الحادة و الصداع العنقودي
إن الطعام لا يؤثر بشكل ملحوظ على توافره الحيوي بعد تناوله
فمويًا لكنه يطيل الزمن اللازم للوصول للتركيز الذروي , يؤخذ مع
السوائل فوراً عند بدء ظهور أعراض الشقيقة
(AHFS Drug Information) (الشامل في الأدوية السريرية)

Sunitinib Malate

دواء مضاد للورم
إن توافره الحيوي لا يتأثر بالطعام , يؤخذ بغض النظر عن الطعام
(Martindale Thirty-sixth edition) (Pocket Clinical Drug Reference)

Tacrine

دواء يستخدم في علاج الخرف

يخفض الطعام امتصاصه حوالي 30-40%, يؤخذ على معدة فارغة لتحسين الامتصاص لكنه إذا سبب اضطرابات هضمية يمكن تناوله مع الطعام

(Martindale Thirty-sixth edition)

Tacrolimus

مثبط للمناعة

إن وجود الطعام ينقص معدل الامتصاص و الكمية الممتصة و خصوصاً ذو المحتوى العالي من الدسم يؤخذ التاكروليمس على معدة فارغة (قبل الطعام بساعة على الأقل أو بعده بـ 2-3 ساعات للحصول على امتصاص أعلى)

(AHFS Drug Information) (Martindale Thirty-sixth edition)

Tadalafil

مثبط لخميرة فوسفودي استيراز, يستخدم لعلاج اضطراب الانتصاب

لا يؤثر الطعام على معدل الامتصاص و الكمية الممتصة, يؤخذ مع الطعام أو بدونه

(Pharmacotherapy handbook Eighth Edition)

(Martindale Thirty-sixth edition)

Tamsulosin Hydrochloride

دواء حاصر للمستقبلات الأدرنرجية ألفا يستخدم في علاج فرط

تنسج البروستات الحميد

إن معدل الامتصاص و الكمية الممتصة ينخفضان بوجود الطعام

(Martindale Thirty-sixth edition)

يؤخذ مرة واحدة يومياً بعد نصف ساعة من الطعام و بنفس الوقت
كل يوم

(الشامل في الأدوية السريرية)

Tegaserod

يستخدم في المعالجة قصيرة الأمد لمتلازمة الأمعاء الهیوجة في
النمط الذي يسيطر فيه الإمساك و ذلك عند النساء و يستخدم في
الإمساك المزمن مجهول السبب

يبلغ توافره الحيوي المطلق بعد تناوله فموياً 10% و ينخفض
بوجود الطعام , يؤخذ قبل الطعام على معدة فارغة

(AHFS Drug Information) (Martindale Thirty-sixth edition)

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Telbivudine

دواء مضاد للفيروسات يستخدم في علاج التهاب الكبد ب
لا يتأثر امتصاصه بوجود الطعام, يؤخذ بغض النظر عن وجبات
الطعام

(Martindale Thirty-sixth edition)

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

Telithromycin

صاد حيوي ينتمي لمجموعة الكيتوليد

لا يؤثر الطعام على امتصاص التيليثروميسين

(Martindale Thirty-sixth edition)

Telmisartan

خافض للضغط من حاصرات مستقبلات الانجوتنسين 2

على الرغم من أن الطعام قد يخفض التوافر الحيوي للتيلميسارتان
لكن المصنعون ذكروا بأن هذا الدواء يمكن تناوله بغض النظر عن
الطعام

(AHFS Drug Information)

Temozolomide

دواء مضاد للورم

إن الطعام يخفض من معدل الامتصاص و الكمية الممتصة لذا يؤخذ
بشكل ثابت فيما يتعلق بالطعام لضمان توافر حيوي ثابت
يمكن تناوله مع الطعام لكن تناوله على معدة فارغة يقلل من حدوث
الغثيان و الإقياء

(AHFS Drug Information) (Martindale Thirty-sixth edition)

Tenofovir disoproxil fumarate

دواء مضاد للفيروسات يستخدم في علاج التهاب الكبد ب و الإيدز

يبلغ توافره الحيوي على معدة فارغة 25% لكنه يتحسن عندما

يؤخذ مع وجبة طعام عالية الدسم لذا يؤخذ مع الطعام

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

Tenonitrozone

مضاد أوالي

يؤخذ مع الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

Tenoxicam

مضاد التهاب غير ستيرويدي

يصل التركيز المصلي للذروة خلال ساعتين من تناوله على معدة فارغة و يتأخر إلى 6 ساعات إذا أخذ مع الطعام لكن ذلك لا يؤثر على الكمية الممتصة

(Martindale Thirty-sixth edition)

Terazosin

خافض للضغط من حاصرات مستقبلات ألفا و يستخدم لتخفيف أعراض الاحتباس البولي المرافق لضخامة الموثة الحميد
إن الطعام له تأثير صغير على الكمية الممتصة و يؤخر التركيز المصلي الذروي حوالي 40 دقيقة (AHFS Drug Information)

Terbinafine

دواء مضاد للفطور

يزداد توافره الحيوي عند تناوله مع الطعام لكن ذلك ليس له أهمية سريرية, يمكن رش الحثيرات على طعام رخو غير حامض

(AHFS Drug Information) (Pocket Clinical Drug Reference)

Terbutaline

شاد للمستقبلات الودية بيتا2 يستخدم موسع قصبي و مثبت للحمل
يبلغ التوافر الحيوي بعد تناوله فموياً على معدة فارغة 14-15% و
ينخفض بوجود الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)
يؤخذ مع وجبات الطعام لتقليل الانزعاج المعدي
(Pocket Clinical Drug Reference)

Tetracycline

صاد حيوي من التتراسكليينات
ينقص الطعام من امتصاصه لذا يفضل تناوله على معدة فارغة
(Martindale Thirty-sixth edition) (الشامل في الأدوية السريرية)
(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

Thalidomide

من الأدوية المعدلة للمناعة
يفضل تناوله وقت النوم و بعد ساعة على الأقل من وجبة الطعام
المسائية
(Martindale Thirty-sixth edition) (Pocket Clinical Drug Reference)

Thiamazole (Methimazole)

دواء مضاد للدرق
يؤخذ بشكل ثابت فيما يتعلق بالطعام أي دائماً مع الطعام أو دائماً
بدونه
(Pocket Clinical Drug Reference)

Thiamine Hydrochloride (Vitamin B1)

إن الطعام يؤثر على معدل الامتصاص (ينقصه) لكنه لا يؤثر على الكمية الممتصة

(AHFS Drug Information)

(Wilson and Gisvold's Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry eleventh edition)

Thyroid

يستخدم في علاج نقص نشاط الغدة الدرقية

يؤخذ قبل الفطور (Pocket Clinical Drug Reference)

Tiabendazole

داء طارد للديدان

يؤخذ بعد الطعام و يساعد شرب عصير الفواكه بطرد الدودة حيث أنه يزيل المخاط الذي تحيط به الدودة نفسها و الذي يساعدها بالالتصاق بجدار الأمعاء (الشامل في الأدوية السريرية)

Tiagabine

دواء مضاد للصرع

يؤخذ مع الطعام لتجنب الارتفاع السريع للتركيز المصلي و بالتالي تقليل تأثيراته الجانبية (إن الطعام يقلل سرعة امتصاصه لكنه لا يؤثر على الكمية الممتصة)

(AHFS Drug Information) (Martindale Thirty-sixth edition)

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

(Pharmacotherapy handbook Eighth Edition)
(الشامل في الأدوية السريرية) (Pocket Clinical Drug Reference)

Tiaprofenic Acid

مضاد التهاب غير ستيرويدي
يؤخذ مع الحليب أو الطعام (الشامل في الأدوية السريرية)

Ticlopidine

دواء مضاد لتكدس الصفائح
يؤخذ مع الطعام لتحسين امتصاصه و لتقليل التأثيرات الجانبية
الهضمية

(Martindale Thirty-sixth edition) (Pocket Clinical Drug Reference)
(AHFS Drug Information) (الشامل في الأدوية السريرية)

Tilactase (Lactase)

يحلّمه التيلاكّاز اللاكتوز إلى غلوكوز و غاللاكتوز, يستخدم لمنع
أعراض عدم تحمل اللاكتوز عند المرضى الذين لديهم عوز
بالأنزيم داخلي المنشأ حيث يضاف إلى الحليب و مشتقاته أو يؤخذ
فمويّاً مع الوجبة الحاوية على ذلك (يؤخذ مع أول لقمة من الوجبة)

(Martindale Thirty-sixth edition)
(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

Tiludronate

من مشتقات البيسفوسفونات يثبط الارتشاف العظمي و يستخدم في
داء باجيت

ينقص امتصاصه بوجود الطعام خصوصاً الحاوي على الكالسيوم و

الكاتيونات متعددة التكافؤ الأخرى

يبلغ توافره الحيوي 6% على معدة فارغة و ينخفض حوالي 90%
عندما يؤخذ خلال ساعتين من تناول الطعام

لضمان امتصاص كافى يجب أن يؤخذ مع الكثير من الماء (على
الأقل 200 مل) و قبل الطعام أو بعده بساعتين على الأقل

(British National Formulary 57) (Martindale Thirty-sixth edition)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Timolol maleate

خافض للضغط من حاصرات بيتا و يستخدم مستحضره العيني في
علاج الجلوكوما

إن امتصاصه لا ينقص بوجود الطعام (AHFS Drug Information)

Tinidazole

صاد حيوي و مضاد أوالي

يؤخذ مع أو بعد الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

Tiopronin

يستخدم هذا الدواء في علاج البيلة السيستينية و في التهاب المفاصل
الروماتويدي و يستخدم في الاضطرابات الكبدية و التسمم بالمعادن
الثقيلة و له فعالية حالة للميوسين

يؤخذ على معدة فارغة

(Martindale Thirty-sixth edition)

Tipranavir

مضاد للفيروسات يستخدم في علاج الـ HIV
إن الطعام يزيد من تحمله و يزداد توافره الحيوي عند تناوله مع
وجبة عالية الدسم, يؤخذ مع الطعام
(Martindale Thirty-sixth edition)

Tizanidine

مرخي عضلي
تزداد الكمية الممتصة حوالي 30% عند تناوله مع الطعام ,يؤخذ
بشكل ثابت فيما يتعلق بالطعام (إما دائماً مع الطعام أو دائماً على
معدة فارغة) (AHFS Drug Information)

Tocainide

مضاد لاضطراب النظم
يمكن تجنب بعض تأثيراته الجانبية بتناوله مع الطعام, فمعدل
الامتصاص و ليس الكمية الممتصة يتأثر بوجود الطعام فعند تناوله
بعد فترة قصيرة من الطعام ينقص التركيز المصلي الذروي و
يتأخر الزمن اللازم للوصول إليه
(AHFS Drug Information)

Tolazamide

خافض لسكر الدم
يؤخذ مع الطعام (الشامل في الأدوية السريرية)

Tolbutamide

خافض لسكر الدم

يؤخذ مع الطعام أو بعده مباشرة (British National Formulary 57)

Tolcapone

يستخدم في علاج داء باركنسون

على الرغم من أن الطعام يؤخر و ينقص امتصاصه (ينقص توافره الحيوي حوالي 10-20 %) يمكن تناوله بغض النظر عن الطعام

(AHFS Drug Information) (Martindale Thirty-sixth edition)

Tolmetin

مضاد التهاب غير ستيرويدي

ينقص معدل توافره الحيوي بنسبة 16% عند تناوله مع الطعام أو الحليب , يؤخذ مع الطعام أو الحليب لتقليل تأثيراته الجانبية الهضمية

(الشامل في الأدوية السريرية) (AHFS Drug Information)

Tolterodine Tartrate

مضاد للكولين يستخدم في علاج البوال المتكرر و الإلحاح البولي و السلس البولي

يزداد التوافر الحيوي للأقراص العادية عند تناولها مع الطعام (بمعدل 53%) لكن المصنعونذكروا أن مثل هذه التغيرات ليس من المتوقع أن يكون لها أهمية سريرية

إن الطعام لا يغير الحرائك الدوائية للتولتيرودين مديد التحرر لذا يمكن تناول الأقراص العادية و الكبسول مديد التحرر بغض النظر

عن الطعام لكن البعض ينصح بتناول التولتيرودين بشكل ثابت فيما يتعلق بالطعام

(AHFS Drug Information)

Topiramate

دواء مضاد للصرع

لا يتأثر توافره الحيوي بوجود الطعام, يمكن تناوله بغض النظر عن الطعام

(AHFS Drug Information) (Martindale Thirty-sixth edition)

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

(الشامل في الأدوية السريرية) (Pocket Clinical Drug Reference)

Topotecan

دواء مضاد للأورام

يبلغ توافره الحيوي بعد تناوله فمويًا 40% و ليس للطعام تأثير مهم على الحرائك الدوائية للتوبوتيكان

(Martindale Thirty-sixth edition)

Torase mide

مدر من مدرات العروة

إن الطعام ينقص معدل الامتصاص (السرعة) و ليس الكمية

الامتصة, يؤخذ بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Toremifene Citrate

مضاد للأورام

لا يؤثر الطعام على امتصاص التوريميدين ,يؤخذ بغض النظر عن
الطعام (AHFS Drug Information)

Tramadol

مسكن ألم أفيوني

إن الطعام لا يؤثر بشكل هام على معدل الامتصاص و الكمية
المتصة عندما يؤخذ لوحده ,يؤخذ بغض النظر عن الطعام

(Pocket Clinical Drug Reference) (AHFS Drug Information)

Trandolapril

خافض للضغط من مثبطات الأنزيم المحول للأنجوتنسين
إن معدل الامتصاص و ليس الكمية الممتصة ينخفض بتناول هذا
الدواء مع الطعام, يمكن تناوله بغض النظر عن الطعام

(AHFS Drug Information)

Tranlycypromine Sulfate

(Transamine Sulphate)

مضاد اكتئاب مثبط لخميرة المونو أمينو أوكسيداز
يجب تجنب الأطعمة التي تحوي التيرامين أو التربتوفان خلال فترة
استخدامه كما يجب تجنب الكافئين (الشامل في الأدوية السريرية)

Trazodone

مضاد اكتئاب

يمتص الترازودون بسهولة عبر الجهاز الهضمي و يتأثر امتصاصه
بالطعام ,فعندما يؤخذ بعد فترة قصيرة من تناول الطعام تزداد الكمية

المتتصة لكن ينقص التركيز المصلي الذروي و يزداد الزمن اللازم للوصول إليه مقارنة مع تناوله على معدة فارغة , فعند تناوله بعد الطعام يصل التركيز المصلي للذروة بعد ساعتين من أخذ الجرعة أما على معدة فارغة فإنه يصل للذروة بعد ساعة
يؤخذ بعد فترة قصيرة من وجبة الطعام

(Martindale Thirty-sixth edition) (الشامل في الأدوية السريرية)

Triamcinolone

ستيروئيد قشري متوسط القوة

يؤخذ مستحضره الفموي مع الطعام (Pocket Clinical Drug Reference)

يطبق المعجون الفموي عند النوم و عند الضرورة يطبق 2-3

مرات بعد وجبات الطعام (AHFS Drug Information)

Triamterene

مدر حافظ للبوتاسيوم

يؤخذ بعد الفطور و الغداء و يجب تجنب الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم أو مستحضراته خلال فترة استخدام التريامترين

(British National Formulary 57) (Martindale Thirty-sixth edition)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Trichlormethiazide

مدر تيازيدي

يمكن تناوله مع الطعام أو الحليب

(الشامل في الأدوية السريرية)

Trientine Dihydrochloride

(Trientine Hydrochloride)

ترياق للتسمم بالنحاس يستخدم في علاج داء ويلسون

يؤخذ على معدة فارغة

(British National Formulary 57) (Martindale Thirty-sixth edition)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Trihexyphenidyl hydrochloride

(Benzhexol Hydrochloride)

دواء مضاد للكتولين, مضاد لباركنسون

يؤخذ مع الطعام لتخفيف الانزعاج الهضمي

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Trioxysalen (Trioxsalen)

يستخدم لزيادة التصبغ عند مريض البهاق و لزيادة تحمل أشعة الشمس

يمكن تخفيف الانزعاج المعدي الناجم عنه بتناوله مع الحليب أو بعد

الطعام مباشرة (الشامل في الأدوية السريرية)

Troglitazone

خافض لسكر الدم

يزداد امتصاصه بشكل كبير بوجود الطعام, يؤخذ مع الطعام

(الشامل في الأدوية السريرية) (Martindale Thirty-sixth edition)

Tropisetron

ضاد لمستقبلات السيروتونين 5-HT3 يستخدم مضاد للغثيان و الإقياء

يؤخذ قبل ساعة على الأقل من تناول الإفطار

(Martindale Thirty-sixth edition) (الشامل في الأدوية السريرية)

Trospium Chloride

دواء مضاد للتشنج يستخدم في علاج السلس البولي و البوال المتكرر و الإلحاح البولي

إن توافره الحيوي ينخفض إذا أخذ مع الطعام و خاصة ذو المحتوى العالي من الدسم ,يؤخذ على معدة فارغة

(British National Formulary 57) (Martindale Thirty-sixth edition)

Troxipide

يستخدم لعلاج التهاب المعدة و القرحة الهضمية

يؤخذ بعد الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

Typhoid vaccine

تبلع الكبسولات الملبسة معوياً مع سائل بارد أو فاتر لا تتجاوز

حرارته 37 درجة مئوية قبل الطعام بساعة (AHFS Drug Information)

Valaciclovir

مضاد فيروسي

يؤخذ بغض النظر عن الطعام (Pocket Clinical Drug Reference)

Valdecoxib

مضاد التهاب غير ستيرويدي انتقائي على سيكلو أوكسيجيناز 2

يؤخذ بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Valganciclovir

دواء مضاد للفيروسات, يؤخذ مع الطعام

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

Valproate

دواء مضاد للصرع

يمكن تقليل تأثيراته الجانبية الهضمية بتناوله مع الطعام أو بعده

(Pharmacotherapy handbook Eighth Edition)

(AHFS Drug Information) (Martindale Thirty-sixth edition)

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Valsartan

خافض للضغط من حاصرات مستقبلات الانجوتنسين 2

على الرغم من أن الطعام قد يخفض معدل الامتصاص و الكمية
الامتصة لكن المصنعون ذكروا بأن هذا الدواء يمكن تناوله بغض

النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Vardenafil

مثبط انتقائي لخميرة فوسفودي استيراز يستخدم لعلاج اضطراب
الانتصاب

ينخفض معدل امتصاصه عند تناوله مع وجبة طعام غنية بالدهن
،يؤخذ مع أو بدون طعام لكن بداية تأثيره تتأخر إذا أخذ مع وجبة
طعام دسمة

(British National Formulary 57) (Martindale Thirty-sixth edition)

(Pharmacotherapy handbook Eighth Edition)

Varenicline

دواء مساعد على إيقاف التدخين

يؤخذ مع الطعام مع شرب كأس كامل من الماء

(Pocket Clinical Drug Reference)

Venlafaxine

مضاد للاكتئاب مثبط انتقائي لعودة قبط كل من السيروتونين و
النورادرينالين

إن الطعام لا يؤثر على امتصاص الفينلافاكسين من الجهاز
الهضمي ,يؤخذ مع الطعام لتقليل تأثيراته الجانبية الهضمية

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

(AHFS Drug Information)

Vildagliptin

خافض لسكر الدم

يؤخذ مع الطعام أو بدونه (Martindale Thirty-sixth edition)

Vitamin A

يؤخذ مع الطعام (الشامل في الأدوية السريرية)

Vitamin E

يؤخذ مع الطعام أو بعده (Pocket Clinical Drug Reference)

Voriconazole

دواء مضاد للفطور

تعطى جرعته الفموية قبل الطعام بساعة على الأقل أو بعده بساعة

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Vorinostat

دواء مضاد للورم

يبلغ متوسط الزمن اللازم ليصل للتركيز المصلي الذروي بعد تناوله فمويًا مع وجبة طعام عالية الدسم 4 ساعات و ينخفض لساعة و نصف عند تناوله على معدة فارغة , فوجبة الطعام عالية الدسم تخفض معدل الامتصاص لكنها تزيد الكمية الممتصة , يؤخذ مع

الطعام (Martindale Thirty-sixth edition)

Warfarin

مضاد تخثر

تشير الدراسات أن وجود الطعام في الجهاز الهضمي ينقص معدل الامتصاص و ليس الكمية الممتصة للوارفارين

إن الأطعمة الغنية بفيتامين ك تنقص فعالية الوارفارين المضادة للتخثر

(Pocket Clinical Drug Reference) (AHFS Drug Information)

Zafirlukast

ضاد لمستقبلات اللوكوترين يستخدم للوقاية من الربو
إن تناوله مع الطعام ينقص من معدل الامتصاص و الكمية الممتصة
(ينقص التوافر الحيوي بحوالي 40%) م, لذا يؤخذ قبل الطعام
بساعة على الأقل أو بعده بساعتين

(Pharmacotherapy handbook Eighth Edition)

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

Zaleplon

دواء منوم يستخدم في العلاج قصير الأمد للأرق
إن تناوله مع وجبة طعام كبيرة أو ذات محتوى عالي من الدسم
يؤخر الامتصاص و ينقصه و يخفض التراكيز الذروية, يؤخذ
بغض النظر عن الطعام لكن يجب تجنب تناوله مع طعام عالي
الدسم

(Pocket Clinical Drug Reference) (Martindale Thirty-sixth edition)

(AHFS Drug Information)

Zidovudine

مضاد للفيروسات يستخدم في علاج الـ HIV
يتأخر الامتصاص عندما يؤخذ مع الطعام لكن التوافر الحيوي لا
يتأثر, يؤخذ بغض النظر عن الطعام
لتخفيف أذية المري يؤخذ بوضعية قائمة مع شرب كمية كافية من
السوائل (120 مل على الأقل)

(AHFS Drug Information) (Martindale Thirty-sixth edition)

Zinc

يؤخذ مع الطعام لتخفيف الانزعاج الهضمي الذي قد ينجم عنه و لكن يجب تجنب الأطعمة الغنية بالكالسيوم أو الفوسفور أو الفيتامينات (الشامل في الأدوية السريرية)

Ziprasidone

مضاد ذهان لا نمطي

يؤخذ مع الطعام حيث أن وجود الطعام يضاعف الامتصاص

(Martindale Thirty-sixth edition) (Pocket Clinical Drug Reference)

(AHFS Drug Information) (الشامل في الأدوية السريرية)

Zolmitriptan

شاد انتقائي لمستقبلات السيروتونين 5-HT_{1D} و 5-HT_{1B} يستخدم في علاج نوبات الشقيقة الحادة

لا يؤثر الطعام على توافره الحيوي بشكل هام , تؤخذ الأقراص العادية و المتفتتة بغض النظر عن الطعام (AHFS Drug Information)

Zolpidem Tartrate

مهدئ و مركن

إن الطعام يمكن أن يخفض معدل الامتصاص و الكمية الممتصة ,يؤخذ على معدة فارغة للحصول على تأثيره المنوم بسرعة (و ذلك قبل الذهاب للنوم مباشرة)

(AHFS Drug Information) (Pocket Clinical Drug Reference)

(الشامل في الأدوية السريرية)

Zonisamide

دواء مضاد للصرع

إن وجود الطعام لا يؤثر على توافره الحيوي لكن الزمن اللازم للوصول للتركيز المصلي الذروي يتأخر, يمكن تناوله مع أو بدون طعام

(AHFS Drug Information) (Martindale Thirty-sixth edition)

(Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX Eighth Edition)